

Н.В. Дорофеев, А.А. Сапожников,
Е.С. Шубин

**РЕШЕНИЕ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ
ЗА 11 КЛАСС**

к учебному изданию «Сборник заданий для
проведения письменного экзамена
по математике (курс А)
и алгебре и началам анализа (курс В)
за курс средней школы. 11 класс /
Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, Е.А. Седова. —
М.: Дрофа»


StudyPort.ru

**Раздел 1. Задания 1–5 для экзаменов
«Математика» и «Алгебра и начало анализа»**

Вариант 1.

1. $\frac{x-4x^2}{x-1} > 0; \frac{x(4x-1)}{x-1} < 0.$

Пусть $f(x) = \frac{x(4x-1)}{x-1}$. $f(x)$ определена на $(-\infty; 1) \cup (1; \infty)$;



Ответ: $(-\infty; 0) \cup (\frac{1}{4}; 1)$.

2. $\log_2(2x-1)=3; \begin{cases} 2x-1 > 0, & x > 0,5 \\ 2x-1=8; & x=4,5; \end{cases} x=4,5.$ Ответ: 4,5.

3. $2\sin x + 1 = 0, [0; 2\pi]. 2\sin x = -1; \sin x = -\frac{1}{2}; x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$

Из этих корней промежутку $[0, 2\pi]$ принадлежат только $\frac{7\pi}{6}$ и $\frac{11\pi}{6}$.

4. а) $D(f) = [-2, 5; 6]$;

б) функция возрастает на промежутке $[-2, 5; -0, 5]$;

функция убывает на промежутке $[-0, 5; 6]$;


в) $f(x) = 0$ при $x = -1, 8$ и $x = 1, 5$; г) $\max f(x) = 3, 5, \min f(x) = f(6) = -5, 5$;

д) $-4 < f(x) < 2$ при $x \in (-2, 4; -1, 4) \cup (0, 8; 5, 2)$.

5. $f(x) = x^4 + 3x^2 + 5. F(x) = \frac{x^5}{5} + 3 \frac{x^3}{3} + 5x + C; F(x) = \frac{x^5}{5} + x^3 + 5x + C.$

Ответ: $F(x) = \frac{x^5}{5} + x^3 + 5x + C.$

Вариант 2.



2

$f(x)$ определена на $(-\infty; 3,5) \cup (3,5; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x=6$, $x=8$.
 $x \in (-\infty; 3,5) \cup (6; 8)$. Ответ: $(-\infty; 3,5) \cup (6; 8)$.

2. $5^{x+1} + 5^x + 5^{x-1} = 31$; $6,2 \cdot 5^x = 31$; $5^x = 5$; $x=1$. Ответ: 1.

3. $2\sin(\frac{\pi}{3} - x) = 1$; $\sin(\frac{\pi}{3} - x) = \frac{1}{2}$; $\frac{\pi}{3} - x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$;

$x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} - \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} - \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-3,5; 4,5]$; $f(x) = 0$ при $x=1,2$ и $x=3,7$;
 в) функция возрастает на промежутках $[-3,5 - 1]$ и $[2,5; 4,5]$;
 функция убывает на промежутке $[-1; 2,5]$;
 г) $\max f(x) = f(4,5) = 6$, $\min f(x) = f(2,5) = -2,5$;
 д) $f(x) < -2$ при $-1,9 < x < 3$.


5. $f(x) = x^3 - 3x^2 + x - 1$; $F(x) = \frac{1}{4} x(x^3 - 4x^2 + 2x - 4) + C$.

Ответ: $\frac{1}{4} x(x^3 - 4x^2 + 2x - 4) + C$.

Вариант 3.

1. $\frac{x^2 - 4}{2x + 1} < 0$; $\frac{(x-2)(x+2)}{2x+1} < 0$.

Пусть $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{2x+1}$.



$f(x)$ определена на $(-\infty; -0,5) \cup (-0,5; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x = -2$, $x = 2$.
 $x \in (-\infty; -2) \cup (-0,5; 2)$. Ответ: $(-\infty; -2) \cup (-0,5; 2)$.


2. $27^{1-x} = \frac{1}{81}$; $(3^3)^{1-x} = 3^{-4}$; $3^{3-3x} = 3^{-4}$; $3-3x = -4$; $3x = 7$; $x = 2\frac{1}{3}$.

Ответ: $2\frac{1}{3}$.


3. $\cos(2\pi - x) + \sin(\frac{\pi}{2} + x) = \sqrt{2}$; $\cos x + \cos x = \sqrt{2}$; $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$;

$x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $\pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.




4.



5. $f(x) = e^x(x^2+1)$; $F(x) = (e^x)'(x^2+1) + e^x(x^2+1)' = e^x(x^2+1) + 2xe^x = e^x(x^2+2x+1) = e^x(x+1)^2$. Ответ: $e^x(x+1)^2$.

Вариант 4.



1. $\frac{x^2 + 2x - 3}{2x - 3} > 0$; $\frac{(x+3)(x-1)}{2x-3} > 0$.

Пусть $f(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{2x-3}$.

$f(x)$ определена на $(-\infty; 1.5) \cup (1.5; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x = -3, x = 1$.
 $x \in (-3; 1) \cup (1.5; \infty)$. Ответ: $(-3; 1) \cup (1.5; \infty)$.

2. $\log_{0.5}(2-x) > -1$; $\log_{0.5}(2-x) > \log_{0.5}2$;

$(y = \log_{0.5}t, t > 0 - \text{функция убывающая}); \begin{cases} 2-x > 0, & x < 2, \\ 2-x < 2, & x > 0; \end{cases} 0 < x < 2$.

Ответ: (0; 2).

3. $(1+\operatorname{tg}\alpha)(1+\operatorname{ctg}\alpha) - \frac{1}{\sin\alpha\cos\alpha} = 2$;

$(1+\operatorname{tg}\alpha)(1+\operatorname{ctg}\alpha) - \frac{1}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{(\sin\alpha + \cos\alpha)^2}{\sin\alpha\cos\alpha} - \frac{1}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin\alpha\cos\alpha} = 2$.

4. Угловой коэффициент k касательной, проведенной к графику функции $f(x) = 3x^3 + 2x - 5$ в точке с абсциссой $x = 2$, есть $k = f'(2)$:
 $f'(x) = 9x^2 + 2$, $f'(2) = 9 \cdot 4 + 2 = 38$; $k = 38$. Ответ: 38.

5. $f(x) = 4 + 6x^2$; $F(x) = 4x + 6 \cdot \frac{x^3}{3} + C$; $F(x) = 4x + 2x^3 + C$;

$x = 2$; $F(2) = 4 \cdot 2 + 2 \cdot 2^3 + C = 24 + C$; $24 + C < 0$; $C < -24$.


Например, $C = -25$, тогда $F(x) = 4x + 2x^3 - 25$.

Ответ: $F(x) = 4x + 2x^3 - 25$.

4

Вариант 5.

1. $y = \lg \frac{2x+1}{x-1}$; $\begin{cases} x \neq 1, \\ \frac{2x+1}{x-1} > 0. \end{cases}$



Решим неравенство $\frac{2x+1}{x-1} > 0$.

$(-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (1; \infty)$. Ответ: $(-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (1; \infty)$.

2. $8^{2x+1} > 0,125$; $8^{2x+1} > \frac{1}{8}$; $8^{2x+1} > 8^{-1}$;

($y = 8^t$ – функция возрастающая); $2x+1 > -1$, $x > -1$. Ответ: $(-1; \infty)$.

3. $2\sin(x + \frac{\pi}{2}) + \sqrt{2} = 0$; $2\cos x + \sqrt{2} = 0$; $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$,

$x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.


4. $f(x) = 2x^2 + \lg x$; $f'(x) = 4x + \frac{1}{\cos^2 x}$. Ответ: $4x + \frac{1}{\cos^2 x}$.

5. $S = \int_{-1}^2 (x^2 + 5x + 6) dx = (\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 6x) \Big|_{-1}^2 =$

$= (\frac{8}{3} + 10 + 12) - (-\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 6) = 28,5$. Ответ: 28,5.

Вариант 6.

1. $\frac{54 - 6x^2}{4x + 7} < 0$; $\frac{6(x^2 - 9)}{4x + 7} > 0$.



Пусть $f(x) = \frac{6(x^2 - 9)}{4x + 7}$ определена на $(-\infty; -1\frac{3}{4}) \cup (-1\frac{3}{4}; \infty)$;

$f(x) = 0$ при $x = -3$ и $x = 3$. $x \in (-3; -1\frac{3}{4}) \cup (3; \infty)$.

Ответ: $x \in (-3; -1\frac{3}{4}) \cup (3; \infty)$.


2. $3^x - (\frac{1}{3})^{2-x} = 24$; $3^x - 3^{x-2} = 24$; $3^x \cdot \frac{1}{9} \cdot 3^x = 24$; $\frac{8}{9} \cdot 3^x = 24$; $3^x = 3^3$, $x = 3$;

или $3^{x-2}(3^2-1)=24$; $3^{x-2} \cdot 8=24$; $3^{x-2}=3$; $x-2=1$; $x=3$. Ответ: 3.

3. $\cos x + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) = 0$; $\cos x + \sin x - \cos x = 0$;

$\sin x = 0$, $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: πk , $k \in \mathbb{Z}$.

4.



5. Абсциссы точек касания найдем из уравнения $f'(x_0)=0$:

$$5x_0^4 - 10x_0 = 0; 5x_0(x_0^3 - 2) = 0; x_0 = 0 \text{ или } x_0 = \sqrt[3]{2}.$$

Найдем ординаты точек касания: $f(0)=1$, $f(\sqrt[3]{2}) = (\sqrt[3]{2})^5 -$

$$-5(\sqrt[3]{2})^2 + 1 = (\sqrt[3]{2})^2(\sqrt[3]{2^3} - 5) + 1 = \sqrt[3]{4}(2-5) + 1 = 1 - 3\sqrt[3]{4}.$$

Имеем $A(0; 1)$, $B(\sqrt[3]{2}; 1 - 3\sqrt[3]{4})$. Ответ: $(0; 1)$, $(\sqrt[3]{2}; 1 - 3\sqrt[3]{4})$.

Вариант 7.

1. $9^{\frac{3}{4}} + 27^{\frac{2}{3}} - \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{3}{4}} = (3^2)^{\frac{3}{4}} + (3^3)^{\frac{2}{3}} - (2^{-4})^{\frac{3}{4}} = 3^{\frac{3}{2}} + 3^2 - 2^{-3} = 28.$

2. $\log_4(7-x) < 3$. Неравенство равносильно системе:

$$\begin{cases} 7-x > 0, & \{x < 7, \\ 7-x < 4^3; & \{x > -57; \end{cases} \quad \text{Ответ: } (-57; 7).$$

3. $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x$; $\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + \sin 2x$;


$$\sin x \cos x = 0; \frac{1}{2} \sin 2x = 0; \sin 2x = 0; 2x = \pi n, n \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} \\ x = \pi \\ x = \frac{3\pi}{2} \\ x = 2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} \\ x = \pi \\ x = \frac{3\pi}{2} \\ x = 2\pi \end{cases} \quad \text{Ответ: } 0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3}{2}\pi; 2\pi.$$

4. а) $D(f)=[-3,5; 6]$;
 б) $-2,5 \leq f(x) \leq 1,5$ при $x \in [-3,5; -2,7]$ и $[-0,5; 0,8] \cup [3; 3,75]$;
 в) $f(x) > 0$ — $(-3,5; -1,5)$ и $(2; 6)$; $f(x) < 0$ — $x \in (-1,5; 2)$;
 г) $x_{\max} = -1,5$, $x_{\min} = 2$; д) $\min f(x) = f(2) = -3,5$; $\max f(x) = f(6) = 5,5$.
 5. $F'(x) = (x^3 - 3x + 1)' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = f(x)$. Ответ: является.

Вариант 8.

1. $25^{1,5} + (0,25)^{-0,5} - 81^{0,75}$;
 $(5^2)^{1,5} + (0,5^2)^{-0,5} - (3^4)^{\frac{3}{4}} = 5^3 + 2 - 27 = 100$; Ответ: 100.
 2. $\log_9(4-3x) > 0,5$; $\begin{cases} 4-3x > 0, \\ 4-3x > 9^{0,5}, \end{cases}$ $4-3x > 3$; $x < \frac{1}{3}$. Ответ: $(-\infty; \frac{1}{3})$.
 3. $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(-\frac{\pi}{4})$; $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
 Ответ: $\pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
 4.




5. $S = 5t - 0,5t^2$; $v = S'(t)$, $S' = 5 - t$, $v(2) = 5 - 2 = 3$ (м/с). Ответ: 3 м/с.

Вариант 9.

1. $\frac{(x+5)(x-7)}{3x-1} > 0$.

Пусть $f(x) = \frac{(x+5)(x-7)}{3x-1}$;



$f(x)$ определена на $(-\infty; \frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}; \infty)$, $f(x) = 0$ при $x = -5$ и $x = 7$.

$x \in (-5; \frac{1}{3}) \cup (7; \infty)$. Ответ: $(-5; \frac{1}{3}) \cup (7; \infty)$.


2. $3^{x+2} - 5 \cdot 3^x = 36$; $9 \cdot 3^x - 5 \cdot 3^x = 36$; $4 \cdot 3^x = 36$, $3^x = 3^2$, $x = 2$.

Ответ: 2.

3. $(\sin x + 1)^2 = \sin^2 x + 1$; $\sin^2 x + 2 \sin x + 1 = \sin^2 x + 1$; $2 \sin x = 0$;
 $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Если $0 \leq \pi n \leq 2\pi$, то $0 \leq n \leq 2$, тогда $x = 0$; $x = \pi$; $x = 2\pi$.

Ответ: 0; π ; 2π .

4.




5. $f(x) = x^2 - 5$; $F(x) = \frac{x^3}{3} - 5x + C$. $4 = \frac{3^3}{3} - 5 \cdot 3 + C$, $4 = -6 + C$, $C = 10$,

$F(x) = \frac{x^3}{3} - 5x + 10$. Ответ: $\frac{x^3}{3} - 5x + 10$.

Вариант 10.

1. $\frac{2x + 8x^2}{2x - 1} < 0$. Пусть $f(x) = \frac{2x(4x + 1)}{2x - 1}$;

$f(x)$ – определена на $(-\infty; 0,5) \cup (0,5; \infty)$; $f(x) = 0$, при $x = -\frac{1}{4}$ и $x = 0$.



$x \in (-\infty; -\frac{1}{4}) \cup (0; \frac{1}{2})$

Ответ: $(-\infty; -\frac{1}{4}) \cup (0; \frac{1}{2})$.

2. $\log_7(x-1) \leq \log_7 2 + \log_7 3$;


$\begin{cases} \log_7(x-1) \leq \log_7 6, & \{x-1 \leq 6, & \{x \leq 7, \\ x-1 > 0; & \{x > 1; & \{x > 1; \end{cases}$ $1 < x \leq 7$. Ответ: $(1; 7]$.

3. $2 \cos x + \sqrt{2} = 0$; $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Из этих корней только корни $\frac{3\pi}{4}$ и $\frac{5\pi}{4} \in [0, 2\pi]$. Ответ: $\frac{3}{4}\pi$; $\frac{5}{4}\pi$.


8

4. а) $D(f)=[-3;5,5]$; б) $y=0$ при $x=0,7$ и $x=4,3$;
 в) функция возрастает на промежутках $[-1,5; -0,5]$ и $[2; 5,5]$;
 функция убывает на промежутках $[-3; -1,5]$ и $[-0,5; 2]$;
 г) $\max f(x)=f(-3)=5,5$; $\min f(x)=f(2)=-2,5$;
 д) касательные параллельны оси абсцисс в точках экстремума:
 $(-1,5; 3)$ и $(2; -2,5)$.
 5. $y=2x^3-3x^2-36x$;
 $y'=6x^2-6x-36$; $6x^2-6x-36>0 \mid : 6$;
 $x^2-x-6>0$; $(x+2)(x-3)>0$;
 Ответ: возрастает на $(-\infty; -2]$ и на $[3; \infty)$.



Вариант 11.

1. $\frac{8x^2-2}{3-x} > 0$; $\frac{2(4x^2-1)}{x-3} < 0$.



Пусть $f(x) = \frac{2(4x^2-1)}{x-3}$;

$f(x)$ – определена на $(-\infty; 3) \cup (3; \infty)$. $f(x)=0$ при $x=-0,5$ и $x=0,5$.
 $x \in (-\infty; -0,5) \cup (0,5; 3)$. Ответ: $(-\infty; -0,5) \cup (0,5; 3)$.

2. $36 \cdot 216^{3x+1} = 1$; $6^2 \cdot 6^{3(3x+1)} = 1$; $6^{2+9x+3} = 1$;

$9x+5=0$, $x = -\frac{5}{9}$. Ответ: $-\frac{5}{9}$.

3. $\sin(\pi+x) - \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sqrt{3}$; $-\sin x - \sin x = \sqrt{3}$;

$\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; Ответ: $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. $f(x) = x - \ln x$; $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$; $k=f(3) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Ответ: $\frac{2}{3}$.


5. $S = \int_{-2}^{-1} (x^2 - 6x + 8) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x \right) \Big|_{-2}^{-1} =$
 $= \left(-\frac{1}{3} - 3 - 8 \right) - \left(-\frac{8}{3} - 12 - 16 \right) = 19 \frac{1}{3}$. Ответ: $19 \frac{1}{3}$.

Вариант 12.

1. $\frac{8x^2-2x}{3-6x} > 0$; $\frac{2x(4x-1)}{3(2x-1)} < 0$. Пусть $f(x) = \frac{2x(4x-1)}{3(2x-1)}$;

$f(x)$ определена на $(-\infty; 0,5) \cup (0,5; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x = 0$; $x = \frac{1}{4}$.

Решим неравенство методом интервалов:



Ответ: $x \in (-\infty; 0) \cup (\frac{1}{4}; \frac{1}{2})$.

2. $21\log_3 2 - \log_3(x-1) = 1 + \log_3 5$; $x-1 > 0$;


$\log_3 4 - \log_3(x-1) = \log_3 3 + \log_3 5$; $\log_3 \frac{4}{x-1} = \log_3 15$;

$\frac{4}{x-1} = 15$, $15x - 15 = 4$, $x = 1 \frac{4}{15}$. Ответ: $1 \frac{4}{15}$.

3. $2\cos \frac{x}{4} - \sqrt{3} = 0$; $\cos \frac{x}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{x}{4} = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$;

$x = \pm \frac{2\pi}{3} + 8\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 8\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4.




5. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 5x^2 - 1$; $F(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 + 5x^2 - 1\right)' = x^2 + 10x$;

$x^2 + 10x = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = -10$. $y_1 = -1$, $y_2 = 165 \frac{2}{3}$.

Ответ: $(0; -1)$, $(-10; 165 \frac{2}{3})$.

Вариант 13.

$$1. y = \lg \frac{x-2}{4x-1}; \begin{cases} \frac{x-2}{4x-1} > 0, \\ 4x-1 \neq 0 \end{cases}$$



Ответ: $(-\infty; 1/4) \cup (2; \infty)$.

$$2. 100^{2x+1} < 0,1; 10^{2(2x+1)} < 10^{-1}; 4x+2 < -1, x < -\frac{3}{4}. \text{ Ответ: } (-\infty; -\frac{3}{4}).$$

$$3. 4\cos^2 x - 1 = 0; 2\cos^2 x = \frac{1}{2}; 1 + \cos 2x = \frac{1}{2}; \cos 2x = -\frac{1}{2};$$

$$2x = \pm \frac{2}{3}\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \text{ Ответ: } \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$4. \text{ а) } D(f) = [-3,5; 6]; \text{ б) } x = -1,5;$$

$$\text{ в) } f'(x) < 0 \text{ при } x \in (-3,5; -1,5) \text{ и } x \in (2,5; 6); f'(x) > 0 \text{ при } x \in (-1,5; 2,5);$$

$$\text{ г) } \max f(x) = f(2,5) = 4,5; \min f(x) = f(-1,5) = -3; \text{ д) в точке } (2,5; 4,5).$$

$$5. f(x) = x^3 - 3x^2 + x - 1;$$

$$F(x) = \frac{x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} - x + C = \frac{1}{4}(x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x) + C.$$

Ответ: $\frac{1}{4}(x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x) + C.$

Вариант 14.

$$1. 9^{1,5} - 81^{0,5} - (0,5)^{-2} = (3^2)^{1,5} - (9^2)^{0,5} - 2^2 = 27 - 9 - 4 = 14.$$

Ответ: 14.

$$2. \log_2(1-2x) < 0; \begin{cases} 1-2x < 1, \\ 1-2x > 0; \end{cases} \begin{cases} x > 0, \\ x < 0,5; \end{cases} 0 < x < 0,5. \text{ Ответ: } (0; 0,5).$$


$$3. \sin x = -\frac{15}{17}, \pi < x < \frac{3\pi}{2};$$

$$\text{С учетом условия } \pi < x < \frac{3\pi}{2}: \cos x = -\sqrt{1 - \sin^2 x};$$

$$\cos x = -\sqrt{1 - \left(-\frac{15}{17}\right)^2}; \cos x = -\sqrt{\frac{32}{17} \cdot \frac{2}{17}} = -\frac{8}{17}.$$

Ответ: $-\frac{8}{17}.$

4.



5. $f(x) = 4x^3 - x^2 + 2$; $F(x) = x^4 - \frac{x^3}{3} + 2x + C$;

$F(1) = 1 - \frac{1}{3} + 2 + C = 2\frac{2}{3} + C$; $F(1) < 0$, при $C < -2\frac{2}{3}$, например,

$C = -3$, т.е. $F(x) = x^4 - \frac{x^3}{3} + 2x - 3$. Ответ: $x^4 - \frac{x^3}{3} + 2x - 3$.

Вариант 15.

1. $16^{\frac{5}{4}} - (\frac{1}{9})^{\frac{1}{2}} + 27^{\frac{2}{3}} = (2^4)^{\frac{5}{4}} - ((\frac{1}{3})^2)^{\frac{1}{2}} + (3^3)^{\frac{2}{3}} = 32 - 3 + 9 = 38$.

2. $\frac{1}{27} \leq 3^{2-x} < 27$; $3^{-3} \leq 3^{2-x} < 3^3$, т.к. $3 > 1$, то $-3 \leq 2-x < 3$; $-5 \leq -x < 1$;


$-1 < x \leq 5$. Целые решения неравенства: $x = 0; 1; 2; 3; 4; 5$.

Ответ: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

3. $\cos^2 x + \cos x = -\sin^2 x$; $\cos^2 x + \sin^2 x + \cos x = 0$;


$1 + \cos x = 0$; $\cos x = -1$, $x = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4.



12

5. $f(x)=2x^3-3x^2-1$; $D(f)=\mathbb{R}$;
 $f'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$;
 $f'(x)=0$, при $x=0$ и $x=1$;
 $x=0$ и $x=1$ – точки экстремума.
 Ответ: 0 и 1.



Вариант 16.

1. $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{5}{3}} a^{\frac{1}{6}} b^{-\frac{1}{6}} = a^{\frac{1+1}{6}} b^{\frac{5-1}{6}} = a^{\frac{2}{6}} b^{\frac{4}{6}} = a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{2}{3}}$. Ответ: $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{2}{3}}$.


2. $\log_2(2x+1) > 4$; $\log_2(2x+1) > \log_2 16$. $\begin{cases} 2x+1 > 16, \\ 2x+1 > 0; \end{cases} x > 7,5$.

Ответ: (7,5; ∞).

3. $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = \cos \frac{\pi}{6}$; $-\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$,

$x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4. $D(f)=\mathbb{R}$;
 $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$;
 $f'(x)=0$ при $x=0$ и $x=1$;
 Функция возрастает на промежутках $(-\infty; 0]$ и $[1; \infty)$. Ответ: $(-\infty; 0]$ и $[1; \infty)$.



5. $f(x) = 4 - x^2$; $F(x) = 4x - \frac{x^3}{3} + C$; $4(-3) - \left(\frac{-27}{3}\right) + C = 10$,


$-12 + 9 + C = 10, C = 13$. $F(x) = 4x - \frac{x^3}{3} + 13$. Ответ: $F(x) = 4x - \frac{x^3}{3} + 13$.

Вариант 17.

1. $\frac{4x-x^2}{3+2x} \leq 0$; $\frac{x(x-4)}{2x+3} \geq 0$. Пусть $f(x) = \frac{x(x-4)}{2x+3}$.

$f(x)$ определена на $(-\infty; -1,5) \cup (-1,5; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x=0$ и $x=4$.

Решим неравенство методом интервалов:



Ответ: $(-1,5; 0] \cup [4; \infty)$.

2. $\log_3(2x+1) = \log_3 13 + 1$;

$$\begin{cases} \log_3(2x+1) = \log_3 13 + \log_3 3, \\ 2x+1 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \log_3(2x+1) = \log_3 39, \\ x > -0,5; \end{cases}$$


$$\begin{cases} 2x+1=39, \\ x > -0,5; \end{cases} \quad \begin{cases} x=19, \\ x > -0,5; \end{cases} \quad x=19. \quad \text{Ответ: } 19.$$

3. $2\sin x + \sqrt{3} = 0$; $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; $x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

$x = \pi + \pi/3$ или $x = 2\pi - \pi/3$

$x = 4\pi/3$ $x = 5\pi/3$. Ответ: $\frac{4}{3}\pi$; $\frac{5}{3}\pi$.

4.



5. $f(x) = 2x^2 + 3$; $F(x) = \frac{2}{3}x^3 + 3x + C$; $F(-2) = -5$;


$\frac{2}{3} \cdot (-2)^3 - 6 + C = -5$; $C = \frac{19}{3}$. Ответ: $\frac{2}{3}x^3 + 3x + \frac{19}{3}$.

Вариант 18.

1. $\frac{4x-9x^2}{10-x} \geq 0$; $\frac{x(9x-4)}{x-10} \geq 0$. Пусть $f(x) = \frac{x(9x-4)}{x-10}$;

$f(x)$ определена на $(-\infty; 10) \cup (10; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x = 0$ и $x = \frac{4}{9}$.

Решим неравенство методом интервалов:



Ответ: $(0; \frac{4}{9}] \cup (10; \infty)$.

2. $\begin{cases} \log_{0,5}(3x-1) = \log_{0,5} 8, \\ 3x-1 > 0; \end{cases} \begin{cases} 3x-1=8, \\ 3x-1 > 0; \end{cases} x=3. \text{ Ответ: } 3.$

3. $2\cos x + \sqrt{3} = 0, [0; 2\pi]; \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}, x = \pi \pm \frac{\pi}{6}$

Ответ: $\frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}$.


4. а) $D(f) = [-3,5; 6]$; б) $f(x) > 2$ при $x \in (-1; 2,5) \cup (5,5; 6)$;
 в) функция возрастает на промежутках $[-3,5; 1]$ и $[4; 6]$;
 функция убывает на промежутке $[1; 4]$; г) $f'(x) = 0$ при $x=1$ и $x=4$;
 д) $\max f(x) = f(1) = 4,5$; $\min f(x) = f(-3,5) = -4,5$.

5. $y = 2x^3 + 9x^2 - 24x$;
 $y' = 6x^2 + 18x - 24; x^2 + 3x - 4 \leq 0; (x-1)(x+4) \leq 0$.
 $-4 \leq x \leq 1$. Ответ: $[-4; 1]$.



Вариант 19.

1. $\frac{3x^2 - 27}{2x + 7} < 0; \frac{3(x+3)(x-3)}{2x+7} < 0.$



Пусть $f(x) = \frac{3(x+3)(x-3)}{2x+7}$;


$f(x)$ определена на $(-\infty; -3,5) \cup (-3,5; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x = -3$ и $x = 3$.
 $x \in (-\infty; -3,5) \cup (-3; 3)$. Ответ: $(-\infty; -3,5) \cup (-3; 3)$.

2. $49^{x+1} = (1/7)^x; 7^{2(x+1)} = 7^{-x}, 2x+2 = -x, x = -2/3$. Ответ: $-2/3$.

3. $\cos x + \sin(\frac{\pi}{2} - x) + \cos(\pi + x) = 0; \cos x + \cos x - \cos x = 0;$

$\cos x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4.



5. $v = S'(t), S' = 1 + t, v(4) = 1 + 4 = 5$ (м/с). Ответ: 5 м/с.

Вариант 20.

1. $\frac{x^2 - 3x + 5}{x - 1} > 0$. Решим уравнение $x^2 - 3x + 5 = 0$.

$D = 9 - 4 \cdot 5 = -11$. $x^2 - 3x + 5 > 0$. т.к. $D < 0$. Тогда неравенство

$\frac{x^2 - 3x + 5}{x - 1} > 0$ равносильно неравенству $x - 1 > 0$, $x > 1$. Ответ: $(1; \infty)$.

2. $\log_5(3x+1) < 2$; $\begin{cases} \log_5(3x+1) < \log_5 25, \\ 3x+1 > 0; \end{cases} \begin{cases} 3x+1 < 25, \\ x > -\frac{1}{3}; \end{cases} \begin{cases} x < 8, \\ x > -\frac{1}{3}; \end{cases}$

$-\frac{1}{3} < x < 8$. Ответ: $(-\frac{1}{3}; 8)$.

3. $\cos x = \frac{8}{17}$, $-\frac{\pi}{2} < x < 0$. Учитывая условие $-\frac{\pi}{2} < x < 0$,

имеем: $\sin x = -\sqrt{1 - \cos^2 x}$; $\sin x = -\sqrt{1 - (\frac{8}{17})^2} = -\frac{3 \cdot 5}{17} = -\frac{15}{17}$.


Ответ: $-\frac{15}{17}$.

4. $f(x) = 6x + 18$; $f'(x) = 0$ при $x = -3$ на отрезке $[-5; -1]$.

$x = -5, y = -8$; $x = -3, y = -20$; $x = -1, y = -8$. Ответ: -20 .

5. $f(x) = x + 5$; $F(x) = \frac{x^2}{2} + 5x + C$. Ответ: $\frac{x^2}{2} + 5x + C$.

Вариант 21.

 1. $y = \lg \frac{2x - 3}{x + 7}$; $\begin{cases} \frac{2x - 3}{x + 7} > 0, \\ x + 7 \neq 0; \end{cases}$

$x \in (-\infty; -7) \cup (1,5; \infty)$. Ответ: $(-\infty; -7) \cup (1,5; \infty)$.

2. $27^{1+2x} > (\frac{1}{9})^{2+x}$; $3^{3(1+2x)} > 3^{-2(2+x)}$; $3+6x > -4-2x$; $8x > -7$; $x > -\frac{7}{8}$.

Ответ: $(-0,875; \infty)$.

3. $7\cos(x - \frac{3\pi}{2}) + 5\sin x + 1 = 0$; $-7\sin x + 5\sin x + 1 = 0$;

$\sin x = \frac{1}{2}$; $x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $(-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-3, 5; 5]$; б) $-2 < f(x) \leq 1$ при $x \in [-3, 1; 0] \cup [2, 1; 3, 5)$;
 в) функция возрастает на промежутке $[-2; 1]$;
 функция убывает на промежутках $[-3, 5; -2]$ и $[1; 5]$;
 г) $f(x) = 0$ при $x = -2$; д) $\max f(x) = f(1) = 5, 5$; $\min f(x) = f(5) = -3$.
 5. $f(x) = 3x - 5$;

$$F(x) = \frac{3x^2}{2} - 5x + C; \quad \frac{3(4)^2}{2} - 5 \cdot 4 + C = 10; \quad 24 - 20 + C = 10; \quad C = 6.$$

Ответ: $F(x) = 1,5x^2 - 5x + 6$.

Вариант 22.

$$1. a^{\frac{5}{6}} b^{\frac{7}{12}} a^{\frac{3}{4}} b^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{5}{6} + \frac{3}{4}} b^{\frac{7}{12} + \frac{2}{3}} = a^{\frac{10+9}{12}} b^{\frac{7+8}{12}} = a^{\frac{19}{12}} b^{\frac{15}{12}}.$$

Ответ: $a^{\frac{19}{12}} b^{\frac{5}{4}}$.

2. $\log_5(4x+1) > -1$;

$$\begin{cases} \log_5(4x+1) > \log_5 \frac{1}{5}, & \begin{cases} 4x+1 > 0, 2, \\ 4x+1 > 0, \end{cases} \\ 4x+1 > 0; & \begin{cases} 4x > -0,8; \\ x > -0,2. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $(-0,2; \infty)$.

3. $\operatorname{tg}x - \operatorname{ctg}(\frac{\pi}{2} + x) + 2 = 0$; $\operatorname{tg}x + \operatorname{tg}x + 2 = 0$; $\operatorname{tg}x = -1$. $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Отрезку $[0; 2\pi]$ принадлежат $x = \frac{3\pi}{4}$ ($k=1$) и $x = \frac{7\pi}{4}$ ($k=2$).

Ответ: $\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.


4. $f(x) = 2x^2 - x + 1$; $f'(x) = 4x - 1$. $4x - 1 = 7$; $x = 2$; $f(2) = 7$. Ответ: (2; 7).

5. $f(x) = 2x - x^2$.

Найдем абсциссы точек пересечения графика функции с осью абсцисс: $2x - x^2 = 0$; $x_1 = 0$ или $x_2 = 2$.

$$S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = x^2 - \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$$

Ответ: $\frac{4}{3}$.



Вариант 23.

1. $a^{\frac{9}{2}} b^{\frac{1}{12}} : a^{\frac{19}{4}} b^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{9}{2} - \frac{19}{4}} b^{\frac{1}{12} - \frac{1}{3}} = a^{\frac{18-19}{4}} b^{\frac{1-4}{12}} = a^{-\frac{1}{4}} b^{-\frac{1}{4}}$.


Ответ: $a^{-\frac{1}{4}} b^{-\frac{1}{4}}$.

2. $0,2 \leq 5^{x+4} \leq 125$; $5^{-1} \leq 5^{x+4} \leq 5^3$, $5 > 1$, следовательно,
 $-1 \leq x+4 \leq 3$; $-5 \leq x \leq -1$. Ответ: -5; -4; -3; -2; -1.

3. $(\sin x + \cos x)^2 - 1 = 0$, $[0, 2\pi]$; $1 + \sin 2x - 1 = 0$; $\sin 2x = 0$, $2x = \pi k$;
 Отрезку $[0, 2\pi]$ принадлежат только корни: $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$

Ответ: $0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3}{2}\pi; 2\pi$.

4.



5. $f(x) = 4\cos x + 3$, $x = -\frac{\pi}{3}$; $f'(x) = -4\sin x$; $k = f'(-\frac{\pi}{3})$;

$k = -4\sin(-\frac{\pi}{3}) = 4\sin\frac{\pi}{3} = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$. Ответ: $2\sqrt{3}$.

Вариант 24.

1. $a^{\frac{3}{4}} b^{\frac{5}{24}} : a^{\frac{5}{12}} b^{\frac{1}{8}} = a^{\frac{3}{4} - \frac{5}{12}} b^{\frac{5}{24} - \frac{1}{8}} = a^{\frac{9-5}{12}} b^{\frac{5-3}{24}} = a^{\frac{4}{12}} b^{\frac{2}{24}} = a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{12}}$. Ответ: $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{12}}$.

2. $\log_5(2x+3) > -3$;

$$\begin{cases} \log_5(2x+3) > \log_5 5^{-3}, & \begin{cases} 2x+3 < 125, & \begin{cases} x < 61, \\ x > -1,5; \end{cases} \\ 2x+3 > 0; & \begin{cases} x > -1,5; \\ x > -1,5; \end{cases} \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} x < 61, \\ -1,5 < x < 61. \end{cases}$$

Ответ: $(-1,5; 61)$.

3. $\sin(\pi + x) = \cos(-\frac{\pi}{3})$; $-\sin x = \frac{1}{2}$; $\sin x = -\frac{1}{2}$;

$x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4. $f(x) = x^2 - 4$; $x^2 - 4 = 0$; $x_1 = 2, y_1 = -3 \frac{1}{3}$; $x_2 = -2, y_2 = 7 \frac{1}{3}$.


Ответ: $(2; -3 \frac{1}{3}), (-2; 7 \frac{1}{3})$.

5. $f(x) = x^4 + 3x$; $F(x) = \frac{x^5}{5} + 3 \frac{x^2}{2} + C$. Ответ: $\frac{x^5}{5} + 3 \frac{x^2}{2} + C$.

Вариант 25.

1. $\frac{2x^2 - 1}{x - 8} > 0$; $\frac{2(x - \frac{1}{\sqrt{2}})(x + \frac{1}{\sqrt{2}})}{x - 8} > 0$;

$x \in (-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}) \cup (8; \infty)$.



Ответ: $(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}) \cup (8; \infty)$.


2. $\log_{0.5}(2x) > 2$;

$\begin{cases} \log_{0.5}(2x) > \log_{0.5} \frac{1}{4} \\ 2x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x < \frac{1}{4} \\ x > 0 \end{cases}, \begin{cases} x < \frac{1}{8} \\ x > 0 \end{cases}, 0 < x < \frac{1}{8}$. Ответ: $(0; \frac{1}{8})$.

3. $(\cos x - 1)^2 = \cos^2 x - 1$; $\cos^2 x - 2\cos x + 1 = \cos^2 x - 1$;

$2\cos x = 2$; $\cos x = 1$; $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Ответ: $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

4.



StudyPort.ru

5. $y = \sin x$, $y = x+1$, $y = e^x$, $y = \sqrt{x}$;

а) $y = \sin x$; $y' = \cos x$; $\cos x > 0$ не на всей области определения; $(-\infty; \infty)$;

б) $y = x+1$; $y' = 1$; $1 > 0$ – на всей области определения $(-\infty; \infty)$;

в) $y = e^x$; $y' = e^x$; $e^x > 0$ – на всей области определения $(-\infty; \infty)$;


г) $y = \sqrt{x}$; $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $\frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$ – на всей области определения $(0; \infty)$;

Ответ: $y = x+1$; $y = e^x$; $y = \sqrt{x}$.

Вариант 26.

1. $\frac{11x^2 - x}{2+x} \leq 0$; $\frac{x(11x-1)}{2+x} \leq 0$. Пусть $f(x) = \frac{x(11x-1)}{2+x}$;

$f(x)$ определена на $(-\infty; -2) \cup (-2; \infty)$;



Ответ: $(-\infty; -2) \cup [0; \frac{1}{11}]$.

2. $\frac{1}{2} \log_2(3x-2) = 3$;

$$\begin{cases} \log_2(3x-2) = 6, \\ 3x-2 > 0; \end{cases} \begin{cases} \log_2(3x-2) = \log_2 64, \\ x > \frac{2}{3}; \end{cases} \begin{cases} 3x-2 = 64, \\ x > \frac{2}{3}; \end{cases} \quad x=22.$$

3. $\sin \frac{x}{2} + 1 = 0$; $\sin \frac{x}{2} = -1$, $\frac{x}{2} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $x = -\pi + 4\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.


Ответ: $-\pi + 4\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [2,5; 6,5]$; б) $f(x) < 1$ при $x \in (-1,5; 3,3)$;

в) $f'(x) < 0$ при $x \in (-2,5; 1,2)$; $f'(x) > 0$ при $x \in (1,2; 6,5)$;

г) касательные параллельны оси абсцисс в точке $x = 1,2$;


д) $\max f(x) = f(-2,5) = 4,5$; $\min f(x) = f(1,2) = -2$.



$x_2 = 2$; Ответ: возрастает на $[-\frac{4}{3}; 2]$.

Вариант 27.

1. $\frac{4-x^2}{2x-3} > 0; \frac{(x+2)(x-2)}{2x-3} < 0.$



Пусть $f(x) = \frac{(x+2)(x-2)}{2x-3}$,

$f(x)$ определена на $(-\infty; 1,5) \cup (1,5; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x = -2$ и $x = 2$.
 $x \in (-\infty; -2) \cup (1,5; 2)$. Ответ: $(-\infty; -2) \cup (1,5; 2)$.

2. $9 \cdot 81^{1-2x} = 27^{2-x}$; $3^2 \cdot 3^{4(1-2x)} = 3^{3(2-x)}$; $3^{2+4-8x} = 3^{6-3x}$;
 $6-8x=6-3x$; $5x=0$; $x=0$; Ответ: 0.

3. $\sin x + \sin(\pi+x) - 2\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = 1$; $\sin x - \sin x - 2\sin x = 1$;

$2\sin x = -1$; $\sin x = -\frac{1}{2}$; $x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(y) = [-3,5; 4,5]$; б) $f(x) < -1$ при $1,7 < x < 3,1$;

в) $f(x) < 0$ на промежутке $(-1,5; 2,5)$;

$f(x) > 0$ на промежутках $(-3,5; -1,5)$ и $(2,5; 4,5)$;

г) касательные к графику параллельны оси абсцисс в точках $x = -1,5$ и $x = 2,5$; д) $\max f(x) = f(4,5) = 6$; $\min f(x) = f(2,5) = -1,5$.


5. $f(x) = 4x - x^2$; $F(x) = 4 \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + C$. Ответ: $2x^2 - \frac{x^3}{3} + C$.

Вариант 28.

1. $\frac{3x^2+4x-4}{8+15x} < 0. 3x^2+4x-4 = 0.$

$D = 16 + 4 \cdot 12 = 64, x_{1,2} = \frac{-4 \pm 8}{6}, x_1 = -2, x_2 = \frac{2}{3}$

Пусть $f(x) = \frac{3(x+2)(x-\frac{2}{3})}{15(x+\frac{8}{15})} < 0;$



$f(x)$ определена на $(-\infty; -\frac{8}{15})$ и $(-\frac{8}{15}; \infty)$;

$$f(x) = 0 \text{ при } x = -2 \text{ и } x = \frac{2}{3}; x \in (-\infty; -2) \cup (-\frac{8}{15}; \frac{2}{3}).$$

$$\text{Ответ: } (-\infty; -2) \cup (-\frac{8}{15}; \frac{2}{3}).$$

2. $-\log_7(5-x) = \log_7 2 - 1; x < 5; \log_7 2 + \log_7(5-x) = \log_7 7;$
 $2(5-x) = 7; 10 - 2x = 7; x = 1,5$ – удовлетворяет области определения.
 Ответ: 1,5.


3. $\cos x = -\frac{5}{13}, \pi < x < \frac{3\pi}{2}$. Учитывая условие, $\sin x = -\sqrt{1 - \cos^2 x}$;

$$\sin x = -\sqrt{1 - (\frac{5}{13})^2}; \sin x = -\sqrt{\frac{18 \cdot 8}{13^2}} = -\frac{3 \cdot 4}{13} = -\frac{12}{13}.$$

4. а) $D(f) = [-3; 6]$; б) $f(x) > 1$ при $x \in [-3; 0,5) \cup (5,3; 6]$;
 в) функция возрастает на промежутке $[3,25; 6]$;
 функция убывает на промежутке $[-3; 3,25]$;
 г) касательная к графику параллельна оси абсцисс в точках $x = 3,25$;
 д) $\max f(x) = f(6) = 5,5; \min f(x) = f(3,25) = -2,5$.
 5. $F(x) = x^3 + 3x - 5; f(x) = 3(x^2 + 1)$. $F'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1) = f(x)$
 Ответ: является.

Вариант 29.

1. $y = \ln \frac{3x + 4}{5 - x}$;



$$\begin{cases} \frac{3x + 4}{5 - x} > 0, \\ \frac{3(x + \frac{4}{3})}{x - 5} < 0, \\ x \neq 5; \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (-1 \frac{1}{3}; 5).$$

2. $(\frac{1}{4})^{2+3x} < 8^{x-1}; 2^{-2(2+3x)} < 2^{3(x-1)}; (2 > 1);$
 $-4 - 6x < 3x - 3; 9x > -1; x > -\frac{1}{9}$. Ответ: $(-\frac{1}{9}; \infty)$.


3. $4\cos^2 x - 3 = 0; \cos^2 x = \frac{3}{4}; \cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{Ответ: } \pm \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

4. а) $D(f) = [-3; 5,5]$; б) $f(x) < -1$ при $x \in [-3; -2,3) \cup (2,25; 5,5]$;
 в) функция возрастает на промежутке $[-3; -1]$ и убывает на промежутке $[-1; 5,5]$;
 г) касательные к графику параллельны оси абсцисс в точках $x = -1$ и $x = 3,5$; д) $\max f(x) = f(-1) = 3,5$; $\min f(x) = f(-3) = -5$.
 5. $f(x) = 2x^3 - \frac{1}{2}x^4 - 8$; $f'(x) = 6x^2 - 2x^3$; $f'(x) = 0$: $2x^2(3-x) = 0$; $x = 0$ или $x = 3$.
 Точка $x = 3$ – точка экстремума функции. Ответ: 3.

Вариант 30.

1. $\frac{(x-5)(2x+7)}{4-x} \geq 0$;
 $\frac{(x-5)(2x+7)}{x-4} \leq 0$.



Пусть $f(x) = \frac{(x-5)(2x+7)}{x-4}$; $f(x)$ определена на $(-\infty; 4) \cup (4; \infty)$;

$f(x) = 0$ при $x = 5$ и $x = -3,5$; $x \in (-\infty; -3,5] \cup (4; 5]$.

Ответ: $(-\infty; -3,5] \cup (4; 5]$.

2. $7^{x^2} - 14 \cdot 7^x = 5$; $49 \cdot 7^x - 14 \cdot 7^x = 5$; $35 \cdot 7^x = 5$; $7^x = 7^{-1}$; $x = -1$.

Ответ: -1 .

3. $\sin x = \frac{12}{13}$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$; $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - (\frac{12}{13})^2}$;

$\cos x = \frac{5 \cdot 1}{13}$; $\cos x = \frac{5}{13}$. Ответ: $\frac{5}{13}$.

4. а) $D(f) = [-3; 6]$;

б) $f(x) < -1$ при $x \in [-3; -1) \cup (3,2; 5)$;

в) функция возрастает на промежутках $[-3; 1]$ и $[4; 6]$, убывает на промежутке $[1, 4]$;

г) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x = 1$ и $x = 4$;

д) $\max f(x) = 4$; $\min f(x) = f(-3) = -4,5$.

5. $S = 3t + t^2$ (м); $v = S'(t)$; $S'(t) = 3 + 2t$, $v = S'(3) = 3 + 2 \cdot 3 = 9$ (м/с).

Ответ: 9 м/с.

Вариант 31.

1. $7^{0,5 \log_7 9} = 7^{\log_7 3} = 3$. Ответ: 3.

2. $1 \leq 7^{x-3} < 49$; $7^0 \leq 7^{x-3} < 7^2$; $0 \leq x-3 < 2$; $3 \leq x < 5$.

Множеству целых чисел принадлежат $x = 3$ и $x = 4$. Ответ: 3; 4.

3. $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = 2\sin x + 1$; $\sin x = 2\sin x + 1$; $\sin x = -1$;

$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-3, 5; 5]$; б) $f(x) > 3,5$ при $x \in (-2, 5; 0) \cup (4; 5)$;

в) $f(x) < 0$ на промежутке $(-1, 5; 2, 5)$;

$f(x) > 0$ на промежутках $(-3, 5; -1, 5)$ и $(2, 5; 5)$.

г) касательная параллельна оси абсцисс в точке $x = -1, 5$;

д) $\max f(x) = f(5) = 6$; $\min f(x) = f(2, 5) = -2$.

5. $f(x) = 5 + 4x - 3x^2$; $f'(x) = 4 - 6x$;

$k = f'(x) = -5$; $4 - 6x = -5, x = 1, 5$; $f(1, 5) = 4, 25$. Ответ: $(1, 5; 4, 25)$.

Вариант 32.

1. $\frac{(a^2 b^2)^{\frac{1}{4}}}{\frac{1}{a^2 b^8}}$ при $a=7, b=2$; $\frac{(a^2 b^2)^{\frac{1}{4}}}{\frac{1}{a^2 b^8}} = \frac{a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{a^2 b^8}} = \frac{1}{b}$. При $b=2, \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$.

Ответ: $\frac{1}{2}$.


2. $2 \lg 6 - \lg x > 3 \lg 2$; $\begin{cases} \lg 36 - \lg x > 3 \lg 2, \\ x > 0; \end{cases} \begin{cases} \frac{36}{x} > 8, \\ x > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 4, 5, \\ x > 0; \end{cases}$

$0 < x < 4, 5$. Ответ: $(0; 4, 5)$.

3. $\cos(\pi + x) = \sin \frac{\pi}{2}$; $-\cos x = 1$; $\cos x = -1$; $x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4.



5. $F(x) = x^4 - 3x^2 + 1$; $f(x) = 4x^3 - x^2 + x$;


$F'(x) = 4x^3 - 6x$. Т. к. $F'(x) \neq f(x)$, то функция $F(x)$ не является первообразной функции $f(x)$. Ответ: не является.

24

Вариант 33.

1. $y = \lg(x^2 - 7x); x^2 - 7x > 0; x(x - 7) > 0;$

Ответ: $(-\infty; 0) \cup (7; \infty)$.




2. $\frac{1}{6} < 6^{3-x} \leq 36; 6^{-1} < 6^{3-x} \leq 6^2$, т. к. $6 > 1$;

$-1 < 3 - x \leq 2; -4 < -x \leq -1; 1 \leq x < 4$. Ответ: 1; 2; 3.

3. $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha} - \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha - 1 + \sin^2 \alpha}{\cos \alpha(1 - \sin \alpha)} = \frac{1 - 1}{\cos \alpha(1 - \sin \alpha)} = 0;$

Следовательно, $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha}$.

4.



5. $f(x) = 3 - 3x - 2x^2; f'(x) = -3 - 4x;$

$k = f'(x) = 5; -3 - 4x = 5; 74x = -8; x = -2; f(-2) = 1$. Ответ: $(-2; 1)$.

Вариант 34.

1. $\frac{x^2 + 5x}{2 - 8x} > 0; \frac{x(x+5)}{2(4x-1)} < 0.$

Пусть $f(x) = \frac{x(x+5)}{2(4x-1)}$;

$f(x)$ определена на $(-\infty; 0,25) \cup (0,25; \infty)$; $f(x) = 0$ при $x = 0$ и $x = -5$.

Ответ: $(-\infty; -5) \cup (0; 0,25)$.



2. $\frac{1}{3} \log_3(2x+1) = 1;$

$\begin{cases} \log_3(2x+1) = \log_3 27, \\ 2x+1 > 0; \end{cases} \begin{cases} 2x+1 = 27, \\ x > -0,5; \end{cases} \begin{cases} x = 13, \\ x > -0,5; \end{cases} x = 13.$

3. $2\sin x + \sqrt{2} = 0$; $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; $x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Из множества этих корней, только корни $x = \frac{5\pi}{4}$, и $x = \frac{7\pi}{4}$

принадлежат отрезку $[0; 2\pi]$. Ответ: $\frac{5\pi}{4}$; $\frac{7\pi}{4}$.

4. а) $D(f) = [-3; 6]$;

б) $f(x) > 0$ при $x \in (-3; 0,7) \cup (4,5; 6)$; $f'(x) < 0$ при $x \in (0,7; 4,5)$;


в) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x=0,7$ и $x=4,5$;

г) $f(x) \leq -2$ при $-3 \leq x < -2$; д) $\max f(x) = f(0,7) = 3$; $\min f(x) = f(-3) = -4,5$.

5. $f(x) = 2x + x^2$; $F(x) = \frac{x^3}{3} + 2 \frac{x^2}{2} + C$; $F(x) = \frac{x^3}{3} + x^2 + C$.

Ответ: $\frac{x^3}{3} + x^2 + C$.

Вариант 35.



1. $\frac{24 - 6x^2}{2x + 9} < 0$;

$\frac{6(x+2)(x-2)}{2(x+4,5)} > 0$.

Пусть $f(x) = \frac{6(x+2)(x-2)}{2(x+4,5)}$; $f(x)$ определена на $(-\infty; -4,5) \cup (-4,5; \infty)$;

$f(x) = 0$ при $x = -2$ и $x = 2$. $x \in (-4,5; -2) \cup (2; \infty)$.

Ответ: $(-4,5; -2) \cup (2; \infty)$.

2. $2^{x+4} - 2^x = 120$; $16 \cdot 2^x - 2^x = 120$; $2^x = 8$; $2^x = 2^3$; $x = 3$. Ответ: 3.

3. $\cos x - \sin(\frac{\pi}{2} - x) + \sin(\pi - x) = 0$; $\cos x - \cos x + \sin x = 0$;

$\sin x = 0$; $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: πk , $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-3; 5,5]$; б) $f(x) \geq 1,5$ на промежутках $[-2; 0]$ и $[4,4; 5,5]$;

в) $f(x) > 0$ на промежутках $(-3; -1)$ и $(2,5; 5,5)$;

$f'(x) < 0$ на промежутке $(-1; 2,5)$;

г) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x = -1$ и $x = 2,5$;

д) $\max f(x) = f(5,5) = 5,5$; $\min f(x) = f(2,5) = -3$.


5. $f(x) = 3(x^2 - 2)$, $g(x) = 3x(x^2 - 2)$, $q(x) = 3x^2 - 6x + 1$; $F(x) = x^3 - 3x^2 + 1$;

$F'(x) = 3x^2 - 6x$.

Т.к. $F'(x) \neq f(x)$, $F'(x) \neq g(x)$ и $F'(x) \neq q(x)$, то ни для одной из приведенных функций функция $F(x)$ не является первообразной.
 Ответ: не является для данных функций.

Вариант 36.

1. $\frac{x^2 - 14x - 15}{10 - 4x} > 0;$
 $\frac{x^2 - 14x - 15}{4(x - 2,5)} < 0.$



Пусть $f(x) = \frac{x^2 - 14x - 15}{4(x - 2,5)}$;

$f(x)$ определена на $(-\infty; 2,5) \cup (2,5; \infty)$. $f(x) = 0$ при $x = 15$ и $x = -1$;

Ответ: $(-\infty; -1) \cup (2,5; 15)$.

2. $\lg(x + 3) = 3 + 2\lg 5;$

$\begin{cases} \lg(x + 3) = \lg 1000 + \lg 25, & \begin{cases} x + 3 = 25000, \\ x > -3; \end{cases} \\ x + 3 > 0; \end{cases} \quad x = 24997. \text{ Ответ: } 24997.$

3. $\frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} - \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha - 1 + \cos^2 \alpha}{(1 - \cos \alpha) \sin \alpha} = 0.$

4. а) $D(f) = [-2,5; 6,5]$; б) $f(x) \leq 0,5$ при $x \in [-1,5; 2,3] \cup [4,7; 6,5]$;

в) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x = 1; 3,5$.

г) промежуток возрастания $- [1; 3,5]$;

промежутки убывания $- [-2,5; 1]$ и $[3,5; 6,5]$;


д) $\max f(x) = f(-2,5) = 4,5$; $\min f(x) = f(1) = -2$.

5. $f(x) = x - 2x^3$; $F(x) = \frac{x^2}{2} - 2 \frac{x^4}{4} + C$; $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} + C.$

$3 = \frac{0}{2} - \frac{0}{2} + C$; $C = 3$. Ответ: $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} + 3.$

Вариант 37.

1. $y = \ln \frac{x+5}{7x-1}; \frac{x+5}{7x-1} > 0;$



Ответ: $(-\infty; -5) \cup (\frac{1}{7}; \infty)$.

2. $8 \cdot 2^{x-1} - 2^x > 48$; $4 \cdot 2^x - 2^x > 48$; $2^x > 16$; $2^x > 2^4$; $x > 4$. Ответ: $(4; \infty)$.

3. $\sin^2 x - 6\sin x = 0; \sin x (\sin x - 6) = 0;$

$$\begin{cases} \sin x = 0, & (1) \\ \sin x - 6 = 0 & (2) \end{cases}$$

(2) – не имеет решений, т.к. $|\sin x| \leq 1;$

(1): $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}.$

Ответ: $\pi k, k \in \mathbb{Z}.$

4. а) $D(f) = [-3, 5];$ б) $f(x) \leq 0,5$ при $x \in [0, 5; 2, 6]$ и $x \in [3, 8; 5];$

в) точки экстремума функции: $x = -1, 5; 1, 5;$

г) промежутки возрастания: $[-3, 5; -1, 5]$ и $[1, 5; 3, 5];$

промежутки убывания: $[-1, 5; 1, 5]$ и $[3, 5; 5];$

д) $\max f(x) = f(-1, 5) = 5, 5; \min f(x) = f(5) = -3.$

5. $S = 5t - 0,5t^2$ (м); $v(t) = S'(t); S'(t) = 5 - t, v(4) = S'(4) = 5 - 4 = 1$ (м/с).

Ответ: 1 м/с.

Вариант 38.

1. $6^{\frac{1}{3}} \cdot 18^{\frac{1}{3}} \cdot 4^{\frac{1}{6}} = 6^{\frac{1}{3}} \cdot 6^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} = 6.$ Ответ: 6.

2. $\log_{0,1} x > -1; \begin{cases} \log_{0,1} x > \log_{0,1} 10; & \begin{cases} x < 10 & (\text{т.к. } a = 0,1 < 1), \\ x > 0; \end{cases} \\ x > 0; & \begin{cases} x < 10 \\ 0 < x < 10. \end{cases} \end{cases}$

Ответ: $(0; 10).$

3. $(1 + \sin x)(1 + \cos x) = 1 + \sin x + \cos x, [0; 2\pi];$

$1 + \cos x + \sin x + \sin x \cos x = 1 + \sin x + \cos x; \sin x \cos x = 0.$

Уравнение равносильно системе $\begin{cases} \sin x = 0, \\ \cos x = 0; \end{cases} \begin{cases} x = \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$

Из этих корней, отрезку $[0; 2\pi]$ принадлежат только корни: $0; \frac{\pi}{2};$

$\pi; \frac{3\pi}{2}; 2\pi$

4. а) $D(f) = [-3; 6];$ б) $f(x) \leq 0$ при $x \in [-3; 0] \cup [2, 5; 5, 5];$

в) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x = -1, 5$ и $x = 4;$

г) функция возрастает на промежутках $[-3; 1, 5]$ и $[4; 6],$ функция убывает на промежутке $[1, 5; 4];$

д) $\max f(x) = f(1, 5) = 3, 5; \min f(x) = f(-3) = -5.$


5. $S = 0,5t^2 + 3t + 4$ (м);

$v(t) = S'(t); S'(t) = t + 3, v(2) = S'(2) = 5$ (м/с).

Ответ: 5 м/с.

Вариант 39.

1. $\frac{(x+11)(2x-5)}{3x} \leq 0$.



Пусть $f(x) = \frac{(x+11)(2x-5)}{3x}$;

$f(x)$ определена на $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$, $f(x)=0$ при $x=-11$ и $x=2,5$.

Ответ: $(-\infty; -11] \cup (0; 2,5]$.

2. $10 \cdot 5^{x-1} + 5^{x+1} = 7$; $2 \cdot 5^x + 5 \cdot 5^x = 7$; $7 \cdot 5^x = 7$; $5^x = 5^0$; $x = 0$.

Ответ: 0.

3. $2 \cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sqrt{2}$; $2 \sin x = \sqrt{2}$; $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $x = (-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $(-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-3,5; 5]$; б) $f(x) \leq 0$ при $x \in [-3; -0,4] \cup [2,5; 5]$;

в) точки экстремума функции: $x = -1,5$ и $x = 1$

г) функция возрастает на промежутке $[-1,5; 1]$ и убывает на промежутках $[-3,5; -1,5]$ и $[1; 5]$;

д) $\max f(x) = f(1) = 4,5$; $\min f(x) = f(5) = -3$.

5. $f(x) = \operatorname{tg}(x) - 2 \sin x$; $x = -\frac{\pi}{4}$;

$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 2 \cos x$; $f'(-\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\cos^2(-\frac{\pi}{4})} = 2 - \sqrt{2}$. Ответ: $2 - \sqrt{2}$.

Вариант 40.

1. $10^4 \cdot 40^4 \cdot 5^2 = 10^2 \cdot 2^2 \cdot 5^2 = 10$. Ответ: 10.


2. $\frac{1}{2} \lg 81 - \lg x > \lg 2$; $\begin{cases} \lg 9 - \lg x > \lg 2, \\ x > 0; \end{cases} \begin{cases} \frac{9}{x} > 2, \\ x > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 4,5, \\ x > 0; \end{cases} 0 < x < 4,5$.

Ответ: $(0; 4,5)$.

3. $\sin(-x) = \cos \pi$; $-\sin x = -1$; $\sin x = 1$; $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.


Ответ: $\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4.



5. $f(x) = 3 + 7x - 4x^2$; $f'(x) = 7 - 8x$;
 $k = f'(x) = -9$; $7 - 8x = -9$; $x = 2$; $f(2) = 1$. Ответ: (2; 1).

Вариант 41.




1. $y = \lg(4x^2 + 11x)$;
 $4x^2 + 11x > 0$; $4x(x + 2,75) > 0$;
 Ответ: $(-\infty; -2,75) \cup (0; \infty)$.

2. $0,01 < 10^{2+x} < 10000$; $10^{-2} < 10^{2+x} < 10^4$.
 Т.к. $10 > 1$, то $-2 < 2 + x < 4$, $-4 < x < 2$. Ответ: -3; -2; -1; 0; 1.

3. $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$, $[0; 2\pi]$; $x = \frac{\pi}{3} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Отрезку $[0, 2\pi]$ принадлежат

только $\frac{\pi}{3}$ и $\frac{4\pi}{3}$. Ответ: $\frac{\pi}{3}$; $\frac{4}{3}\pi$.

4.



StudyPort.ru

5. а) $y = 3x - 2$; $D(y) = \mathbb{R}$; $y' = 3$; $3 > 0$ – функция возрастает на \mathbb{R} ;

б) $y = -5x + 9$; $D(y) = \mathbb{R}$; $y' = -5$; $-5 < 0$ – функция убывает на \mathbb{R} ;

в) $y = x^2$; $D(y) = \mathbb{R}$; $y' = 2x$.

Функция убывает на $(-\infty; 0]$

и возрастает на $[0; +\infty)$.



г) $y = -x^3 + x$; $D(y) = \mathbb{R}$; $y' = -3x^2 + 1$;

$$-3(x - \frac{1}{\sqrt{3}})(x + \frac{1}{\sqrt{3}}) = 0.$$

Функция убывает только на


$$(-\infty; -\frac{1}{\sqrt{3}}] \cup [\frac{1}{\sqrt{3}}; +\infty). \text{ Ответ: } y = -$$

$5x + 9.$



Вариант 42.

1. $\frac{x^2 + 10x}{2 - 5x} < 0;$



Пусть $f(x) = \frac{x^2 + 10x}{2 - 5x}$.

Функция $f(x)$ определена на промежутке $(-\infty; 0,4) \cup (0,4; \infty)$;

$f(x) = 0$ при $x = 0$ и $x = -10$. Решим неравенство $\frac{x(x+10)}{5(x-0,4)} > 0$

методом интервалов. Ответ: $(-10; 0) \cup (0,4; \infty)$.

2. $\log_2(2x+1) = \log_2 3 + 1$; $\log_2(2x+1) = \log_2 3 + \log_2 2$; $\log_2(2x+1) = \log_2 6$;

$2x+1=6$; $x=2,5$; $2 \cdot 2,5+1=6 > 0$. Ответ: 2,5.

3. $2\sin \frac{x}{4} - \sqrt{3} = 0$; $\sin \frac{x}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\frac{x}{4} = (-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k$,

$x = (-1)^k \frac{4\pi}{3} + 4\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $x = (-1)^k \frac{4\pi}{3} + 4\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-4,5; 4,5]$;

б) $f'(x) > 0$ на промежутке $(-1; 3)$, $f'(x) < 0$ на каждом из промежутков $(-4,5; -1)$ и $(3; 4,5)$;

в) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x = -1$ и $x = 3$;

г) $f(x) \geq 2$ при $x \in [-4,5; -3,5] \cup \{3\}$;


д) $\max f(x) = f(-4,5) = 3,5$; $\min f(x) = f(-1) = -4,5$.

5. $F(x) = x^4 - 4x^2 + 1$; $F'(x) = 4x^3 - 8x$.

Т.к. $F'(x) = q(x)$, то функция $F(x)$ является первообразной для

функции $q(x)$. Ответ: $q(x)$.

Вариант 43.



1. $\frac{4-49x^2}{x-5} > 0$.

Пусть $f(x) = \frac{4-49x^2}{x-5}$.

Функция $f(x)$ определена на промежутке $(-\infty; 5) \cup (5; \infty)$;

$f(x) = 0$ при $x = \pm \frac{2}{7}$. Решим неравенство $(x - \frac{2}{7})(x + \frac{2}{7})(x - 5) < 0$

методом интервалов. Ответ: $(-\infty; -\frac{2}{7}) \cup (\frac{2}{7}; 5)$.

2. $7^x - (\frac{1}{7})^{1-x} = 6$; $7^x - \frac{1}{7} \cdot 7^x = 6$; $\frac{6}{7} \cdot 7^x = 6$; $7^x = 7$; $x = 1$. Ответ: 1.

3. $\sin x + \cos(2\pi + x) - \cos(\frac{\pi}{2} - x) = -1$; $\sin x + \cos x - \sin x = -1$,

$\cos x = -1$; $x = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-4; 4,5]$; б) $f(x) \geq 1$ при $x \in [-3; 4,5]$;

в) $f'(x) > 0$ на промежутках $(-4; -1) \cup (3; 4,5)$,

$f'(x) < 0$ на промежутке $(-1; 3)$;

г) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x = -1$ и $x = 3$.


д) $\max f(x) = f(-1) = 5,5$; $\min f(x) = f(-4) = -3$.

5. $y = -3x^3 + 6x^2 - 5x$; $y' = -9x^2 + 12x - 5$; $-9x^2 + 12x - 5 < 0$;

$9x^2 - 12x + 5 > 0$; $9x^2 - 12x + 5 = 0$; $\frac{D}{4} = 36 - 45 = -9 < 0$.

Значит, $9x^2 - 12x + 5 > 0$ или $y' < 0$ при любых действительных значениях x . Ответ: убывает на $(-\infty; \infty)$.

Вариант 44.



1. $\frac{4x^2 - 16x + 7}{3(x+2)} < 0$.

Найдем корни квадратного трехчлена $4x^2 - 16x + 7$, решив уравнение $4x^2 - 16x + 7 = 0$.


$D = 256 - 112 = 144$; $x_{1,2} = \frac{16 \pm 12}{8}$, $x_1 = 0,5$; $x_2 = 3,5$.

Решим неравенство $(x-0,5)(x-3,5)(x+2) < 0$ методом интервалов:
 $x \in (-\infty; -2) \cup (0,5; 3,5)$. Ответ: $(-\infty; -2) \cup (0,5; 3,5)$.
 2. $\lg(4x-2)=5\lg 2-3$; $\lg(4x-2)=\lg 32-\lg 1000$; $4x-2=0,032$;
 $x=0,508$; при $x=0,508$: $4x-2=4 \cdot 0,508-2 > 0$. Ответ: $0,508$.
 3. $(\sin^2 a - \cos^2 a)(\sin^2 a + \cos^2 a) + 2\cos^2 a = \sin^2 a - \cos^2 a + 2\cos^2 a =$
 $= \sin^2 a + \cos^2 a = 1$; $1=1$, что и требовалось доказать.
 4. а) $D(f) = [-2; 7]$; б) $f(x) \leq 0,5$ при $x \in [-2; -0,3] \cup [2; 5,5]$;
 в) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x=1$ и $x=3,5$;
 г) функция возрастает на каждом из промежутков $[-2; 1]$ и $[3,5; 7]$;
 функция убывает на из промежутке $[1; 3,5]$;
 д) $\max f(x) = f(7) = 4,5$; $\min f(x) = f(3,5) = -2$.
 5. $S=3^3-3t+4$; $v(t)=S'(t)$; $S'(t)=3t^2-3$, $v(t)=S'(3)=3 \cdot 3^2-3=24$ (м/с).
 Ответ: 24 м/с.

Вариант 45.

1. $\lg \frac{32-8x}{x+1}$; $\frac{32-8x}{x+1} > 0$;

$(32-8x)(x+1) > 0$; $8(x-4)(x+1) < 0$;
 $-1 < x < 4$. Ответ: $(-1; 4)$.



2. $2^{x+1} + \frac{1}{2} \cdot 2^x < 5$; $2 \cdot 2^x + \frac{1}{2} \cdot 2^x < 5$; $2^x < 2$; $x < 1$ (т.к. $2 > 1$). Ответ: $(-\infty; 1)$.

3. $2\cos^2 x - 7\cos x = 0$; $2\cos x (\cos x - 3,5) = 0$;

$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x - 3,5 = 0 \end{cases}$ - не имеет решений, т.к. $|\cos x| \leq 1$;

$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-2,5; 6]$; б) $f(x) \leq -0,5$ при $x \in [-2,5; -1,5] \cup \{1\}$;

в) точки экстремума функции $x = 1$ и $x = 4$; и $x = -1$

г) функция возрастает на каждом из промежутков $[-2,5; -1]$ и $[1; 4]$;
 убывает $[-1; 1]$ и $[4; 6]$;

д) $\max f(x) = f(4) = 5,5$; $\min f(x) = f(-2,5) = -3$.

5. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3$; $f'(x) = 3x^2 - 10x = 5x^2(x-4)$; $f'(x) = 0$ при $x=0$ и $x=4$ -
 точки экстремума функции. Ответ: $x = 0$, $x = 4$.

Вариант 46.

1. $6^2 \cdot 3^2 \cdot (0,25)^4$;

$$6^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot (0,25)^{\frac{1}{4}} = 3^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot (2^{-2})^{\frac{1}{4}} = 3 \cdot 2^{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = 3 \cdot 1 = 3. \quad \text{Ответ: } 3.$$

$$2. \lg(2x+1) < 0; \quad \lg(2x+1) < \lg 1;$$

$$\begin{cases} 2x+1 < 1, & x < 0, \\ 2x+1 > 0, & x > -0,5, \end{cases} \quad -0,5 < x < 0. \quad \text{Ответ: } (-0,5; 0).$$

$$3. (\sin^2 \alpha)^2 + (\cos^2 \alpha)^2 + 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 = 1^2 = 1;$$

1=1, что и требовалось доказать.

$$4. \text{ а) } D(f) = [-3; 6]; \quad \text{ б) } f(x) \geq 1 \text{ при } x \in [-3; -2,5] \cup \{4\};$$


в) касательные параллельны оси абсцисс в точках $x = -1,5$ и $x = 4$;

г) функция возрастает на промежутке $[1,5; 4]$, убывает на каждом из промежутков $[-3; 1,5]$ и $[4; 6]$;

$$\text{д) } \max f(x) = f(-3) = 3,5; \quad \min f(x) = f(1,5) = -5.$$

$$5. f(x) = 5x^2 - 12x + 1; \quad f'(x) = 10x - 12; \quad k = f'(x_0) = 3; \quad 10x_0 - 12 = 3; \\ x_0 = 1,5; \quad f(x_0) = -5,75. \quad \text{Ответ: } (1,5; -5,75).$$

Вариант 47.



$$1. \frac{x(x+2)}{1-2x} > 0; \quad \frac{x(x+2)}{2x-1} < 0.$$

$$\text{Пусть } f(x) = \frac{x(x+2)}{2x-1}.$$

Функция $f(x)$ определена на $(-\infty; 0,5) \cup (0,5; \infty)$;

$f(x) = 0$ при $x = 0$ и $x = -2$. Ответ: $(-\infty; -2) \cup (0; 0,5)$.

$$2. 4 \cdot 3^{x^2+5} \cdot 3^{x+1} - 6 \cdot 3^x = 5; \quad 36 \cdot 3^x + 15 \cdot 3^x - 6 \cdot 3^x = 5; \quad 45 \cdot 3^x = 5;$$

$$3^x = 3^{-2}, \quad x = -2. \quad \text{Ответ: } -2.$$

$$3. 2 \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \sqrt{2}; \quad \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \frac{\pi}{4} + x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z};$$

$$x = -\frac{\pi}{4} \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad \text{Ответ: } 2\pi k; \quad -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$4. \text{ а) } D(f) = [-5; 3,5];$$

$$\text{ б) } f(x) \geq 3 \text{ при } x \in [1,5; 3,5] \text{ и } x = -4;$$

$$\text{ в) } x = -4; \text{ и } x = -1$$

г) функция возрастает на каждом из промежутков $[-5; -4]$ и $[-1; 3,5]$, убывает на промежутке $[-4; -1]$;

$$\text{ д) } \max f(x) = f(3,5) = 4,5; \quad \min f(x) = f(-1) = -3.$$

$$5. f(x) = 3x^2 + 5x - 6;$$

$$f'(x) = 6x + 5, \quad k = f'(x_0) = -7, \quad 6x_0 + 5 = -7, \quad x_0 = -2;$$

$$f(-2) = -4.$$

Ответ: (-2; -4).

Вариант 48.

1. $\frac{a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{5}{3}} + a^{\frac{2}{3}}}, a=3; \frac{a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{5}{3}} + a^{\frac{2}{3}}} = \frac{a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{2}{3}}(a+1)} = \frac{1}{a+1}.$

При $a=3, \frac{1}{a+1} = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}.$ Ответ: $\frac{1}{4}.$


2. $\lg x + 2\lg 2 < 0,5\lg 49 - \lg 5; \lg x + \lg 4 < \lg 7 - \lg 5;$

$\begin{cases} 4x < \frac{7}{5} (a=10 > 1), \\ x > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 0,35, \\ x > 0; \end{cases} \quad 0 < x < 0,35. \quad \text{Ответ: } (0; 0,35).$

3. $\cos(-x) = \cos \frac{\pi}{3}; \cos x = \frac{1}{2}, x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$

4.




5. $f(x) = 3x + \sqrt{3}; f(x) = 3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}; f(16) = 3 + \frac{1}{2\sqrt{16}} = 3 + \frac{1}{8} = 3\frac{1}{8}.$

Ответ: $3\frac{1}{8}.$

Вариант 49.

1. $\frac{(x+10)(2x-3)}{2x} > 0$



Пусть $f(x) = \frac{(x+10)(2x-3)}{2x}$.

Функция $f(x)$ определена на $(-\infty; 0)$ и $(0; \infty)$;

$f(x) = 0$ при $x = -10$ и $x = 1,5$; Ответ: $(-10; 0) \cup (1,5; \infty)$.

2. $4^{5x+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{6-4x}$; $2^{2(5x+1)} = 2^{-(6-4x)}$; $10x+2 = -6+4x$, $6x = -8$, $x = -1\frac{1}{3}$.


Ответ: $-1\frac{1}{3}$.

3. $2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, $[0; 2\pi]$; $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$;

$x - \frac{\pi}{4} = (-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Если $x \in [0; 2\pi]$, то $x - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$

$x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ или $x - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$. Ответ: $\frac{\pi}{2}$; π .

4.




5. $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + x - 1$; $F(x) = \frac{x^4}{2} - 2x^3 + \frac{x^2}{2} - x + C$.

Ответ: $\frac{x^4}{2} - 2x^3 + \frac{x^2}{2} - x + C$.

StudyPort.ru

Вариант 50.



1. $\frac{16x^2 - x}{12 - x} < 0$; $\frac{x(16x - 1)}{x - 12} > 0$.

Пусть $f(x) = \frac{x(16x - 1)}{x - 12}$.

Функция $f(x)$ определена на $(-\infty; 12) \cup (12; \infty)$;

36

$f(x)=0$ при $x=0$ и $x=\frac{1}{16}$; Ответ: $(0; \frac{1}{16}) \cup (12; \infty)$.

2. $\log_3(2x-1) < 3$;

$\log_3(2x-1) < \log_3 27$; $\begin{cases} 2x-1 < 27 \ (3 > 1), \\ 2x-1 > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 14, \\ x > 0,5; \end{cases} \ 0,5 < x < 14.$

Ответ: $(0,5; 14)$.


3. $2 \cos x - 1 = 0, [0; 2\pi]$; $\cos x = \frac{1}{2}$, $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Отберем корни с учетом условия:

1) $0 \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq 2\pi$; $-\frac{1}{6} \leq k \leq \frac{5}{6}$; $k=0, x = \frac{\pi}{3}$;

2) $0 \leq -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq 2\pi$; $\frac{1}{6} \leq k \leq \frac{7}{6}$; $k=1, x = \frac{5\pi}{3}$. Ответ: $\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}$.


4.



5. $f(x)=10x^4+x$; $F(x)=10\frac{x^5}{5}+\frac{x^2}{2}+C$; $F(x)=2x^5+\frac{x^2}{2}+C$.

Учитывая условие имеем: $2 \cdot 0^5 + \frac{0^2}{2} + C = 6, C = 6$. Ответ: $2x^5 + \frac{x^2}{2} + 6$.

Вариант 51.



1. $\frac{5x^2+4x-1}{7-2x} < 0$; $\frac{5x^2+4x-1}{2x-7} > 0$.

Пусть $f(x) = \frac{5x^2 + 4x - 1}{2x - 7}$.

Функция $f(x)$ определена на $(-\infty; 3,5) \cup (3,5; \infty)$;

$f(x)=0: 5x^2 + 4x - 1 = 0; D = 16 + 20 = 36;$

$x_{1,2} = \frac{-4 \pm 6}{10}, x_1 = -1, x_2 = 0,2; \quad \text{Ответ: } (-1; 0,2) \cup (3,5; \infty).$

2. $\lg(2-x) = 2\lg 4 - \lg 2, x < 2;$


$\lg(2-x) = \lg 16 - \lg 2; \lg(2-x) = \lg 8; 2-x=8; x = -6. \quad \text{Ответ: } -6.$

3. $\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha}$

$$\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha} = \frac{1}{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}} = \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \sin \alpha \cos \alpha;$$

$\sin \alpha \cos \alpha = \sin \alpha \cos \alpha$, что и требовалось доказать.


4.



5. $f(x) = e^x \cos x; f'(x) = e^x \cos x - e^x \sin x.$

Ответ: $e^x(\cos x - \sin x).$

Вариант 52.



1. $\frac{8 - 32x^2}{x - 10} > 0;$

$x \in (-\infty; -0,5) \cup (0,5; 10).$

Ответ: $(-\infty; -0,5) \cup (0,5; 10).$


2. $3^{x^2+3^x}=810; 9 \cdot 3^x+3^x=810, 3^x=81, 3^x=3^4, x=4. \quad \text{Ответ: } 4.$

3. $\sin x + \sin(\pi + x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 1;$

$$\sin x - \sin x + \sin x = 1, \sin x = 1, x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

4.



$$5. f(x) = 4\sin x - \cos x; f'(x) = 4\cos x + \sin x;$$


$$f'(-\frac{\pi}{4}) = 4\cos(-\frac{\pi}{4}) + \sin(-\frac{\pi}{4}) = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}. \text{ Ответ: } \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

Вариант 53.

$$1. y = \lg \frac{x-1}{8x+1};$$

$$(x-1)(8x+1) > 0;$$

$$\text{Ответ: } (-\infty; -\frac{1}{8}) \cup (1; \infty).$$




$$2. 9 \cdot 3^{x-1} + 3^x < 36; 3 \cdot 3^x + 3^x < 36, 3^x < 9, 3^x < 3^2, x < 2. \text{ Ответ: } (-\infty; 2).$$

$$3. 2 \cos^2 x - 1 = 0;$$

$$\cos 2x = 0; 2x = \frac{\pi}{2} + \pi n; x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} n, n \in \mathbb{Z}. \text{ Ответ: } \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} n, n \in \mathbb{Z}.$$

4.

StudyPort.ru



5. $f(x)=x^2 \ln x$; $f'(x)=2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$. Ответ: $2x \ln x + x$.

Вариант 54.

1. $\frac{a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{4}}}{a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}}}$, $a=4$, $b=11$; $\frac{a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{4}}}{a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}}} = \frac{a^{\frac{1}{2}}(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}})}{a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}}} = a^{\frac{1}{2}}$.

При $a=4$ $a^{\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$. Ответ: 2.


2. $2 \lg x > 1$; $\lg x^2 > \lg 10$; $\begin{cases} x^2 > 10, \\ x > 0; \end{cases} x > \sqrt{10}$. Ответ: $(\sqrt{10}; \infty)$.

3. $\operatorname{tg} x + \sqrt{3} = 0$; $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$; $x = -\frac{\pi}{3} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Отберем корни с

учетом условия: $0 \leq -\frac{\pi}{3} + \pi n \leq 2\pi$; $\frac{1}{3} \leq n \leq 2\frac{1}{3}$; $n=1, 2$.


При $n=1$; $x = \frac{2}{3}\pi$; при $n=2$ $x = \frac{5}{3}\pi$. Ответ: $\frac{2}{3}\pi$; $\frac{5}{3}\pi$.

4.



5. $f(x)=2x^2+\sin x$; $f'(x)=4x+\cos x$. Ответ: $4x + \cos x$.

Вариант 55.



1. $y=\lg(2x^2+9x)$; $2x^2+9x>0$;
 $2x(x+4,5)>0$;

Ответ: $(-\infty; -4,5) \cup (0; \infty)$.


2. $1 < 10^{n+1} \leq 1000000$; $10^0 < 10^{n+1} \leq 10^6$;
 т.к. $a=10 > 1$, то $0 < x+1 \leq 6$, $-1 < x \leq 5$. Ответ: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

3. $\operatorname{tg} x+1=0, [0; 2\pi]$; $\operatorname{tg} x=-1$; $x=-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

$0 \leq -\frac{\pi}{4} + \pi n \leq 2\pi$; $\leq n \leq 2\frac{1}{4}$; $n=1, 2$.

При $n=1$ $x=\frac{3}{4}\pi$; при $n=2$ $x=\frac{7}{4}\pi$. Ответ: $\frac{3}{4}\pi$; $\frac{7}{4}\pi$.

4.



5. $f(x)=6 \sin x - \cos x$; $f'(x)=6 \cos x + \sin x$;

$k=f'(x_0)$, $k=f'(\frac{\pi}{3})=6 \cos \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3}=3 + \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ответ: $3 + \frac{\sqrt{3}}{2}$.


Вариант 56.

1. $12^{\frac{1}{3}} \cdot 6^{\frac{2}{3}} \cdot (0,5)^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{2}{3}} \cdot 3^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{2}{3}} \cdot 3^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{-\frac{1}{3}} = 2 \cdot 3 = 6$. Ответ: 6.

2. $2\lg 0,5 + \lg x > \lg 5$; $\lg 0,25x > \lg 5$; $\begin{cases} 0,25x > 5, \\ x > 0; \end{cases} x > 20$. Ответ: $(20; \infty)$.


3. $\cos(-x)=\sin \frac{\pi}{2}$, $\cos x=1$, $x=2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4.



5. $f(x)=x^2 - 4x$; $F(x)=\frac{x^3}{3} - 2x^2 + C$. Ответ: $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + C$.

Вариант 57.



1. $\frac{(x-5)(3x-1)}{9-x} > 0$;

$(x-5)(3x-1)(x-9) < 0$;


Ответ: $(-\infty; \frac{1}{3}) \cup (5; 9)$.

2. $9^x = (\frac{1}{27})^{2-x}$; $3^{2x} = 3^{-3(2-x)}$; $2x = -6 + 3x$; $x = 6$. Ответ: 6.

3. $\cos x = 0,6$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$; x – угол I четверти, $\sin x > 0$.

$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - 0,6^2} = 0,8$. Ответ: 0,8.

4.



5. $f(x)=6\sin x + \operatorname{tg} x$; $f'(x)=6\cos x + \frac{1}{\cos^2 x}$;

42


$$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 6\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{\cos^2\left(-\frac{\pi}{6}\right)} = 3\sqrt{3} + \frac{4}{3} = \frac{9\sqrt{3} + 4}{3}.$$

Ответ: $\frac{9\sqrt{3} + 4}{3}$.

Вариант 58.

1. $\frac{3x^2 + 4x}{9 - x} > 0$; $\frac{3x^2 + 4x}{x - 9} < 0$. Пусть $f(x) = \frac{3x^2 + 4x}{x - 9}$;

$D(f) = (-\infty; 9) \cup (9; \infty)$;



2. $\log_{0,25}(3x-5) > -3$; $\log_{0,25}(3x-5) > \log_{0,25} 64$;

$$\begin{cases} 3x - 5 < 64, \\ 3x - 5 > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 23, \\ x > 1\frac{2}{3}; \end{cases} \quad 1\frac{2}{3} < x < 23. \quad \text{Ответ: } (1\frac{2}{3}; 23).$$

3. $2\cos \frac{x}{2} + 1 = 0$; $\cos \frac{x}{2} = -\frac{1}{2}$, $\frac{x}{2} = \pm(\pi - \frac{\pi}{3}) + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$;

$x = \pm \frac{4\pi}{3} + 4\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\pm \frac{4\pi}{3} + 4\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-3, 5; 5, 5]$; б) $f(x) > 0$ при $-1,5 < x < 4,7$;

в) функция возрастает на промежутке $[-3, 5; 1]$ и убывает на промежутке $[1; 5, 5]$;


г) прямые, параллельные оси абсцисс, касаются графика в точках $(1; 4,5)$ и $(4; 1)$;

д) $\max f(x) = f(1) = 4,5$; $\min f(x) = f(-3,5) = -4,5$.

5. $f(x) = 1 + 8x - x^2$; $f'(x) = 8 - 2x$; $f'(x) = 0$ при $8 - 2x = 0$, $x = 4$ – критическая точка. Ветви парабол направлены вниз, т.е. $\max f(x) = f(4) = 17$. $[-2, 5]$. Ответ: 17

Вариант 59.

1. $\frac{9 - 25x^2}{x + 4} < 0$;



$$(5x-3)(5x+3)(x+4) > 0;$$

$$x \in (-4; -0,6) \cup (0,6; \infty).$$

$$\text{Ответ: } (-4; -0,6) \cup (0,6; \infty).$$

$$2. 128 \cdot 16^{2x+1} = 8^{3-2x}; \quad 2^7 \cdot 2^{4(2x+1)} = 2^{3(3-2x)}; \quad 7+8x+4=9-6x;$$

$$14x=2; \quad x=\frac{1}{7}. \quad \text{Ответ: } -\frac{1}{7}.$$

$$3. \cos x - \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) + \cos(\pi+x) = 0; \quad \cos x - \cos x - \cos x = 0; \quad \cos x = 0;$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$4. \text{ а) } D(f) = [-3; 6]; \quad \text{ б) } f(x) > 0 \text{ при } x \in [-3; 1,1) \text{ и } (2,5; 6];$$

в) функция возрастает на промежутках $[-3; -1,5]$ и $[2; 6]$ и убывает на промежутке $[-1,5; 2]$;

г) прямая, параллельная оси абсцисс, касается графика в точке $(-1,5; 3)$;


$$\text{ д) } \max f(x) = f(6) = 5,5; \quad \min f(x) = f(2) = -3.$$

5. $f(x) = 3x^2 - 12x + 1$; $f'(x) = 6x - 12$, $f'(x) = 0$ при $x = 2$ — критическая точка.

Ветви параболы направлены вверх, т.е. $\min f(x) = f(2) = -11$. $[1; 4]$

Ответ: -11 .

Вариант 60.



$$1. \frac{x^2 - 3x + 2}{6 + 3x} > 0;$$

$$3(x-2)(x-1)(x+2) > 0;$$

$$x \in (-2; 1) \cup (2; \infty).$$

$$\text{Ответ: } (-2; 1) \cup (2; \infty).$$


$$2. \log_5(1-3x) \leq 2; \quad \log_5(1-3x) \leq \log_5 25;$$

$$\begin{cases} 1-3x \leq 25, \\ 1-3x > 0; \end{cases} \begin{cases} x \geq -8, \\ x < \frac{1}{3}; \end{cases} \quad -8 \leq x < \frac{1}{3}. \quad \text{Ответ: } \left[-8; \frac{1}{3}\right).$$

$$3. \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{(1 - \cos^2 \alpha) - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{1 - 2\cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}.$$

Значит, $\frac{1 - 2\cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{ctg} \alpha$, что и требовалось доказать.


4. а) $D(f)=[-3;6]$; б) $f(x) > 0$ при $x \in (-3;2,9)$;
 в) $f'(x) > 0$ при $x \in (-2; 0)$, $f'(x) < 0$ на промежутках $(-3; -2)$, $(0; 6)$;
 г) прямые, параллельные оси абсцисс, касаются графика в точках $(-2; 2,5)$ и $(0; 4,5)$;
 д) $\max f(x)=f(0)=4,5$; $\min f(x)=f(6)=-3$.
 5. $f(x)=3x^4-4x^3+2$.
 Функция $f(x)$ определена и дифференцируема при $x \in \mathbb{R}$.
 $f'(x)=12x^3-12x^2$,
 $f'(x) = 0$ при $12x^3 - 12x^2 = 0$, $x=0$ и $x=1$ – критические точки.



$x=1$ – точка минимума функции.
 Ответ: 1 – точка минимума функции.

Вариант 61.

1. $y = \lg \frac{5-4x}{12x-1}$;
 $(5-4x)(12x+1) > 0$;
 $48(x-\frac{5}{4})(x+\frac{1}{12}) < 0$
 $x \in (-\frac{1}{12}; \frac{5}{4})$. Ответ: $x \in (-\frac{1}{12}; \frac{5}{4})$.



2. $(\frac{1}{27})^{2-x} > 9^{2x-1}$; $3^{-3(2-x)} > 3^{2(2x-1)}$.

Т.к. $a = 3 > 1$, то $-6 + 3x > 4x - 2$, $x < -4$. Ответ: $(-\infty; -4)$.

3. $\sqrt{3} \operatorname{tg} 2x + 1 = 0$; $\operatorname{tg} 2x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $2x = -\frac{\pi}{6} + \pi k$, $x = -\frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.
 Ответ: $-\frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-4,5; 5]$; б) $f(x) > 0$ при $x \in (-3,5; 3,5)$;
 в) $f'(x) > 0$ на промежутках $(-4,5; -1,4)$ и $(-1,5; 1,5)$,
 $f'(x) < 0$ на промежутке $(1,5; 5)$;
 г) $x = 1,5$ – точка экстремума функции (точка максимума);

д) $\max_{[-4,5]} f(x) = f(1,5) = 4,5$; $\min_{[-4,5]} f(x) = -2$

5. $f(x) = x^5 + 2x$; $F(x) = \frac{x^6}{6} + 2\frac{x^2}{2} + C$; $F(x) = \frac{x^6}{6} + x^2 + C$.

Ответ: $\frac{x^6}{6} + x^2 + C$.

Вариант 62.

1. $\frac{12^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot 7^{\frac{5}{3}}}{7^{\frac{2}{3}} \cdot 8^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{6}}} = \frac{2 \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot 7^{\frac{5}{3}}}{7^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{3}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{6}}} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 7}{2^{\frac{3}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}}} = 21$. Ответ: 21.

2. $\lg 2x < 2 \lg 7 + 1$; $\lg 2x < \lg 49 + \lg 10$; $\begin{cases} 2x < 490 \\ x > 0 \end{cases}$

$\begin{cases} x < 245, \\ x > 0; \end{cases}$ $0 < x < 245$. Ответ: (0; 245).

StudyPort.ru

3. $\operatorname{tg}^2 x - 3 = 0$; $\operatorname{tg} x = \pm\sqrt{3}$, $x = \pm\frac{\pi}{3} + \pi k$, $k \in Z$. Отберем корни:

Отрезку $[0; 2\pi]$ принадлежат корни: $\frac{\pi}{3}$; $\frac{2\pi}{3}$; $\frac{4\pi}{3}$; $\frac{5\pi}{3}$

Ответ: $\frac{\pi}{3}$; $\frac{2\pi}{3}$; $\frac{4\pi}{3}$; $\frac{5\pi}{3}$.

4. а) $D(f) = [-3; 5,5]$; б) $f(x) \leq -2$ при $x \in [-3; -2,5] \cup [1,5; 5,5]$;

в) $f'(x) > 0$ на промежутке $(-3; -1)$,

$f'(x) < 0$ на промежутках $(-1; 3,5)$ и $(3,5; 5,5)$;

г) $x = -1$ д) $\max_{[-3,5]} f(x) = f(-1) = 2,5$; $\min_{[-3,5]} f(x) = f(5,5) = -4,5$

5. $y = 2\sin x + 3\cos x$; $y' = 2\cos x - 3\sin x$; $k_1 = 2\cos\frac{\pi}{2} - 3\sin\frac{\pi}{2} = -3$;

$k_2 = 2\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - 3\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2 \cdot 0 - 3 \cdot (-1) = 3$. Так как $k_1 \neq k_2$, то

рассматриваемые касательные не являются параллельными прямыми. Ответ: не являются.

Вариант 63.

1. $3^{2\log_9 12} = 9^{\log_9 12} = 12$. Ответ: 12.

2. $0,04 \leq 5^{2-x} \leq 25$; $5^{-2} \leq 5^{2-x} \leq 5^2$. Т.к. $5 > 1$,

то $-2 \leq 2-x \leq 2$, $0 \leq x \leq 4$. Ответ: 0; 1; 2; 3; 4.

3. $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha + 1 + 2\cos \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin \alpha(1 + \cos \alpha)} =$

$= \frac{2 + 2\cos \alpha}{\sin \alpha(1 + \cos \alpha)} = \frac{2}{\sin \alpha}$; $\frac{2}{\sin \alpha} = \frac{2}{\sin \alpha}$.

4. а) $D(f) = [-3; 6]$; б) $f(x) \leq -2,5$ при $x \in \{-3\} \cup [-0,5; 0,5]$;

в) $f'(x) > 0$ на промежутках $(-3; -2)$, $(0; 6)$,

$f'(x) < 0$ на промежутке $(-2; 0)$;

г) $x = -2$, $x = 0$;

д) $\max_{[-3,6]} f(x) = f(6) = 4,5$; $\min_{[-3,6]} f(x) = f(0) = -3$.


5. $3x + x^2$;

$F(x) = 3\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + C$.

Ответ: $3\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + C$.

Вариант 64

1. $x^3 + 9x^2 + 14x < 0$;
 $x(x^2 + 9x + 14) < 0$.
 $x^2 + 9x + 14 = (x + 2)(x + 7)$.
 $x \in (-\infty; -7) \cup (-2; 0)$.
 Ответ: $(-\infty; -7) \cup (-2; 0)$.



2. $\frac{1}{2} \lg 0,64 + \lg x > \lg 5$; $\lg 0,8 + \lg x > \lg 5$; $0,8x > 5$ (т.к. $a = 10 > 1$);
 $x > 6,25$. Ответ: $(6,25; \infty)$.

3. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$; $-\sin x = -\frac{1}{2}$, $\sin x = \frac{1}{2}$,

$$x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \text{ Ответ: } (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

4. а) $D(f) = [-3; 6]$; б) $f(x) < -1$ при $x \in (3; 6)$;
 в) $f'(x) > 0$ на промежутке $(0; 1,5)$,
 $f'(x) < 0$ на промежутках $(-3; 0)$, $(1,5; 6)$;
 г) прямые, параллельные оси абсцисс, касаются графика в точках $(0; 0)$ и $(1,5; 2,5)$;

д) $\max_{[-3;6]} f(x) = f(-3) = 4$; $\min_{[-3;6]} f(x) = f(6) = -3$.


5. $y = x^2 - 3x$; $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + C$. Ответ: $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + C$.

Вариант 65.

1. $\frac{(x-6)(4x+7)}{9-x} \leq 0$;

$$\frac{(x-6)(4x+7)}{x-9} \geq 0;$$

$$x \in (-1,75; 6) \cup (9; \infty). \text{ Ответ: } [-1,75; 6] \cup (9; \infty).$$



2. $2^{7-5x} - \left(\frac{1}{8}\right)^{2x+1} = 0$; $2^{7-5x} = 2^{-3(2x+1)}$, $7-5x = -6x-3$, $x = -10$.

Ответ: -10 .

3. $3 \operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$; $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$; $x = -\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

$$0 \leq -\frac{\pi}{6} + \pi k \leq 2\pi; \frac{1}{6} \leq k \leq 2\frac{1}{6}; k = 1, 2. \text{ Ответ: } \frac{5}{6}\pi; \frac{11}{6}\pi.$$

4. а) $D(f) = [-3, 5; 6]$; б) $f(x) > 2$ при $x \in (0, 5; 4)$;
 в) функция возрастает на промежутке $[-1, 5; 2, 3]$ и убывает на промежутках $[-3, 5; -1, 5]$ и $[2, 3; 6]$;
 г) прямые, параллельные оси абсцисс, касаются графика в точке $(2, 3; 4)$;
 д) $\max_{[-3, 5; 6]} f(x) = 4$; $\min_{[-3, 5; 6]} f(x) = -3$.
 5. $f(x) = 3 + 5x + 3x^2$; $f'(x) = 5 + 6x$, $k = f'(x_0) = -7$; $5 + 6x = -7$, $x_0 = -2$, $f(-2) = 5$. Ответ: $(-2; 5)$.

Вариант 66.

1. $\frac{5^{\frac{3}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{2}}}{9^{\frac{1}{3}}} \cdot \frac{8^{\frac{1}{4}}}{5^{\frac{1}{2}} \cdot 9^{\frac{1}{6}}} = \frac{5^{\frac{3}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{3}{4}}}{3^{\frac{1}{3}} \cdot 5^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{3}}} = 5 \cdot 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$. Ответ: $3\frac{1}{3}$.


2. $\log_2(1 - 2x) > 0$; $\log_2(1 - 2x) > \log_2 1$; $\begin{cases} 1 - 2x > 1 \\ 1 - 2x > 0 \end{cases} \quad x < 0$.

Ответ: $(-\infty; 0)$.

3. $\sin x + 0,5 = 0$, $[0; 2\pi]$;

$\sin x = -\frac{1}{2}$, $x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}$.

4.



5. $f(x) = 5x + x^2$, $(0; 3)$; $f'(x) = 5 \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + C$.

$3 = 5 \cdot \frac{0^2}{2} + \frac{0^3}{3} + C$; $C = 3$. Итак, $F(x) = 5 \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + 3$.

Ответ: $5 \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + 3$.


Вариант 67.

1. $\frac{2x^2 - 5x + 2}{x + 4} < 0;$

$2(x-2)(x-0,5)(x+4) < 0;$

$x \in (-\infty; -4) \cup (0,5; 2).$

Ответ: $(-\infty; -4) \cup (0,5; 2).$



2. $\log_{\frac{1}{3}}(2x-1) \geq -2; \log_{\frac{1}{3}}(2x-1) \geq \log_{\frac{1}{3}} 9;$

$\begin{cases} 2x-1 \leq 9, \\ 2x-1 > 0; \end{cases} \begin{cases} x \leq 5, \\ x > 0,5; \end{cases}$ Ответ: $(0,5; 5].$

3. $\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x = 0, [0; 2\pi]; \operatorname{tg} x(\operatorname{tg} x + 1) = 0; \operatorname{tg} x = 0$ или $\operatorname{tg} x + 1 = 0;$

$x = \pi n, n \in Z$ или $\operatorname{tg} x = -1; x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z;$

1) $x = \pi n; 0 \leq \pi n \leq 2\pi; 0 \leq n \leq 2; x_1 = 0$ при $x = 0; x_2 = \pi$ при $n = 1; x_3 = 2\pi$ при $n = 2.$

2) $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k; 0 \leq -\frac{\pi}{4} + \pi k \leq 2\pi; \frac{1}{4} \leq k \leq 2\frac{1}{4}; k = 1; 2;$

$x_4 = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3}{4}\pi$ при $k = 1; x_5 = \frac{7}{4}\pi$ при $k = 2.$

Ответ: $0; \pi; \frac{3}{4}\pi; 2\pi; \frac{7}{4}\pi.$

4. $f(x) = x^3 \ln x, f'(x) = 3x^2 \ln x + \frac{x^3}{x} = x^2(3 \ln x + 1).$ Ответ: $x^2(3 \ln x + 1).$

5. $f(x) = x^2 - 6x + 9.$


$S = \int_0^2 (x^2 - 6x + 9) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{3} - 12 + 18 = 8\frac{2}{3}.$

Вариант 68.

1. $\frac{3x^2 - 12}{1 - 11x} > 0;$

$3(x+2)(x-2)(11x-1) < 0;$

$x \in (-\infty; -2) \cup \left(\frac{1}{11}; 2 \right).$



Ответ: $(-\infty; -2) \cup \left(\frac{1}{11}; 2 \right).$


2. $\left(\frac{1}{6}\right)^{x+1} = 36^{x-1}$; $6^{-(x+1)} = 6^{2(x-1)}$, $-x-1 = 2x-2$, $x = \frac{1}{3}$. Ответ: $\frac{1}{3}$.

3. $\sin x + \sin(\pi - x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -1$;

$\sin x + \sin x - \sin x = -1$; $\sin x = -1$; $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4.



5. $f(x) = 2x + x^3$; $F(x) = 2 \cdot \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} + C$. Ответ: $x^2 + \frac{x^4}{4} + C$.

Вариант 69.

1. $\frac{\frac{5}{b^4c^4} + \frac{1}{b^4c^4}}{\frac{5}{b^4c^4}}$, $b = 2, c = 5$;

$\frac{\frac{5}{b^4c^4} + \frac{1}{b^4c^4}}{\frac{5}{b^4c^4}} = \frac{\frac{5}{b^4c^4}(c^{-1} + b^{-1})}{\frac{5}{b^4c^4}} = \frac{1}{c} + \frac{1}{b} = \frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{7}{10}$. Ответ: 0,7

2. $\lg(3 - 2x) < 2$;

$\begin{cases} 3 - 2x < 100 \\ 3 - 2x > 0; \end{cases} \begin{cases} x > -48,5, \\ x < 1,5; \end{cases} -48,5 < x < 1,5$.

3. $\operatorname{tg}^2 x - \sqrt{3} \operatorname{tg} x = 0$, $[0; 2\pi]$; $\operatorname{tg} x(\operatorname{tg} x - \sqrt{3}) = 0$;


$\operatorname{tg} x = 0$ или $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$; $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$ или $x = \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

1) $0 \leq \pi n \leq 2\pi; 0 \leq n \leq 2; n = 0; 1; 2;$
 $x = 0$ при $n = 0; x = \pi$ при $n = 1; x = 2\pi$ при $n = 2.$

2) $0 \leq \frac{\pi}{3} + \pi k \leq 2\pi; -\frac{1}{3} \leq k \leq 2 - \frac{1}{3}; k = 0; 1;$

$x = \frac{\pi}{3}$ при $k = 0; x = \frac{4}{3}\pi$ при $k = 1.$ Ответ: $0; \frac{\pi}{3}; \pi; \frac{4}{3}\pi; 2\pi.$

4.



5. $f(x) = x^2 + 8x + 16, x = 0, y = 0, x = -2.$

$$S = \int_{-2}^0 (x^2 + 8x + 16) dx = \left(\frac{x^3}{3} + 4x^2 + 16x \right) \Big|_{-2}^0 = - \left(-\frac{8}{3} + 16 - 32 \right) = 18\frac{2}{3}.$$

Ответ: $18\frac{2}{3}.$

Вариант 70.

1. $\left(27^{\frac{2}{5}} \cdot 2^{\frac{1}{5}} \cdot 2 \right)^{\frac{5}{6}} = \left(3^6 \cdot 2^{\frac{6}{5}} \cdot 2 \right)^{\frac{5}{6}} = 6.$ Ответ: 6.


2. $\lg x + 0,5 \lg 16 < \lg 80 - \lg 2; \lg x + \lg 4 < \lg 40;$
 $\begin{cases} 4x < 40, & \begin{cases} x < 10, \\ x > 0; \end{cases} \\ x > 0; & \begin{cases} x > 0; \\ 0 < x < 10. \end{cases} \end{cases}$

Ответ: (0; 10).

3. $\sin(-x) = \sin 2\pi; -\sin x = 0, \sin x = 0, x = \pi k, k \in \mathbb{Z}.$

Ответ: $\pi k, k \in \mathbb{Z}.$

4.



5. $f(x) = 3x^2 - 5$; $F(x) = x^3 - 5x + C$; $F(2) = 10$; $2^3 - 5 \cdot 2 + C = 10$; $C = 12$.
 Ответ: $x^3 - 5x + 12$.

Вариант 71.


1. $\left(72^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot 36^{\frac{1}{6}} \div 2^{\frac{4}{3}} = 36^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot 36^{\frac{1}{6}} \div 2^{\frac{4}{3}} = 6 \cdot 2^{-1} = 3$. Ответ: 3.

2. $\log_6(5x-2) > 3\log_6 2 + 2$; $\log_6(5x-2) > \log_6 8 + \log_6 36$; $\log_6(5x-2) > \log_6 288$;
 $\begin{cases} 5x - 2 > 288, \\ 5x - 2 > 0; \end{cases} x > 58$. Ответ: $(58; \infty)$.

3. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin \frac{\pi}{4}$, $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $\pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4.



StudyPort.ru

5. $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3$; $F(x) = \frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{3} + 3x + C$;

$F(-1) > 0$: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - 3 + C > 0$, $C > 2\frac{5}{6}$. Например $C=5$.

Ответ: $\frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{3} + 3x + 5$.

Вариант 72.

1. $8^{\frac{1}{3} \log_2 6} = 2^{\log_2 6} = 6$. Ответ: 6.

2. $\frac{1}{7} \leq 7^{x-3} < 49$; $7^{-1} \leq 7^{x-3} < 7^2$. Т.к. $7 > 1$, то $-1 \leq x-3 < 2$; $2 \leq x < 5$.


Ответ: 2; 3; 4.

3. $(\sin x - \cos x)^2 - 1 = 0$, $[0; 2\pi]$; $\sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x - 1 = 0$;
 $1 - \sin 2x - 1 = 0$; $\sin 2x = 0$; $2x = \pi k$;

$x = \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. $0 \leq \frac{\pi k}{2} \leq 2\pi$; $0 \leq k \leq 4$; $k = 0; 1; 2; 3; 4$;

Ответ: 0 ; $\frac{\pi}{2}$; π ; $\frac{3}{2}\pi$; 2π .


4.



5. $f(x) = x^5 - x^2$; $F(x) = \frac{x^6}{6} - \frac{x^3}{3} + C$.

Ответ: $\frac{x^6}{6} - \frac{x^3}{3} + C$.

Вариант 73



Ответ: $(-\infty; -3) \cup (0,5; 3)$.

2. $\log_2(7x - 4) = 2 + \log_2 13;$


$\log_2(7x - 4) = \log_2 52; \begin{cases} 7x - 4 = 52, \\ 7x - 4 > 0; \end{cases} x = 8. \quad \text{Ответ: } 8.$

3. $\sin x = -0,8, -\frac{\pi}{2} < x < 0.$

Учитывая условие, $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - (-0,8)^2} = 0,6.$


Ответ: 0,6.

4.



5. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5, f'(x) = 3x^2 - 6x; k = f'(x_0) = 0; 3x_0^2 - 6x_0 = 0$ при $x_0 = 0$ и $x_0 = 2; f(0) = 5, f(2) = 1; \text{ Ответ: } (0; 5), (2; 1).$

Вариант 74.



$8x\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{4}\right) < 0.$

Ответ: $(-\infty; -0,25) \cup (0; 0,5)$.

54

$$2. \log_2 3 - \log_2(2-3x) = 2 - \log_2(4-3x);$$


$$\begin{cases} \log_2 \frac{3}{2-3x} = \log_2 \frac{4}{4-3x}, \\ 2-3x > 0. \end{cases} \begin{cases} 3(4-3x) = 4(2-3x), \\ x < \frac{2}{3}; \end{cases} \begin{cases} 12-9x = 8-12x, \\ x < \frac{2}{3}; \end{cases}$$

$$x = -\frac{1}{3}.$$

$$3. 3 \operatorname{tg} 2x - \sqrt{3} = 0; \operatorname{tg} 2x = \frac{\sqrt{3}}{3}, 2x = \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

4.



$$5. f(x) = 3x^4 - 1; F(x) = \frac{3}{5}x^5 - x + C. \text{ Ответ: } F(x) = \frac{3}{5}x^5 - x + C.$$

Вариант 75.

$$1. \frac{(x-11)(3x-8)}{6-x} < 0;$$


$$3(x-11)\left(x-2\frac{2}{3}\right)(x-6) > 0;$$

$$\text{Ответ: } \left(2\frac{2}{3}; 6\right) \cup (11; \infty).$$

$$2. 2^{2x^3} + 2^{2x^2} - 7 \cdot 2^x = 48; 3 \cdot 2^x = 48; 2^x = 16; x = 4. \text{ Ответ: } 4.$$

$$3. \cos x = -\frac{3}{5}, \frac{\pi}{2} < x < \pi. \text{ Учитывая условие, имеем:}$$

$$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}. \text{ Ответ: } 0,8.$$



StudyPort.ru


4. $f(x) = 2 \ln x$; $f'(x) = \frac{2}{x}$, $k = f'(x_0)$; $k = f'(2) = 1$. Ответ: 1.

5. $f(x) = x^2 - 6x + 10$;

$$S = \int_{-1}^3 (x^2 - 6x + 10) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 10x \right) \Big|_{-1}^3 =$$

$$= (9 - 27 + 30) - \left(-\frac{1}{3} - 3 - 10 \right) = 25\frac{1}{3}. \quad \text{Ответ: } 25\frac{1}{3}.$$

Вариант 76.



1. $\frac{3x + 12x^2}{x + 4} > 0$;
 $3x(4x + 1)(x + 4) > 0$;
 Ответ: $(-4; -0,25) \cup (0; \infty)$.


2. $\log_3(12 - 5x) = 2$; $\log_3(12 - 5x) = \log_3 9$; $\begin{cases} 12 - 5x = 9, \\ 12 - 5x > 0; \end{cases} x = 0,6$.

Ответ: 0,6.

3. $\frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} + \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} + \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} =$
 $= \frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = 1$; $1 = 1$, что и следовало доказать.

4. а) $D(f) = [-3; 5]$; б) $f(x) \geq 1$ при $x \in [-2, 2; 0, 5] \cup [4, 7; 5]$;
 в) функция возрастает на каждом из промежутков $[-3; -1]$ и $[3; 5]$,
 убывает на промежутке $[-1; 3]$;
 г) $f'(x) = 0$ при $x = -1$ и при $x = 3$;
 д) $\max_{[-3; 5]} f(x) = f(-1) = 3$; $\min_{[-3; 5]} f(x) = f(3) = -4$.


5. $f(x) = 3x^2 - 2x^3 + 6$;
 $f'(x) = 6x - 6x^2 = 6x(1 - x)$;
 $f'(x) = 0$ при $x = 0$ и при $x = 1$;



Ответ: $x_{\min} = 0$; $x_{\max} = 1$.

Вариант 77.

1. $\frac{(x+5)(x-6)}{6x-1} \leq 0;$



Ответ: $(-\infty; -5] \cup \left(\frac{1}{6}; 6\right]$.

2. $243\left(\frac{1}{81}\right)^{3x+2} = 27^{x-3}; \quad 3^5 \cdot 3^{-4(3x+2)} = 3^{3(x+3)}, \quad 3^{5-12x+8} = 3^{3x+9},$

$13 - 12x = 3x + 9, \quad x = \frac{4}{15}.$ Ответ: $\frac{4}{15}.$

3. $2\cos x = -1, \quad [0; 2\pi];$

$\cos x = -\frac{1}{2}, \quad x = \pm\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \quad x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$

1) $0 \leq \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \leq 2\pi; \quad -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{2}{3}; \quad k = 0.$ Тогда $x_1 = \frac{2\pi}{3}.$

2) $0 \leq -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k \leq 2\pi; \quad \frac{1}{3} \leq k \leq \frac{4}{3}; \quad k = 1.$ Тогда $x_2 = \frac{4\pi}{3}.$

Ответ: $\frac{2\pi}{3}; \quad \frac{4\pi}{3}.$

4. а) $D(f) = [-3, 5; 4, 5];$ б) $f(x) \leq 2, 5$ при $x \in [-2; 4, 5];$

в) функция возрастает на промежутке $[1; 3],$ убывает на промежутках $[-3, 5; 1]$ и $[3; 4, 5];$ г) $f'(x) = 0$ при $x = 3;$


д) $\max_{[-3, 5; 4, 5]} f(x) = f(-3, 5) = 4; \quad \min_{[-3, 5; 4, 5]} f(x) = f(1) = -3.$

5. $f(x) = 5 - 8x - x^2; \quad f'(x) = -8 - 2x = -2(x + 4);$ критическая точка $x = -4.$

$\max_{[-6; -3]} f(x) = f(-4) = 21.$ Ответ: 21.

Вариант 78.

1. $\frac{x^2 - 25}{6x + 1} < 0;$



$6(x+5)(x-5)\left(x + \frac{1}{6}\right) < 0;$

Ответ: $(-\infty; -5) \cup \left(-\frac{1}{6}; 5\right).$


2. $16 \cdot 8^{2+3x}=1; 2^4 \cdot 2^{3(2+3x)}=1, 2^{4+6+9x}=1, 10+9x=0, x=-\frac{1}{9}$. Ответ: $-\frac{1}{9}$.

3. $\cos(3\pi+x) - \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sqrt{2}; -\cos x - \cos x = \sqrt{2}, \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$,

$x = \pm\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) + 2\pi k, k \in Z$; Ответ: $\pm\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$.


4. а) $D(f) = [-3; 5,5]$; б) $1 \leq f(x) \leq 2,5$ при $x \in \{-3\} \cup [-1; -0,2] \cup [2,6; 3]$;
 в) промежутки возрастания $- [-2; 1,5]$, промежутки убывания $- [-3; -2]$ и $[1,5; 5,5]$; г) $f'(x) = 0$ при $x = -2$ и при $x = 1,5$;

д) $\max_{[-3;5,5]} f(x) = f(1,5) = 4,5; \min_{[-3;5,5]} f(x) = f(5,5) = -1$.



5. $y = x^3 + 3x^2 - 9x$;
 $y' = 3x^2 + 6x - 9; 3x^2 + 6x - 9 > 0 | : 3$;
 $x^2 + 2x - 3 > 0; (x-1)(x+3) > 0$.
 Ответ: возрастает на $(-\infty; -3]$ и $[1; \infty)$.

Вариант 79.



1. $\frac{x^2 - 14x + 48}{x + 7} > 0$;
 $(x-6)(x-8)(x+7) > 0$;
 Ответ: $(-7; 6) \cup (8; \infty)$.

2. $\log_3(4-2x) - \log_3 2 = 2; \log_3(2-x) = \log_3 9; \begin{cases} 2-x=9 \\ x < 2 \end{cases}; x = -7$. Ответ: -7 .

3. $\sin^2 x - \cos^2 x - 1, [0; 2\pi]$;
 $1 - \cos^2 x - \cos x = 1; \cos^2 x + \cos x = 0; \cos x(\cos x + 1) = 0$;

$\cos x = 0$ или $\cos x = -1; x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$ или $x = \pi + 2\pi k, k \in Z$;

Ответ: $\frac{\pi}{2}; \frac{3}{2}\pi; \pi$.

4. а) $D(f) = [-3; 6]$; б) $f(x) \geq 1$ при $x \in [-2,5; 0,7] \cup [4,5; 6]$;


в) промежутки возрастания $- [-3; -1]$ и $[2,5; 6]$, промежутки убывания $- [-1; 2,5]$;

г) касательные, параллельные оси абсцисс, касаются графика в точках $x = -1$ и $x = 2,5$;

д) $\max_{[-3;6]} f(x) = f(6) = 4; \min_{[-3;6]} f(x) = f(2,5) = -2,5$.

5. $S = 12t - 3t^2; v(t) = S'(t) = 12 - 6t; v = 0$ при $t = 2c$. Ответ: $2c$.

Вариант 80.

1. $y = \lg \frac{3x+1}{x-4}; (3x+1)(x-4) > 0;$ 

Ответ: $(-\infty; -\frac{1}{3}) \cup (4; \infty)$.

2. $10^{3x+1} > 0,001; 10^{3x+1} > 10^{-3}$. Т.к. $a = 10 > 1$,

то $3x+1 > -3; x > -\frac{1}{3}$. Ответ: $(-\frac{1}{3}; \infty)$.

3. $3 \operatorname{tg}^2 x - 1 = 0; \operatorname{tg} x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}, x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Отрезку $[0; 2\pi]$ принадлежат $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}$ и $x = \frac{7\pi}{6}, x = \frac{11\pi}{6}$.

Ответ: $\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}$.

4. а) $D(f) = [-3; 5,5]$; б) $f(x) \geq 1$ при $x \in [-2,7; -0,3] \cup [4; 5,5]$;

в) промежутки возрастания $[-3; -1,5]$ и $[2,5; 5,5]$, промежутки убывания $[-1,5; 2,5]$;

г) касательные, параллельные оси абсцисс, касаются графика в точках $x = -1,5$ и $x = 2,5$;

д) $\max_{[-3; 5,5]} f(x) = f(5,5) = 5,5; \min_{[-3; 5,5]} f(x) = f(2,5) = -3$.

5. $S = 1 + 4t - t^2; v(t) = S'(t) = 4 - 2t; v(t) = 0$ при $t = 2$ с. Ответ: 2 с.

Вариант 81.

1. $\left(27^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{1}{9} \right)^{\frac{3}{4}} \right)^{\frac{4}{3}} = \left(3^{\frac{3}{2}} \cdot 3^{-\frac{3}{2}} \right)^{\frac{4}{3}} = 1$. Ответ: 1.

2. $\log_{0,5}(2x+1) > -2; \log_{0,5}(2x+1) > \log_{0,5} 4;$

$\begin{cases} 2x+1 < 4 & (\text{т.к. } a = 0,5 < 1), \\ 2x+1 > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 1,5, \\ x > -0,5; \end{cases}$ Ответ: $(-0,5; 1,5)$.

3. $\frac{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} - \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha - \operatorname{tg}^2 \alpha - \operatorname{tg}^2 \alpha \operatorname{ctg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \frac{0}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = 0$.

Значит, $\frac{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \operatorname{tg}^2 \alpha$;

4. а) $D(f) = [-2,5; 6]$; б) $f(x) \geq 1$ при $x \in [-2,5; -1,4] \cup [1; 5]$;
 в) промежутки возрастания $- [0; 2]$, промежутки убывания $- [-2,5; 0]$ и $[2; 6]$;
 г) прямые, параллельные оси абсцисс, касаются графика в точках $x = 0$ и $x = 2$;
 д) $\max f(x) = f(-2,5)$; $\min f(x) = f(0) - 1,5$.
5. $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$; $k = f'(x_0) = 4x_0 - 5$; $k = 3$ при $4x_0 - 5 = 3$;
 $x_0 = 2, f(x_0) = -1$. Ответ: (2; -1).

Вариант 82.

1. $7^{-2 \log_7 5} = (7^{\log_7 5})^{-2} = 5^{-2} = \frac{1}{25}$. Ответ: $\frac{1}{25}$.
2. $\frac{1}{8} < 2^{x-1} \leq 16$; $2^{-3} < 2^{x-1} \leq 2^4$, $-2 < x \leq 5$. Ответ: -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5.
3. $2 \sin x - \sin^2 x = \cos^2 x$; $2 \sin x = 1$,
 $\sin x = \frac{1}{2}$, $x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$. Ответ: $(-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$.
4. а) $D(f) = [-2,5; 5]$; б) $f(x) \geq 3$ при $x \in [-2,5; -0,5] \cup \{3,5\}$;
 в) промежутки возрастания $- [1,5; 3,5]$, убывания $- [-2,5; 1,5]$ и $[3,5; 5]$;
 г) $f'(x) = 0$ при $x = 1,5$;
 д) $\max_{[-2,5; 5]} f(x) = f(-2,5) = 4,5$; $\min_{[-2,5; 5]} f(x) = f(5) = -3$.
5. $f(x) = 1 - 5x + 3x^2$; $k = f'(x_0) = -5 + 6x_0$;
 $k = 1$ при $6x_0 - 5 = 1, x_0 = 1, f(x_0) = -1$. Ответ: (1; -1).

Вариант 83.

1. $\frac{2a^{-\frac{1}{3}}}{a^{\frac{2}{3}} - 3a^{-\frac{1}{3}}} = \frac{2a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}(a-3)} = \frac{2}{a-3}$. При $a = 4$ $\frac{2}{4-3} = 2$.
 Ответ: 2.
2. $\log_3(5x-6) < \log_3 2 + 3$; $\log_3(5x-6) < \log_3 54$;
 $\begin{cases} 5x-6 < 54, \\ 5x-6 > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 12, \\ x > 1,2; \end{cases} 1,2 < x < 12$. Ответ: (1,2; 12).
3. $\sin(\pi + x) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$; $-\sin x = \frac{1}{2}$;

$$\sin x = -\frac{1}{2}, \quad x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z.$$

Ответ: $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z.$


4. а) $D(f) = [-3; 5,5]$; б) $f(x) < -1$ при $x \in (-3; -1) \cup (2,5; 5,5]$;
 в) промежутки возрастания $[-3; 1]$, убывания $[1; 5,5]$;
 г) $f'(x) = 0$ при $x = -1$; д) $\max_{[-3,5,5]} f(x) = 3,5$; $\min_{[-3,5,5]} f(x) = -5,5$.

5. $f(x) = x^2 \ln x$; $f'(x) = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = x(2 \ln x + 1).$

Ответ: $x(2 \ln x + 1).$

Вариант 84.

1. $\frac{(x-2)(x-9)}{(4x-5)} \geq 0;$



Ответ: $(1,25; 2] \cup [9; \infty).$

2. $2 \cdot 5^{x+2} - 10 \cdot 5^x = 8;$

$50 \cdot 5^x - 10 \cdot 5^x = 8, 5^x = 5^{-1}, x = -1$ Ответ: -1.

3. $2 \cos(\pi + 2x) = 1; -2 \cos 2x = 1;$

$\cos 2x = -\frac{1}{2}; 2x = \pm \left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + 2\pi k, k \in Z; \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z.$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z.$

4. а) $D(f) = [-3; 6]$; б) $f(x) \leq -1$ при $x \in \{-1,5\} \cup [3,5; 6]$;

в) $f'(x) = 0$ при $x = -1,5$;

г) промежутки возрастания $[-1,5; 1]$, убывания $[-3; -1,5]$ и $[1; 6]$;

д) $\max_{[-3,6]} f(x) = 4,5$; $\min_{[-3,6]} f(x) = -3.$


5. $S = 0,5t^2 - 3t + 4; v(t) = S'(t) = t - 3, v(t) = 0$ при $t = 3$ с. Ответ: 3 с.

Вариант 85.

1. $\frac{9x^2 - 1}{x - 6} > 0;$

$(3x + 1)(3x - 1)(x - 6) > 0;$

Ответ: $\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right) \cup (6; \infty).$



2. $25^{1-3x} = \frac{1}{125^3}$; $5^{2(1-3x)} = 5^{-3}$, $2 - 6x = -3$, $x = \frac{5}{6}$. Ответ: $\frac{5}{6}$.

3. $\sin(\pi - x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sqrt{3}$; $\sin x + \sin x = \sqrt{3}$, $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

$x = (-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z$. Ответ: $(-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z$.

4. а) $D(f) = [-3, 5; 6]$;

б) $f(x) \geq 3,5$ при $x \in \{-0,5\} \cup [5, 8; 6]$;

в) $f'(x) = 0$ при $x = -0,5$ и при $x = 3,5$;

г) промежутки возрастания – $[-3, 5; -0,5]$ и $[3, 5; 6]$, убывания – $[-0,5; 3, 5]$;

д) $\max_{[-3, 5; 6]} f(x) = 4,5$; $\min_{[-3, 5; 6]} f(x) = -3,5$.

5. $f(x) = 4 - x^2$; $F(x) = 4x - \frac{x^3}{3} + C$;

$F(-3) = 10: 4 \cdot (-3) - \frac{(-3)^3}{3} + C = 10$, $C = 13$;

Ответ: $4x - \frac{x^3}{3} + 13$.

Вариант 86.

1. $\frac{a^{\frac{7}{3}} + a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{4}{3}}}$, $a = 2$; $\frac{a^{\frac{7}{3}} + a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{4}{3}}} = \frac{a^{\frac{4}{3}}(a + a^{-1})}{a^{\frac{4}{3}}} = a + \frac{1}{a}$.

При $a = 2$ $a + \frac{1}{a} = 2 + \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$. Ответ: $2\frac{1}{2}$.

2. $\log_7(2x - 1) < 2$; $\log_7(2x - 1) < \log_7 49$;

$\begin{cases} 2x - 1 < 49, & \therefore x < 25, \\ 2x - 1 > 0, & \therefore x > 0,5, \end{cases} 0,5 < x < 25$.


Ответ: $(0,5; 25)$.

3. $\cos(\pi + x) = \sin \frac{\pi}{2}$;

$-\cos x = 1$; $\cos x = -1$, $x = \pi + 2\pi k, k \in Z$.

Ответ: $\pi + 2\pi k, k \in Z$.

4.



5. $S = 0,5t^2 + 3t + 2$; $v(t) = S'(t) = t + 3$; $v(t) = 15$ при $t = 12$ с.
 Ответ: 12 с.

Вариант 87.

1. $16^{0,5 \log_4 10} = 4^{\log_4 10} = 10$. Ответ: 10.

2. $0,5 < 2^{1-x} \leq 32$; $2^{-1} < 2^{1-x} \leq 2^5$; $-1 < 1-x \leq 5$; $-4 \leq x < 2$.
 Ответ: -4; -3; -2; -1; 0; 1.

3. $\sin x - \sin^2 x = \cos^2 x$; $\sin x = 1$, $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.


Ответ: $\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 4$; $f'(x) = 6x^2 - 6x$; $f'(-1) = 12$; $k = 12$.

Ответ: 12.

5. $y = -x^3 + 9x^2 + 21x$;
 $y' = -3x^2 + 18x + 21$; $-3x^2 + 18x + 21 < 0$;
 $x^2 - 6x - 7 > 0$. $(x-7)(x+1) > 0$.

Ответ: убывает на $(-\infty; -1]$ и $[7; \infty)$.




Вариант 88.

1. $y = \lg \frac{3x+1}{1-3x}$; $\frac{3x+1}{1-3x} > 0$;

$(3x+1)(3x-1) < 0$;

Ответ: $(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$.



$$2. \left(\frac{1}{25}\right)^{2-x} < 125^{x+1}; \quad 5^{-2(2-x)} < 5^{3(x+1)}, \text{ т.к. } -4 + 2x < 3x + 3, x > -7.$$


Ответ: $(-7; \infty)$.

$$3. 1 + ctg^2 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{1}{\cos^2 \alpha} =$$

$$= \frac{\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha + \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} =$$

$$= \frac{1}{\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}; \text{ что и требовалось доказать.}$$

4.



$$5. f(x) = 5x + 7;$$

$$F(x) = \frac{5x^2}{2} + 7x + C; \quad F(-2) = 4: \frac{5(-2)^2}{2} + 7 \cdot (-2) + C = 4; \quad C = 8;$$

Ответ: $2,5x^2 + 7x + 8$.

Вариант 89.

$$1. \frac{9a^{\frac{4}{5}}}{a^{\frac{9}{5}} + 2a^{\frac{1}{5}}} = \frac{9a^{\frac{4}{5}}}{a^{\frac{4}{5}}(a + 2a^{-1})} = \frac{9a}{a^2 + 2}. \text{ При } a = 5: \frac{9a}{a^2 + 2} = \frac{9 \cdot 5}{5^2 + 2} = \frac{5}{3}.$$

Ответ: $1\frac{2}{3}$.

$$2. \lg(0,5x) < -2; \lg(0,5x) < \lg 0,01; \begin{cases} 0,5x < 0,01, \\ x > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 0,02, \\ x > 0; \end{cases}$$


Ответ: $(0; 0,02)$.

64

3. $\sin x = \frac{4}{5}, \frac{\pi}{2} < x < \pi; \cos x = -\sqrt{1 - \sin^2 x} = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\frac{3}{5}$.

Ответ: -0,6

4.




5. $f(x) = x - x^2; F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + C; F(2) = 10; \frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} + C = 10;$

$C = 10 - 2 + \frac{2^3}{3} = 10\frac{2}{3}$. Ответ: $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + 10\frac{2}{3}$.

Вариант 90.

1. $y = \lg \frac{x+1}{2x-1}; (x+1)(2x-1) > 0;$



Ответ: $(-\infty; -1) \cup (0,5; \infty)$.

2. $32^{2x+3} < 0,25;$

$2^{5(2x+3)} < 2^{-2}; 10x + 15 < -2, x < -1,7$. Ответ: $(-\infty; -1,7)$.

3. $4\sin^2 x = 3; \sin^2 x = \frac{3}{4}; \sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}; x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

4. а) $D(f) = [-3; 6];$

б) $-1,5 \leq f(x) \leq 4$ при $x \in [-2,6; 0,5] \cup [4; 6];$

в) $f(x) = 0$ при $x = -1$ и при $x = 2;$

г) промежуток возрастания $[-3; 2]$, убывания $[2; 6];$

д) $\max_{[-3,6]} f(x) = f(2) = 5,5; \min_{[-3,6]} f(x) = f(-3) = -2,5.$

5. $f(x) = 6(x^2 - 1), g(x) = 6x^2 - 6x + 1$ и $q(x) = 6x(x - 1);$

$F(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1; F'(x) = 6x^2 - 6x.$

Т.к. $F'(x) = q(x)$, то функция $F(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ является

Первообразной функции $q(x) = 6x(x - 1)$. Ответ: $q(x)$.

Вариант 91.

1. $3^{\frac{1}{2} \log_3 4}$; $3^{\frac{1}{2} \log_3 4} = 3^{\log_3 2} = 2$. Ответ: 2.
 2. $\frac{1}{3} < 3^{3+x} < 9$; $3^{-1} < 3^{3+x} < 3^2$. $-1 < 3 + x < 2$, $-4 < x < -1$.

Ответ: -3; -2.

3. $\cos x + \cos^2 x = \frac{1}{2} - \sin^2 x$; $\cos x = \frac{1}{2} - 1$, $\cos x = -\frac{1}{2}$,

$$x = \pm \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) + 2\pi k, k \in Z; \quad x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z.$$

Ответ: $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$.

4. а) $D(f) = [-2, 5; 6]$; б) $-1 \leq f(x) < 2$ при $x \in (-2; -0,5] \cup [2, 8; 3, 8)$;

в) $f(x) = 0$ при $x = 1, 5$ и $x = 4, 5$;


г) промежуток возрастания $- [1, 5; 6]$, убывания $- [-2, 5; 1, 5]$;

д) $\max_{[-2, 5, 6]} f(x) = f(6) = 5, 5$; $\min_{[-2, 5, 6]} f(x) = f(1, 5) = -2, 5$.

5. $f(x) = 1 - 5x - x^2$; $f'(x) = -5 - 2x$;

$k = f'(x_0) = 9$; $-5 - 2x_0 = 9$, $x_0 = -7$, $f(x_0) = -13$. Ответ: $(-7; -13)$.

Вариант 92.



1. $\frac{x(4x-11)}{x-7} < 0$;

Ответ: $(-\infty; 0) \cup (2, 75; 7)$.

2. $16^{6-3x} = 0, 125^{5x-6}$;

$2^{4(6-3x)} = 2^{-3(5x-6)}$, $20 - 12x = -15x + 18$, $x = \frac{2}{3}$. Ответ: $\frac{2}{3}$.

3. $\sin^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$,

что и требовалось доказать

4. а) $D(f) = [-3; 6]$; б) $f(x) \geq 4$ при $x \in \{-1, 5\} \cup [5; 6]$;

в) $f'(x) > 0$ на промежутках $(-3; -1, 5)$ и $(2, 5; 6)$,

$f'(x) < 0$ на промежутке $(-1, 5; 2, 5)$;

г) $x = 2, 5$, $x = -1, 5$

д) $\max_{[-3; 6]} f(x) = f(6) = 5$; $\min_{[-3; 6]} f(x) = f(2, 5) = -3$.

5. $f(x) = x^3 \ln x$;

$$f'(x) = (x^3)' \ln x + x^3 (\ln x)' = 3x^2 \ln x + x^3 \cdot \frac{1}{x} = 3x^2 \ln x + x^2;$$


$$f'(4) = 3 \cdot 4^2 \ln 4 + 4^2 = 16(3 \ln 4 + 1). \quad \text{Ответ: } 16(3 \ln 4 + 1).$$

Вариант 93.

1. $\frac{x^2 - 19x + 84}{2(x-5)} > 0;$

$$2(x-7)(x-12)(x-5) > 0;$$

$$x \in (5; 7) \cup (12; \infty). \quad \text{Ответ: } (5; 7) \cup (12; \infty).$$



2. $\lg(5x+2) = \frac{1}{2} \lg 36 + \lg 2;$

$$\lg(5x+2) = \lg(6 \cdot 2); \quad \begin{cases} 5x+2=12, \\ 5x+2 > 0; \end{cases} \quad x=2. \quad \text{Ответ: } 2.$$

3. $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha + \frac{1}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha} + \frac{1}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} = 0,$

что и требовалось доказать.

4. а) $D(f) = [-3,5; 5]$; б) $f(x) \leq -2$ при $x = -3,5$;

в) прямые, параллельные оси абсцисс, касаются графика в точках $(-1,5; 3)$, $(0; -0,5)$ и $(1; -1,5)$;

г) промежутки возрастания $- [-3,5; -1,5]$ и $[1; 5]$, убывания $- [-1,5; 1]$;

д) $\max_{[-3,5; 5]} f(x) = f(-1,5) = f(5) = 3$; $\min_{[-3,5; 5]} f(x) = f(-3,5) = -2.$

5. $f(x) = -x^2 + 5x$. $f(x) = 0$ при $x = 0$ и $x = 5$.

$$S = \int_0^5 (-x^2 + 5x) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} \right) \Big|_0^5 = -\frac{125}{3} + \frac{125}{2} = \frac{125}{6} = 20\frac{5}{6}.$$


Вариант 94.

1. $y = \lg \frac{4-5x}{x-3}; \frac{4-5x}{x-3} > 0;$

$$(5x-4)(x-3) < 0;$$

$$5(x-0,8)(x-3) < 0;$$

Ответ: $(0,8; 3)$.



$$2. 3^{x-3} + \frac{1}{3} \cdot 3^x > 10; \quad \frac{1}{27} \cdot 3^x + \frac{1}{3} \cdot 3^x > 10, \quad \frac{10}{27} \cdot 3^x > 10, \quad x > 3$$

Ответ: $(3; \infty)$.

$$3. 2\sin^2 x - 1 = 0 \quad 1 - \cos 2x - 1 = 0, \quad \cos 2x = 0,$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in Z. \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in Z.$$

$$4. \text{ а) } D(f) = [-2; 6]; \quad \text{ б) } f(x) > 0 \text{ при } x \in [-2; 4];$$

$$\text{ в) } f(x) > 0 \text{ на промежутке } (-1; 1),$$


$$f(x) < 0 \text{ на промежутках } (-2; -1), (1; 2,5) \text{ и } (2,5; 6);$$

$$\text{ г) } x = -1, x = 1;$$

$$\text{ д) } \max_{[-2;6]} f(x) = 5,5; \quad \min_{[-2;6]} f(x) = -1,5.$$

$$5. y' = 2x - x^2. \quad y = x^2 - \frac{x^3}{3} + C. \quad \text{Ответ: } y = x^2 - \frac{x^3}{3} + C.$$

Вариант 95.



$$1. y = \lg(x^2 - 8x). \\ x^2 - 8x > 0;$$

$$\text{Ответ: } (-\infty; 0) \cup (8; \infty).$$

$$2. 6 \leq 6^{1-x} < 216; \quad 6 \leq 6^{1-x} < 6^3.$$

$$\text{Т.к. } a = 6 > 1, \text{ то } 1 \leq 1 - x < 3, \quad -2 < x \leq 0.$$

$$\text{Ответ: } -1; 0.$$

$$3. \sin^2 x - 0,25 = 0 \quad 1 - \cos 2x = 0,5;$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2}, \quad 2x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \pm \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in Z.$$

$$4. \text{ а) } D(f) = [-3,5; 6]; \quad \text{ б) } f(x) < 0 \text{ при } x \in [-3,5; -3) \cup (1,5; 2,5);$$

$$\text{ в) } f(x) > 0 \text{ на промежутках } (-3,5; -1,5), (2; 4) \text{ и } (4; 6),$$

$$f(x) < 0 \text{ на промежутке } (-1,5; 2);$$

$$\text{ г) } x = -1,5; \quad x = 2;$$

$$\text{ д) } \max_{[-3,5;6]} f(x) = 5,5; \quad \min_{[-3,5;6]} f(x) = -2.$$

$$5. 1) y = 6x; \quad D(y) = R; \quad y' = 6; \quad 6 > 0; \quad y \text{ возрастает};$$

$$2) y = -3x + 1; \quad D(y) = R; \quad y' = -3; \quad -3 < 0; \quad y \text{ убывает};$$

$$3) y = -3x^2; \quad D(y) = R; \quad y' = -6x; \quad y' = 0, \text{ если } x = 0;$$

$$4) y = x^3 + x; \quad D(y) = R; \quad y' = 3x^2 + 1; \quad y' > 0 \text{ на } R, \text{ значит, на всей области определения возрастает.}$$


$$\text{Ответ: } y = 6x \text{ и } y = x^3 + x.$$

Вариант 96.

1. $\frac{7x+x^2}{12x-1} < 0$

$(7x+x^2)(12x-1) < 0$.

Ответ: $(-\infty; -7) \cup (0; \frac{1}{12})$.



2. $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) - \log_{\frac{1}{2}}16 = 5$;


$\log_{\frac{1}{2}} \frac{2x-1}{16} = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{32}$; $\begin{cases} 32(2x-1) = 16, & \begin{cases} x = 0,75, \\ x = 0,75. \end{cases} \\ 2x-1 > 0; \end{cases}$

Ответ: 0,75.

3. $\sin^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$;

что и требовалось доказать.

4.



5. $S'(t) = t - 3$; $S'(t) = 0$ при $t=3$

$S'(t) > 0$ при $t > 3$ и $S'(t) < 0$ при $t < 3$.

Значит $t = 3$ — точка минимума $S(t)$ и $S_{\min}(t) = S(3) = 3,5$ (м).


Ответ: 3,5(м).

StudyPort.ru


Раздел 2. Задания 6,7 для экзамена
«Математика»

Вариант 1.

6.



7.



$AB = a$, т.к. AC – диагональ

$ABCD \Rightarrow AC = \sqrt{2}a$

из $\triangle AMB$: $\operatorname{tg} \angle ABM = \frac{AM}{AB} \Leftrightarrow$


$\Leftrightarrow \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{AM}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow AM = \frac{\sqrt{3}}{3}a \Rightarrow$

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{AM}{AC} = \frac{\sqrt{3}a}{3} : (\sqrt{2}a) = \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}};$

Ответ: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}}$.

Вариант 2.


6.



70

StudyPort.ru

7.



$AB = 4$ см,
 $OM = 6$ см


$$AM = \sqrt{AO^2 + OM^2} = \sqrt{\left(\frac{AC}{2}\right)^2 + OM^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{AD^2 + DC^2}}{2}\right)^2 + OM^2} =$$

$$= \sqrt{\frac{AD^2}{2} + OM^2} = \sqrt{\frac{4^2}{2} + 6^2} = 2\sqrt{11} \text{ (см)}. \text{ Ответ: } AM = 2\sqrt{11} \text{ (см).}$$

Вариант 3.

6. Ребра куба равны, значит равны и диагонали граней.

Данный многогранник имеет своими ребрами шесть диагоналей граней куба, значит, т.к. его грани равносторонние, равные между собой треугольники, то это тетраэдр. (см. рис.)



7. $BC = AC = \frac{AB}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ см.


$\triangle ABCM = \triangle AMC$:

$\Rightarrow \triangle AMB$ – равнобедренный,

$BL = AL = \frac{1}{2} AB = 2$ см.

$ML = \sqrt{BM^2 - BL^2} =$
 $= \sqrt{MC^2 + BC^2 - BL^2} = \sqrt{4 + 12 - 4} = 2\sqrt{2}$

Ответ: $2\sqrt{2}$ см.




Вариант 4.


6. Пусть a – сторона куба, тогда по свойствам куба и теореме Пифагора имеем:

$$CK = CL = CM = ML = LK = MK = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

Значит искомый многогранник является тетраэдром.



7.



$$S_{\text{осн.}} = \pi R^2 = 16\pi \text{ см}^2$$

$$S_{\text{бок.}} = l \cdot H = 2\pi R \cdot H = 8\pi H = 2S_{\text{осн.}} = 32\pi \Rightarrow$$

$$H = 4 \text{ (см).}$$

$$V_{\text{цил.}} = H \cdot S_{\text{осн.}} = 4 \cdot 16\pi = 64\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$


$$\text{Ответ: } 64\pi \text{ см}^3.$$

Вариант 5.

6. Искомый многогранник – правильная треугольная пирамида с основанием LMN , где $LM=MN=NL$, $\Delta LNQ=\Delta MLP$, т.к. $QN = QH = PL = PM$, с равным углом между ними, т.к. $AP \perp SB$, $CP \perp SP$ и $BQ \perp SA$, $CQ \perp SA$ (двугранные углы, образованные боковыми гранями правильной треугольной пирамиды равны между собой), для доказательства $MN = LN$ поступают аналогично.

Аналогично, по равенству граней и равенству двугранных углов, образованных плоскостью основания и боковой стороной правильной пирамиды, и по тому, что ΔABC равносторонний и его высоты есть медианы, т.е. $HH_1 = HH_2 = HH_3$, доказывается, что $HL = HM = HN$.

7.



Из подобия $\triangle AC_1C$ и $\triangle AB_1B$ имеем $\frac{AC_1}{AB_1} = \frac{AC}{AB} = \frac{2}{3} \Rightarrow AB_1 = 18$ (см).

Ответ: $AB_1 = 18$ см.

Вариант 6.

6. В основании искомого многогранника пол-ся квадрат, т.к. $\triangle AML = \triangle BMN = \triangle CNO = \triangle DOL$, т.к. $ABCD$ – квадрат и его углы прямые, и L, M, N, O – середины сторон квадрата. SH – высота, H – центр основания, значит $SLMNO$ – правильная четырехугольная пирамида, в которой $\triangle SMN = \triangle SNO = \triangle SOL = \triangle SLM$.

7. см. рис. вариант 3. Задача 7.

$\triangle BCM = \triangle AMC \Rightarrow$

$\Rightarrow \triangle AMB$ – равнобедренный:

$AM = MB, ML \perp AB \Rightarrow ML$ – медиана


на $\triangle AMB \Rightarrow AL = LB = \frac{AB}{2}$.

$\triangle ALC$ прямоугольный и равнобедренный (т.к. $\angle CAL = 45^\circ$) \Rightarrow

$\Rightarrow LC = AL = \frac{AB}{2}$.

$$CM = \sqrt{LM^2 - LC^2} = \sqrt{LM^2 - \frac{AB^2}{4}} = \sqrt{25 - 9} = 4 \text{ (см)}.$$


Ответ: $CM = 4$ см.



Вариант 7.

6. Т.к. прямые не имеют общих точек и не задают одну плоскость (т.е. плоскости α принадлежат точки: A, M, N , а плоскости β принадлежат точки: B, N, M). Значит, прямые секущиеся.

7.



$ABB_1A_1=CDD_1C_1$, т.к. это квадраты со стороной 6 см. $AB=CD=6$ см.

Пусть $AD = 2x \Rightarrow BC = x$ из условия.

$$S_{\text{осн}} = H(2x + x + AB + CD) = (3x + 12) \cdot H = (3x + 12) \cdot 6 = 144 \text{ см}^2$$

$$18x = 72; x = 4 \text{ (см)}.$$

В трапеции $ABCD$ высота вычисляется по т. Пифагора и равна

$$h = \sqrt{AB^2 - \left(\frac{AD - BC}{2}\right)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \text{ (см)}. S_{\text{осн}} = \frac{1}{2}h(BC + AD);$$


$$S_{\text{осн}} = 24\sqrt{2} \text{ см}^2; V = 144\sqrt{2} \text{ см}^3. \text{ Ответ: } V = 144\sqrt{2} \text{ см}^3.$$

Вариант 8.

6. Плоскость разбивает призму на две пирамиды:

1. с вершиной C' и с основанием $\triangle ABC$,
2. с вершиной C' и основанием $ABB'A'$ (параллелограмм).

7.



$$\triangle AC_1C \sim \triangle ABB_1, \text{ значит } \frac{AC}{AB} = \frac{AC_1}{AB_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow AB_1 = 2AC_1 = 16 \text{ см}.$$

Ответ: $AB_1 = 16$ см.

74

Вариант 9.


6. Если точки A, B, A', B' лежали бы в одной плоскости, то AB было бы параллельно $B'A'$, но (см. рис.) AB не параллельно $B'A'$, значит, AA' и BB' – секущиеся.

7. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot H$

$BC = AC \cdot \operatorname{tg} \angle BAC = AC \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = \sqrt{3}$ см.

$V = \frac{1}{3}\pi \cdot BC \cdot AC^2 = \frac{1}{3}\pi \cdot \sqrt{3} \cdot 9 = 3\sqrt{3}\pi$ см³.

Ответ: $V = 3\sqrt{3}\pi$ см³.



Вариант 10.

6. Плоскость, проходящая через A, B и M (сердину отрезка CC'), пересекает и ребро DD' , а поскольку $ABCD$ – параллелограмм, то $AB \parallel CD$, а т.к. грань $ABB'A'$ параллельна $CDD'C'$, то $AB \parallel MN$, значит $MN \parallel DC$.

Тогда $\square MNDC$ – параллелограмм, т.е. $MN = DC$, т.е. $MN = AB$, а значит по признаку параллелограмма $\square ABMN$ – параллелограмм.


7. Так как пирамида правильная, то

$h' = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$, где a – ребро основания,

h – высота, h' – высота боковой грани.


$a = 2\sqrt{(h')^2 - h^2} = 2\sqrt{225 - 144} = 18$ (см).

$b = 2\sqrt{h^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{144 + 162} = \sqrt{306}$ (см). Ответ: $\sqrt{306}$ (см).




Вариант 11.

6. По условию $AM = A'M'$ и $AM \parallel A'M'$, значит, $AMM'A'$ – параллелограмм, и $AA' \parallel MM'$, отсюда AA' параллельна плоскости данного сечения, значит $AA' \parallel NN'$, т.к. грань $ADD'A'$ пересекается с плоскостью сечения в NN' . Верхняя грань параллельна нижней, и значит, $MN \parallel M'N'$.




Т.к. $MN \parallel M'N'$ и $NN' \parallel MM'$, то $MNN'M'$ – параллелограмм, $MN = M'N'$ и $MM' = NN'$.



7.
 $S_{\text{сеч.}} = 2R \cdot H = 20 \text{ см}^2$
 $S_{\text{бок.}} = 2\pi R \cdot H = 20\pi \text{ см}^2$
 Ответ: $S_{\text{бок.}} = 20\pi \text{ см}^2$.


Вариант 12.

6.



С Проведем перпендикуляр из точки M к $A'C$, основание этого перпендикуляра будет точка – центр куба, значит, эта плоскость пересекает ребро DD' в середине (точка M'), т.е. $MM' \perp A'C$. Плоскость данного сечения пересекает еще ребра: AB в точке N' (симметричной относительно точки O точки N на ребре $C'D'$), и AD в точке L' (симметричной относительно точки O точки L на $B'C'$), далее еще ребра $C'D'$ и $B'C'$ аналогично, и получаем шестиугольник $LMN'L'M'N'$ с центром O .

Особенность: Диагональ MM' этого шестиугольника разбивает его на две равные равнобедренные трапеции.



7.

т. $C \in \alpha$ и т. $C \in AA_1BB_1$
 т. $C \in A_1B_1$; $AA_1C \sim CBB_1$
 $AC : CB = A_1C : CB_1 = 1 : 1$
 $AC : AB = A_1C : A_1B_1 = 1 : 2$
 $\Rightarrow A_1B_1 = 2A_1C = 16 \text{ см.}$
 Ответ: $A_1B_1 = 16 \text{ см.}$

Вариант 13.

6.

Проведем через точки A, B и A', B' прямые. Из рисунка видно, что $AB \parallel A'B'$ и $AB = A'B'$, значит, $ABB'A'$ – параллелограмм, и $AA' \parallel BB'$, т.е. a и b – параллельные прямые.



7. Из прямоугольника $\triangle ABC$ $BC = 8$ см.

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot H =$$

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot H = \frac{1}{3} \pi AC^2 \cdot BC = \frac{1}{3} \pi \cdot 36 \cdot 8 = 96\pi \text{ см}^3.$$

Ответ: $V = 96\pi \text{ см}^3$.



Вариант 14.

6.


Плоскость сечения проходит через центр верхней грани, и т.к. MN параллельна нижней диагонали AC (и $AC \parallel A'C'$), то $MN \parallel AC$, и значит, сечение есть трапеция $MNC'A'$, которой $MA' = NC'$, т.к. $\triangle AMA' = \triangle CNC'$ по двум катетам.

7. см. рис. варианта 3. задачи 7.

Так как $\triangle ALC$ – равнобедренный, то $AL = BL = \frac{1}{2} AB = 4$ см. $\angle ALC$ также равнобедренный ($\angle CAL = 45^\circ$, $\angle CLA = 90^\circ$). Значит

$$CL = AL = 4 \text{ см. } ML = \sqrt{MC^2 + CL^2} = \sqrt{16 + 9} = 5 \text{ (см).}$$

Ответ: $ML = 5$ см.



Вариант 15.

6. Проведем $MK \parallel A'B'$. Тогда K – середина стороны BB' .

Из свойств куба заключаем, что $\square MD'C'K$ и $\square KBNC'$ – параллелограммы. Откуда $MD' \parallel BN$, а значит D' принадлежит искомому сечению. Из свойства куба и теоремы Пифагора имеем: $BN = DN = MD' = MB$, т.е. в сечении получается ромб, не являющийся квадратом (как легко показать из теоремы косинусов).


7. Т.к. у прямоугольного треугольника середина гипотенузы – это центр описанной окружности, то

$$AO = OB = OC = \frac{1}{2} \sqrt{36 + 64} = 5 \text{ см, т.е.}$$


$$\triangle OSA = \triangle COS = \triangle SOB \Rightarrow SA = SC = SB =$$

$$= \sqrt{SO^2 + AO^2} = \sqrt{100 + 25} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}.$$


Ответ: $SA = SB = SC = 5\sqrt{5}$ см.




Вариант 16.



6. Предположим, что AC и BD лежат в одной плоскости. Тогда плоскости (ACBD), пересекает параллельные плоскости α и β по параллельным прямым AB и CD. Но как видно из рисунка $AB \nparallel CD$, значит прямые AC и BD не лежат в одной плоскости, т.е. являются секущими.



7. Найдем l из рис. 16.7. б):
 $l = \frac{120^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi R = \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 4 = \frac{8}{3}\pi$ (см). l из рис. 16.7. а):
 $l = 2\pi r_{\text{осн.}} \Rightarrow r_{\text{осн.}} = \frac{4}{3}$ (см) $\Rightarrow S_{\text{осн.}} = \pi r_{\text{осн.}}^2 = \frac{16}{9}\pi$



$$V_{\text{кон.}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot H = \frac{16}{27}\pi \cdot H$$


$$H = \sqrt{R^2 - r_{\text{осн.}}^2} = \sqrt{16 - \frac{16}{9}} = \frac{8}{3}\sqrt{2} \text{ (см).}$$

$$V_{\text{кон.}} = \frac{16}{27}\pi \cdot \frac{8}{3}\sqrt{2} = \frac{128\sqrt{2}}{81}\pi \text{ (см}^3\text{).}$$


Ответ: $V = \frac{128\sqrt{2}}{81}\pi$ (см³).

Вариант 17.

6.



7.




$$R = OA = \sqrt{OO_1^2 + O_1A_1^2} = \sqrt{64 + 225} = 17 \text{ (см);}$$


$$S_{\text{пов.}} = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 17^2 = 1156\pi \text{ (см}^2\text{)}. \quad \text{Ответ: } 1156\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

Вариант 18.

6.



7.



$$d = \sqrt{2}a = 2\sqrt{2}R \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R = 4 \text{ см} \Rightarrow H = 8 \text{ см.}$$


$$S_{\text{осн.}} = \pi R^2 = 16\pi \text{ см}^2;$$

$$V = 16\pi \cdot 8 = 128\pi \text{ см}^3.$$


Ответ: $V = 128\pi \text{ см}^3$.

Вариант 19.

6.



7.




$$a = \frac{R}{\cos 30^\circ} = 6 \text{ (см).}$$

$$S_{\text{бок.}} = \pi R a,$$


$$S_{\text{бок.}} = \pi \cdot 3 \cdot 6 = 18\pi \text{ см}^2.$$

Ответ: $S_{\text{бок.}} = 18\pi \text{ см}^2$.

Вариант 20.



6. Точка E не принадлежит прямой AD , значит отрезки не пересекаются, так как прямые BC и AD скрещивающиеся.



7. В основании лежит равнобедренный треугольник с $\angle = 90^\circ$; $V = S_{\text{осн.}} \cdot H = \frac{1}{2}a^2 \cdot H \Rightarrow H = \frac{2V}{a^2}$;


$$H = \frac{2 \cdot 108}{36} = 6 \text{ см. } S_{\text{пол.}} = 2S_{\text{осн.}} + S_{\text{бок.}} =$$

$$= a^2 + 2aH + \sqrt{a^2 + a^2} \cdot H = a^2 + 2aH + \sqrt{2}aH =$$


$$= 36 + 2 \cdot 6 \cdot 6 + \sqrt{2} \cdot 6 \cdot 6 = 36(3 + \sqrt{2}) \text{ см}^2.$$

Ответ: $S_{\text{пол.}} = 36(3 + \sqrt{2}) \text{ см}^2$.

Вариант 21.



6. Точки A, B, C, D , не лежат в одной плоскости, следовательно прямые AD и BC – скрещивающиеся.



7. $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

$$K = \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{SO}{S_1O_1} = 2 - \text{коэффициент.}$$

Значит их площади относятся как 4:1

$$S_{A_1B_1C_1} = \frac{1}{4}S_{ABC}.$$

Второй катет $S\triangle ABC = 12 \text{ см}$;


$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 12 = 54$$

$$S_{A_1B_1C_1} = \frac{27}{2} \text{ см}^2.$$

Ответ: $S_{A_1B_1C_1} = \frac{27}{2} \text{ см}^2$.

Вариант 22.

6. Плоскость ADB' разбивает параллелепипед на равные призмы с основаниями – треугольниками, получаемые из параллелограмма (боковых граней) и его диагонали, которая разбивает его на два равных треугольника. У многогранников, боковые ребра равны и параллельны.




7. см. рис. варианта 2. задачи 7.

$$AC = \sqrt{2}AB = 4\sqrt{2} \text{ см}; \quad OC = \frac{1}{2}AC = 2\sqrt{2} \text{ см};$$

$$OM = \sqrt{CM^2 - OC^2} = \sqrt{36 - 8} = 2\sqrt{7} \text{ см. Ответ: } OM = 2\sqrt{7} \text{ см.}$$

Вариант 23.

6. Если бы прямые AD и BC пересеклись, то прямые AB и CD лежали бы в одной плоскости, а значит были бы параллельны, но это не так. Так что AD и BC скрещивающиеся.




$$7. AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{36 + 64} = 10 \text{ см};$$

$$AO = \frac{1}{2}AC = 5 \text{ см};$$

$$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{169 - 25} = 12 \text{ см};$$

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot SO = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 8 \cdot 12 = 192 \text{ см}^3;$$

Ответ: $V = 192 \text{ см}^3$.




Вариант 24.

6.



StudyPort.ru



$$7. S_{\text{осн.}} = \frac{1}{2} AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24 \text{ (см}^2\text{)};$$

$$SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} =$$


$$= \sqrt{SB^2 - \left(\frac{BD}{2}\right)^2} = \sqrt{25 - 9} = 4 \text{ (см)};$$

$$V = \frac{1}{3} SO \cdot S_{\text{осн.}} = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 4 = 32 \text{ (см}^3\text{)};$$

Ответ: $V = 32 \text{ см}^3$.

Вариант 25.

6. Та же задача, что вариант 14 (6), только рис. повернуть «кверху ногами».




$$7. V = \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}; r = 3 \text{ см.}$$

$$S = 4\pi r^2 = 36\pi \text{ см}^2.$$

Ответ: $S = 36\pi \text{ см}^2$.

Вариант 26.



6. Сечение проходит через одно из ребер, т.к. прямая OO' , соединяющая центры оснований, параллельна каждому из боковых ребер. Углы у сечения прямые, значит, $SMM'C'$ – прямоугольник, т.е. $MS = M'C'$ и $SC' = MM'$.


$$7. \text{ Пусть } SB = SA = 6 \text{ см}; SC = 8 \text{ см};$$

$$AB = \sqrt{SB^2 + SA^2} = 6\sqrt{2} \text{ см};$$

$$AC = \sqrt{SA^2 + SC^2} = 10 \text{ см};$$

$$BC = \sqrt{SC^2 + SB^2} = 10 \text{ см};$$

$$P_{\text{осн.}} = 6\sqrt{2} + 10 + 10 = (20 + 6\sqrt{2}) \text{ см};$$



$$P = (10 + 3\sqrt{2}) \text{ см};$$

$$S_{\text{осн.}} = \sqrt{(10 + 3\sqrt{2})(10 - 3\sqrt{2})} \cdot 3\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} = \\ = \sqrt{(100 - 18)} \cdot 9 \cdot 2 = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{82} = 6\sqrt{41} \text{ см}^2;$$

$$S_{\text{бок.}} = S_{SAB} + S_{SBC} + S_{SAC}; S_{ACS} = S_{BCS} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24 \text{ см}^2;$$


$$S_{SAB} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18 \text{ см}^2; S_{\text{нов.}} = 6\sqrt{41} + 18 + 24 + 24 = (66 + 6\sqrt{41}) \text{ (см}^2\text{)}$$

$$\text{Ответ: } S_{\text{нов.}} = (66 + 6\sqrt{41}) \text{ см}^2.$$


Вариант 27.

6.

Как видно из построенного рисунка, точки K, M, N, и L не лежат в одной плоскости, значит прямые KN и LM – скрещивающиеся.



7.




$$S_{\text{нов1}} = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot 16 = 64\pi \text{ см}^2; 2S_{\text{нов1}} = S_{\text{нов2}} = 128\pi \text{ см}^2;$$


$$S_{\text{нов2}} = 4\pi R^2 \Rightarrow R = \sqrt{\frac{S_{\text{нов2}}}{4\pi}} = \sqrt{\frac{128\pi}{4\pi}} = 4\sqrt{2} \text{ см};$$

$$V_2 = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 64 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{512\sqrt{2}}{3}\pi \text{ см}^3; \text{ Ответ: } V = \frac{512\sqrt{2}}{3}\pi \text{ см}^3.$$

Вариант 28.





6. Как видно из построенного рисунка, точки К, М, N, и L не лежат в одной плоскости, значит прямые KM и LN – скрещивающиеся.



7. $S_{\text{пол.}} = 2S_{\text{осн.}} + S_{\text{бок.}}$
 $S_{\text{осн.}} = \pi R^2 = \pi \left(\frac{AB}{2}\right)^2 = 9\pi \text{ см}^2;$
 $S_{\text{бок.}} = 2\pi R \cdot AD = 2\pi \left(\frac{AB}{2}\right) \cdot AD = 60\pi \text{ см}^2;$
 $S_{\text{пол.}} = 18\pi + 60\pi = 78\pi \text{ см}^2;$ Ответ: $S_{\text{пол.}} = 78\pi \text{ см}^2.$

Вариант 29.



$$AB = AC \cdot \sin 30^\circ = 6 \text{ см};$$

$$CB = AC \cos 30^\circ = 6\sqrt{3} \text{ см};$$

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot AB =$$


$$= \frac{1}{3} \pi BC^2 \cdot AB =$$

$$\frac{1}{3} \pi \cdot 36 \cdot 3 \cdot 6 = 216\pi \text{ см}^3;$$


Ответ: $V = 216\pi \text{ см}^3.$

Вариант 30.

6.




7. $H = R = \frac{a\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$ см;
 $S_{\text{пол.}} = \pi R(a + R) =$
 $= \pi \cdot 4\sqrt{2}(8 + 4\sqrt{2}) = 16\sqrt{2}(2 + \sqrt{2})$ см²;
 Ответ: $S_{\text{пол.}} = 32(1 + \sqrt{2})$ см².




Вариант 31.


6. Из свойств квадрата имеем:
 $OL = LM = MN = NO$. Значит искомым
 многогранник – правильная четырех-
 угольная пирамида.



7.
 $S_{\text{бок.}} = \pi Rl = 20\pi$,
 $S_{\text{осн.}} = \pi R^2 = 16\pi \Rightarrow R = 4$ (см) $\Rightarrow l = 5$ (см);
 $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$; $H = \sqrt{l^2 - R^2} \Rightarrow H = 3$ см \Rightarrow
 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 4^2\pi = 16\pi$ (см³).
 Ответ: $V = 16\pi$ см³.




Вариант 32.




7.
 см. рис. варианта 31. задачи 7.
 $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H \Rightarrow H = \frac{3V}{\pi R^2} = \frac{3 \cdot 96\pi}{\pi \cdot 36} = 8$ см
 $l = \sqrt{H^2 + R^2} = \sqrt{64 + 36} = 10$ см \Rightarrow
 $S_{\text{бок.}} = \pi Rl = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi$ см²
 Ответ: $S_{\text{бок.}} = 60\pi$ см².

Вариант 33.

6.



7.



т. $C \in \alpha$, т. $C \in AA_1BB_1 \Rightarrow C \in A_1B_1$

$AA_1C \sim CB_1B_1$


$$\frac{AC}{CB} = \frac{A_1C}{CB_1} = \frac{3}{1} \quad \text{или} \quad \frac{AC}{AB} = \frac{A_1C}{A_1B_1} = \frac{3}{4} \Rightarrow$$

$$A_1B_1 = \frac{4}{3} A_1C = \frac{4}{3} \cdot 15 = 20 \text{ см}$$


Ответ: $A_1B_1 = 20$ см.

Вариант 34.

6.



7.



$$l = \frac{H}{\cos 60^\circ} = \frac{12}{1/2} = 24 \text{ (см).}$$

$$R = H \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = 12\sqrt{3} \text{ (см).}$$


$$S_{\text{пол.}} = \pi R(R + l) =$$

$$= \pi \cdot 12\sqrt{3}(12\sqrt{3} + 24) = 144\sqrt{3}\pi(2 + \sqrt{3}) \text{ (см}^2\text{)}$$



Ответ: $S_{\text{пол.}} = 144\sqrt{3}\pi(2 + \sqrt{3}) \text{ см}^2$.

Вариант 35.

6.



7.




$$S_{\text{бок.1}} = \pi Rl = \pi \cdot AC \cdot AB; \quad S_{\text{бок.2}} = \pi Rl = \pi \cdot BC \cdot AB$$


$$\frac{S_{\text{бок.1}}}{S_{\text{бок.2}}} = \frac{\pi \cdot AC \cdot AB}{\pi \cdot BC \cdot AB} = \frac{AC}{BC} = \frac{3}{4}. \quad \text{Ответ: } \frac{S_{\text{бок.1}}}{S_{\text{бок.2}}} = \frac{3}{4}.$$

Вариант 36.

6.



7.




$$AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = 10\sqrt{2} \text{ см};$$

$$OC = \frac{1}{2}AC = 5\sqrt{2} \text{ см};$$

$$SO = \sqrt{SC^2 - OC^2} = \sqrt{169 - 50} = \sqrt{119} \text{ (см)}$$

$$\text{Ответ: } SO = \sqrt{119} \text{ см.}$$

Вариант 37.




6. Из соображений симметрии видно, что точки L и N являются серединами сторон AB и BC. Откуда $\triangle LMB = \triangle NMB \Rightarrow LM = MN$. Значит в сечении равносторонний треугольник.

7. см. рис. варианта 40. задачи 7.

$$S_{\text{осн.}} = 2S_{\text{бок.}} \quad S_{\text{осн.}} = \pi R^2; \quad S_{\text{бок.}} = 2\pi RH \Rightarrow H = \frac{1}{4}R = 2 \text{ (см);}$$

$$V = H \cdot S_{\text{осн.}} = H \cdot \pi R^2 = 2 \cdot \pi \cdot 64 = 128\pi \text{ (см}^3\text{)}. \quad \text{Ответ: } V = 128\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Вариант 38.



6. Как видно из рисунка точка K не лежит в плоскости (MNL), т.е. KL и MN – скрещивающиеся


7. см. рис. варианта 40. задачи 7.

$$S_1 = S_{\text{CBEF}} = 108; \quad 3l = 3H = 2R;$$

$$S_1 = 3l \cdot l = 108 \Rightarrow l^2 = 36 \Rightarrow l = 6 \text{ см}; \quad R = \frac{3}{2}l = 9 \text{ см.}$$

$$S_{\text{пол.}} = 2\pi R(H + R) = 2\pi \cdot 9 \cdot 15 = 270\pi \text{ см}^2. \quad \text{Ответ: } S_{\text{пол.}} = 270\pi \text{ см}^2.$$

Вариант 39.




7. см. рис. варианта 35. задачи 7. а)

$$S_{\text{пол.}} = \pi R(l + R) = \pi R(\sqrt{R^2 + H^2} + R) = \pi \cdot 3(\sqrt{9 + 16} + 3) = 24\pi \text{ см}^2$$


$$\text{Ответ: } S_{\text{пол.}} = 24\pi \text{ см}^2.$$

6.



Вариант 40.

7.




$$2H = l_2 = 2\pi R \Rightarrow H = 6\pi \text{ см.}$$

$$S_{\text{пол.}} = 2\pi R(H + R) = 2\pi \cdot 6 \cdot (6 + 6\pi) = 72\pi(\pi + 1) \text{ см}^2.$$

Ответ: $72\pi(\pi + 1) \text{ см}^2$.


Вариант 41.

6.



MN – средняя линия.
По свойствам куба имеем: $MN \parallel KL$, т.е. ML и KN – пересекаются.

7.




$$V = S_{\text{осн.}} \cdot BC = \pi \left(\frac{AB}{2}\right)^2 \cdot BC = 36\pi \text{ см}^3$$

Ответ: $V = 36\pi \text{ см}^3$.


Вариант 42.

6.



Ответ: нет.

StudyPort.ru



$$7. MO = \sqrt{MB^2 - BO^2}$$


$$BO = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}\sqrt{2}AB = \frac{\sqrt{2}}{2}AB = \sqrt{2} \text{ см}$$

$$MB = \frac{AB}{\cos 60^\circ} = 2AB = 4 \text{ см} \Rightarrow$$

$$MO = \sqrt{16 - 2} = \sqrt{14} \text{ см. Ответ: } MO = \sqrt{14} \text{ см.}$$


Вариант 43.

6.



В силу симметрии имеем:
 $QN = MN = ML = LQ$
 $OQ = ON = OM = OL = O'L =$
 $= O'M = O'N = O'Q$

7.




т. $C_1 \in AB_1$ (см. задачу 4.7.)

т. Фалеса:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AB_1}{AC_1} = \frac{5}{3} \Rightarrow AC_1 = \frac{3}{5}AB_1 = 9 \text{ см}$$

Ответ: $AC_1 = 9$ см.

Вариант 44.




6.

Проведем прямую AB до пересечения с вершиной двугранного угла прямой a , получим точку O , потом через B параллельно AC проведем прямую и получим на отрезке OC точку D .

$$\begin{aligned}
 7. \quad MB &= \sqrt{MC^2 + AB^2} = \sqrt{AC^2 \operatorname{tg}^2 60^\circ + AB^2} = \\
 &= \sqrt{\frac{1}{2} AB^2 \cdot 3 + AB^2} = \\
 &= AB \sqrt{\frac{5}{2}} = 6 \sqrt{\frac{5}{2}} = 3\sqrt{10} \text{ см}
 \end{aligned}$$

Ответ: $MB = 3\sqrt{10}$ см.



Вариант 45.


6. См. вар. 44. Рисунок.

7.

CC_1 – средняя линия трапеции ABB_1A_1

$$\Rightarrow CC_1 = \frac{AA_1 + BB_1}{2} = \frac{13}{2} \text{ см}$$


Ответ: $CC_1 = \frac{13}{2}$ см.



Варианты 46 и 47.

6.

Аналогично, как в вар. 44, получаем, что A, B, C и D принадлежат одной плоскости.



№ 46.7.

$$AM^2 = MB^2 + AB^2 - 2MB \cdot AB \cdot \cos \angle ABM$$


$$\cos \angle ABM = \frac{MB^2 + AB^2 - AM^2}{2MB \cdot AB} = \frac{AB}{2MB}$$

Пусть $AB = a$, тогда

$$OB = \frac{1}{2} BD = \frac{\sqrt{2}}{2} AB = \frac{\sqrt{2}}{2} a \Rightarrow MB = \sqrt{2} a \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos \angle ABM = \frac{2a^2 + a^2 - 2a^2}{2 \cdot \sqrt{2} a \cdot a} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Ответ: $\cos \angle ABM = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.



№ 47.7. см. рис. варианта 2. задачи 7.


$$AC = 6 \text{ см} \Rightarrow AB = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{ (см)}; \quad OK = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ (см)}.$$

$$MK = \sqrt{MO^2 + OK^2}; \quad MK = \sqrt{\frac{9 \cdot 2}{4} + 25} = \sqrt{\frac{59}{2}} \text{ (см)}.$$

Ответ: $MK = \sqrt{\frac{59}{2}}$ (см).

Вариант 48.

6.



7.


см. рис. варианта 40. задачи 7.

$$S_{\text{осн.}} = \pi R^2 = 36\pi \text{ (см}^2\text{)};$$

$$V = S_{\text{осн.}} \cdot H = 36\pi \cdot 10 = 360\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Ответ: $V = 360\pi$ (см³).


Вариант 49.



6.

Проведем через точку A прямую a , параллельную CD , а потом прямую DM , и на пересечении a и DM получим точку B . Все пять точек лежат в одной плоскости.

7.



т.к. середина гипотенузы прямоугольного треугольника – это центр описанной окружности, то $AO = OB = OC$ и $SA = SB = SC$.

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{36 + 64} = 10 \text{ (см)}.$$


$$SA = \sqrt{AO^2 + SO^2} = \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + SO^2} =$$

$$\sqrt{\frac{36 + 64}{4} + 144} = 13 \text{ (см)}. \quad \text{Ответ: } SA = SB = SC = 13 \text{ (см)}.$$

Вариант 50.

6.

Через точку C проведем параллельную AB прямую a . И на ней отложим от точки C расстояние, равное длине AB . Получим, что $ABCD$ – параллелограмм, т.к. $AB = CD$, $AB \parallel CD$. Значит, $AC \parallel BD$.




7.

O_1L – средняя линия $\triangle A_1B_1A$, т.к. по т. Фалеса: $AO_1:O_1B_1=AL:LB_1=1:1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow O_1L = \frac{5}{2} \text{ (см).}$$

OL – средняя линия $\triangle ABB_1 \Rightarrow BB_1 = 2OL = 2(OO_1 + O_1L) = 16 + 5 = 21$ (см).




Вариант 51.


6.

1. Через точку C проведем параллельную AB прямую a .

2. Прямая AM пересечет a в точке D , т.к. $AB \parallel a$, C и D принадлежат a , и поэтому A, B, M, C, D принадлежат плоскости, определенной AB и a .




7.



$$BC = AB \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5 \text{ (см).}$$


$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot BC = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot BC = \frac{1}{3} \pi AC^2 \cdot BC = \frac{1}{3} \pi (AB^2 - BC^2) \cdot BC = \frac{1}{3} \pi \cdot (100 - 25) \cdot 5 = 125\pi \text{ (см}^3\text{)}. \text{ Ответ: } V = 125\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Вариант 52.



6. Кроме точек A и B больше точек отрезка AB не принадлежит поверхности цилиндра, т.к. AB не образующая (AB не параллельна OO').

7. $S_{\text{бок.}} = \frac{SK}{2} \cdot (AB + BC + CA) = \frac{3}{2} SK \cdot AB;$



$$SK = \sqrt{SC^2 + CK^2} = \sqrt{SC^2 - \left(\frac{CB}{2}\right)^2},$$

(так как пирамида правильная)



$$SK = \sqrt{100 - 36} = 8 \text{ (см).}$$

$$S_{\text{бок.}} = \frac{3}{2} \cdot 8 \cdot 12 = 144 \text{ (см).}$$

Ответ: $S_{\text{бок.}} = 144$ (см).

Вариант 53.

6. См. вар. 52.



$SK = 13$ см; $S_{ABCD} = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 = AD \cdot h$,
где h — высота ромба, проведенная из т. B .

$$h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2AD}; \quad AD = \sqrt{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2} = 25 \text{ (см).}$$

$$h = \frac{30 \cdot 40}{50} = 24 \text{ (см).}$$

$$OK = \frac{1}{2}h = 12 \text{ (см.)}$$


$$SO = \sqrt{SK^2 - OK^2} = \sqrt{169 - 144} = 5 \text{ (см.)}$$

Ответ: 5 (см).

Вариант 54.

6.


Прямая AB не проходит через вершину S , и поэтому AB – не образующая, и поверхности конуса принадлежат только точки A и B .



7.

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} AM \cdot \frac{1}{2} BA \cdot AD = \\ &= \frac{1}{6} BA \cdot AD \cdot BA \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{18} AB^2 \cdot AD = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{18} \cdot 4 \cdot 5 = \frac{10\sqrt{3}}{9} \text{ (см}^3\text{)}. \end{aligned}$$


Ответ: $V = \frac{10\sqrt{3}}{9}$ (см³).




Вариант 55.

6.

Поскольку прямые пересекаются, значит, они задают плоскость, в которой лежат точки A, B, C и D . Из рисунка видно, что AB не параллельна CD , значит, α и β пересекаются, т.к. если α и β параллельны, то $AB \parallel CD$.







7.
 $S_{\text{пол.}} = 6S_{ABCD} = 6a^2;$
 $24 = 6a^2; a = 2 \text{ (см).}$
 $BD_1 = \sqrt{A_1D_1^2 + A_1B^2} =$
 $= \sqrt{A_1D_1^2 + AB^2 + AA_1^2} = a\sqrt{3}$
 $a = 2 \Rightarrow BD_1 = 2\sqrt{3} \text{ (см).}$
 Ответ: $BD_1 = 2\sqrt{3} \text{ (см).}$


Вариант 56.

6. См. вариант 55, задача 6



7.
 $b = 6; c = 4;$
 $S_{\text{пол.}} = 2ab + 2ac + 2bc = 20a + 48 = 136;$
 $20a = 88; a = \frac{22}{5} \text{ (см);}$
 $V = abc = \frac{22}{5} \cdot 4 \cdot 6 = \frac{528}{5} \text{ (см}^3\text{).}$

Вариант 57.



6.
 AC \parallel BD, значит точки A, B, C, D лежат в одной плоскости.
 Но AB \nparallel CD, значит α и β пересекаются.


7.

$$c = b \operatorname{tg} 60^\circ = b\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \text{ см}$$

$$S_{\text{пол.}} = 2S_{\text{осн.}} + 2(a+b) \cdot c = 2ab + 2(a+b) \cdot c =$$

$$= 2 \cdot 15 + 2 \cdot 8 \cdot 5\sqrt{3} = 10(3 + 8\sqrt{3}) \text{ см}^2$$


Ответ: $S_{\text{пол.}} = 10(3 + 8\sqrt{3}) \text{ см}^2$.




Вариант 58.

6.

MN и KL принадлежат плоскостям основания, значит, эти прямые не пересекаются, т.к. нижнее основание параллельно верхнему. Но из рис. видно, что KL не параллельно MN , и значит KN и LM – скрещивающиеся прямые.



7.



$$d = \sqrt{2}a \Rightarrow a = 6 \text{ см,}$$

$$2R = a \Rightarrow R = 3 \text{ см}$$

$$S_{\text{пол.}} = 2S_{\text{осн.}} + S_{\text{бок.}} =$$

$$= 2\pi R(H + R) = 2\pi R(a + R) =$$

$$= 2\pi \cdot 3(6 + 3) = 54\pi \text{ см}^2.$$


Ответ: $S_{\text{пол.}} = 54\pi \text{ см}^2$.


Вариант 59.

6.

Т.к. точка пересечения медиан в равностороннем треугольнике, то эта точка O есть центр основания призмы.

Через точку O проведем параллельную прямую MN , параллельную AB . Значит, сечение $ABNM$ – это равнобокая трапеция ($AM = BN$).





7.


$$S_{\text{пол.}} = 2\pi R(H + R) = 2\pi a \cos 30^\circ (a \cos 30^\circ + a \sin 30^\circ) =$$

$$= 2\pi a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \right) = \pi \cdot 2(3 + \sqrt{3}) = 2(3 + \sqrt{3})\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

Ответ: $S_{\text{пол.}} = 2(3 + \sqrt{3})\pi \text{ (см}^2\text{)}.$


Вариант 60.

6.



Проведем через точку пересечения высоты пирамиды SH и PQ прямую $M'N'$, параллельную MN , где M' и N' – две вершины полученного многоугольника сечения. $MM'QN'N'$ – пятиугольник ($MM' = NN'$ и $M'Q = N'Q$).

7.




$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi R^2 \sqrt{l^2 - R^2} = \frac{1}{3}\pi \cdot 25 \sqrt{169 - 25} = 100\pi \text{ см}^3$$

Ответ: $V = 100\pi \text{ см}^3.$

Вариант 61.

6. KL и MN лежат в параллельных плоскостях, т.е. не пересекаются, еще KL не параллельна MN , значит K, L, M и N – точки, не принадлежащие одной плоскости, значит, отрезки KN и LM не имеют общих точек.




7. т. $C \in A_1B_1$ (см. задачу 33.7.)

$$\triangle AA_1C \sim \triangle CBV_1$$

$$\frac{AC}{AB} = \frac{A_1C}{A_1B_1} = \frac{3}{8} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow A_1B_1 = \frac{8}{3} A_1C = \frac{8}{3} \cdot 12 = 32 \text{ (см.)}$$

Ответ: $A_1B_1 = 32$ (см.)



Вариант 62.

6. Не пересекаются, так как MN пересекает плоскость, содержащую KL в точке не принадлежащей KL . Значит MN и KL – скрещиваются. А значит KN и ML тоже скрещиваются.



7. см. рис. вариант 60. задача 7.


$$S_{\text{бок.}} = \pi R l = 5\pi R = 15\pi \Rightarrow R = 3 \text{ см}$$

$$H = \sqrt{l^2 - R^2} = \sqrt{25 - 9} = 4 \text{ см}; V = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H = \frac{1}{3} \pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi \text{ см}^3$$


Ответ: $V = 12\pi \text{ см}^3$.

Вариант 63.

6. Проведем через P (сердину BB') прямую, параллельную MN (M и N – середины сторон основания), и получим при пересечении с DD' точку P' . $MN \parallel M'N'$ и $MN = M'N'$ (M' и N' – середины сторон основания). $PMNP'N'M'$ – равносторонний шестиугольник.



7.



$$S_{\text{пол.}} = S_{\text{бок.}} + 2S_{\text{осн.}} = 2S_{\text{бок.}} \Rightarrow$$

$$S_{\text{бок.}} = 2S_{\text{осн.}}$$


$$2\pi RH = 2\pi R^2 \Rightarrow R = H$$

$$V = \pi R^2 H = \pi H^3 = 216\pi (\text{см}^3).$$

Ответ: $V = 216\pi \text{ см}^3$.


Вариант 64.

6.



Через точку пересечения медиан $\triangle ABC$ – точку O , проведем прямую, параллельную AB (а MN – средняя линия $\triangle ABC$, значит, $MN \parallel AB$). Из свойств правильной пирамиды: $MM' = NN'$, отсюда $MNN'M'$ – равнобокая трапеция ($MM' = NN'$).

7.



$$\frac{AB}{MB} = \cos 30^\circ \Rightarrow MB = \frac{AB}{\cos 30^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$\triangle AMD = \triangle AMB \Rightarrow \triangle DMB$ – равнобедренный: $MD = MB$, т.е. MO не только высота, но и медиана BD , т.е.


$$MO = \sqrt{MB^2 + OB^2} = \sqrt{MB^2 - \left(\frac{BD}{2}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{MB^2 - \frac{AB^2 + AD^2}{4}} = \sqrt{\frac{4}{3} - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{5}{6}} (\text{см}).$$

Ответ: $MO = \sqrt{\frac{5}{6}}$ (см).

Вариант 65.



6. Не пересекаются, т.к. точки K, L, M, N не лежат в одной плоскости.



7. см. рис. вариант 17. задача 7.
 $r = \sqrt{R^2 - OO_1^2} =$
 $= \sqrt{41^2 - 29^2} = 2\sqrt{210}$ (см).
 $S = \pi r^2 = 840\pi$ (см²).
 Ответ: $S = 840\pi$ (см²).

Вариант 66.

6. По построению точка $N \in (A'MC')$.




7.
 $S_{\text{пов.}} = 2S_{\text{бок.}} = 2\pi Ra =$
 $= 2\pi a \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}a^2\pi = 9\sqrt{2}\pi$ см².
 Ответ: $S_{\text{пов.}} = 9\sqrt{2}\pi$ см².



StudyPart.ru

Вариант 67.

6. В силу симметрии заключаем, что искомый многогранник правильная пирамида.



7.




$$r = \sqrt{R^2 - H^2} = \sqrt{100 - 64} = 6 \text{ (см)}; \quad l = 2\pi r = 12\pi \text{ (см)};$$

$$l_1 = 2\pi R = 20\pi \text{ (см)}; \quad \alpha = 360^\circ \cdot \frac{12\pi}{20\pi} = 216^\circ. \quad \text{Ответ: } \alpha = 216^\circ.$$

Вариант 68.

6. То, что точка N – искомая, следует из построения.




7. см. рис. вариант 66. задача 7.

$$\begin{aligned} V &= 2V_{\text{кон}} = 2 \cdot \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H = \\ &= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi R^2 H = \\ &= \frac{a^3 \pi \sqrt{2}}{6} = \frac{9\sqrt{2}}{2} \pi \text{ см}^3 \end{aligned}$$


Ответ: $V = \frac{9\sqrt{2}}{2} \pi \text{ см}^3.$

6. То, что точка М – искомая, следует из построения.



Вариант 69.

7.




$$V = S_{\text{осн.}} \cdot H = \pi R^2 \cdot H =$$

$$= \pi \cdot \frac{DC^2}{4} \cdot AD = \pi \cdot \frac{36}{4} \cdot 8 = 72\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Ответ: $V = 72\pi \text{ (см}^3\text{)}$.

Вариант 70.

7.




$$V = S_{\text{осн.}} \cdot H = \pi R^2 H =$$

$$= \pi \cdot \frac{a^2}{4} \cdot a = \frac{\pi}{4} a^3 = \frac{\pi}{4} \cdot 343 = \frac{343\pi}{4} \text{ (см}^3\text{)}$$


Ответ: $V = \frac{343\pi}{4} \text{ см}^3$.


6. То, что точка N – искомая, следует из построения.



Вариант 71.

6. То, что точка N – искомая, следует из построения.





7.

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{8}{3}\pi R^2 = 24\pi \Rightarrow R = 3$$


$$S_{\text{пол.}} = \pi R(l + R) = \pi R(\sqrt{H^2 + R^2} + R) = \pi \cdot 3(\sqrt{64 + 9} + 3) = 3\pi(\sqrt{73} + 3) \text{ см}^2$$

Ответ: $S_{\text{пол.}} = 3\pi(\sqrt{73} + 3) \text{ см}^2$.


Вариант 72.

6.

L, M, N, O лежат в одной плоскости, еще $LMNO$ – квадрат, $SLMNO$ – пирамида (правильная пирамида).



7.




$$V_1 = 64 \text{ см}^3; V = 3 \cdot 64 \text{ см}^3 \Rightarrow b = 4\sqrt[3]{3} \text{ (см)}.$$

$$S_{\text{нов.}} = 6S_{\text{кв.}} = 6b^2 = 6 \cdot 16 \cdot \sqrt[3]{9} = 96\sqrt[3]{9} \text{ (см}^2\text{)}.$$

Ответ: $S_{\text{нов.}} = 96\sqrt[3]{9} \text{ (см}^2\text{)}.$

6. То, что точка N – искомая, следует из построения.




Вариант 73.

7. См. рис. вариант 29. Задача 7.

$$l = \frac{r}{\cos 30^\circ} = \frac{6 \cdot 2}{\sqrt{3}} \text{ см} = \frac{12}{\sqrt{3}} \text{ см}$$

$$S_{\text{полн.}} = \pi(l + r) = \pi \cdot 6(4\sqrt{3} + 6) = 12\pi(2\sqrt{3} + 3)$$

Ответ: $S_{\text{полн.}} = 12\pi(2\sqrt{3} + 3) \text{ см}^2$.



Из рисунка видно, что KN и ML – скрещивающиеся.

Вариант 74.


7. См. рис. вариант 35. Задача 7 а) тело вращения – конус, где $l=17$ см, $R=8$ см.

$$S_{\text{пов.}} = \pi R(l + R) = \pi \cdot 8(17 + 8) \text{ см}^2 = 200\pi \text{ см}^2$$

Ответ: $S_{\text{пов.}} = 200\pi \text{ см}^2$.

Вариант 75.

6. Через центр основания O параллельно боковому ребру SD ведем прямую, которая пересекает SD в точке M. Этот многоугольник – равнобедренный $\triangle AMC$ ($AM = CM$).



7. См. рис. вариант 71. Задача 7.


$$R = \sqrt{l^2 - H^2}; \quad R = \sqrt{13^2 - 12^2} \text{ см} = 5 \text{ (см)}.$$

$$S_{\text{полн.}} = \pi R(R + l) = \pi \cdot 5(5 + 13) \text{ см}^2 = 90\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$


$$\text{Ответ: } S_{\text{полн.}} = 90\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

Вариант 76.

6. Из построения: MN и KL – скрещивающиеся



7.




$$V_1 = 1 \text{ см}^3$$

$$V_2 = 2^3 \text{ см}^3 = 8 \text{ см}^3; \quad V_3 = V_1 + V_2 = 9 \text{ см}^3; \quad a_3 = \sqrt[3]{V_3} = \sqrt[3]{9} \text{ см}$$

$$\text{Ответ: } a_3 = \sqrt[3]{9} \text{ см}.$$

Вариант 77.

6.



По построению: ML и KN
– скрещивающиеся

7.

См. рис. вариант 76. Задача 7.

Из задачи 76.7.: $a_3 = \sqrt[3]{9}$ (см).

$$S_{\text{полн.}} = 6 \cdot a_3^2 = 6 \cdot \sqrt[3]{81} = 18\sqrt[3]{3} \text{ (см}^2\text{)}.$$


$$\text{Ответ: } S_{\text{полн.}} = 18\sqrt[3]{3} \text{ (см}^2\text{)}.$$

Вариант 78.

6. CH – высота, медиана основания ($\triangle ABC$).

Через H и D (сердину высоты пирамиды SO) проведем прямую, которая пересечет SC в точке M .

Сечение – равнобедренный $\triangle MAB$ ($MA = MB$).



7. См. рис. вариант 34. Задача 7.


$\angle ABO = \frac{1}{2}120^\circ = 60^\circ$ (т.к. $\triangle ABC$ – равнобедренный)

$$R = H \operatorname{tg} \angle ABO = 5\sqrt{3} \text{ см}; V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3} \cdot 125 \cdot 3 \cdot \pi \text{ см}^3 = 125\pi \text{ см}^3$$

Ответ: $V = 125\pi \text{ см}^3$.

Вариант 79.

6. Из рисунка видно, что $KL \parallel MN$, значит K, L, M, N – лежат в одной плоскости, так что KN и ML имеют общую точку.



7. прямоугольные $\triangle MAB = \triangle MAC$
(по двум катетам)


$\Rightarrow MB = MC \Rightarrow MH$ – медиана в $\triangle BMC$

$$\Rightarrow BH = \frac{1}{2}BC = 3 \text{ см};$$


$$AH = BH \operatorname{tg} 30^\circ = \sqrt{3} \text{ см};$$

$$\cos \alpha = \frac{AH}{MH} = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

$$\text{Ответ: } \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$



6. Из построения точка N – искомая



Вариант 80.

7.


См. рис. вариант 30. Задача 7.

$$H = a \sin 45^\circ = 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{ (см.)}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{27 \cdot 2\sqrt{2}}{3} \pi = 18\sqrt{2}\pi \text{ см}^3$$

Ответ: $V = 18\sqrt{2}\pi \text{ см}^3$.

6. Из построения точка C – искомая



Вариант 81.

7.

См. рис. вариант 56. Задача 7.

$$V = S_{\text{осн.}} \cdot h \Rightarrow h = 2 \text{ см}$$


$$S_{\text{осн.}} = ab = 3a^2 \Rightarrow a = 2 \text{ см, } b = 6 \text{ см}$$

$$S_{\text{полн.}} = 2S_{\text{осн.}} + 2S_{\text{бок.}} + 2S_{\text{бок.}} =$$

$$= 2 \cdot S_{\text{осн.}} + 2ah + 2bh = 56 \text{ см}^2$$

Ответ: $S_{\text{полн.}} = 56 \text{ см}^2$.

6. MN – средняя линия ΔSCD , значит, $MN \parallel DC$ (но $AB \parallel DC$), значит, $ABNM$ – равнобокая трапеция.



Вариант 82.

7.

См. рис. вариант 63. Задача 7.

осевое сечение – прямоугольник со

сторонами d и l , $d = 2R$, $l = H$, $d = l$

$$S = d \cdot l = l^2 = 64 \text{ см}^2 \Rightarrow l = 8 \text{ см} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow d = 8 \text{ см, } H = 8 \text{ см, } R = 4 \text{ см}$$

$$V = S_{\text{осн.}} \cdot H = \pi R^2 H = \pi \cdot 16 \cdot 8 \text{ см}^3 = 128\pi \text{ см}^3$$

Ответ: $V = 128\pi \text{ см}^3$.

Вариант 83.

6. Из построения следует, что точка С лежит на поверхности конуса.



7.

См. рис. вариант 56. Задача 7.

$$S_{\text{осн.}} = ab = 4 \cdot 6 \text{ см}^2 = 24 \text{ см}^2$$

$$S_{\text{полн.}} = 2ab + 2ac + 2bc$$

$$136 = 48 + 8c + 12c$$

$$c = \frac{22}{5} \text{ (см)},$$


$$A_1B = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{52} \text{ см} = 2\sqrt{13} \text{ см}$$

(по т. Пифагора)


$$d = \sqrt{A_1B^2 + c^2} = \sqrt{52 + \frac{484}{25}} = \frac{2}{5}\sqrt{446} \text{ см}$$

Вариант 84.

6. Разбивает плоскость ABC' на две пирамиды: 1. $C'ABC$ с основанием $\triangle ABC$, и 2. $C'ABB'A'$ с основанием $ABB'A'$ (прямоугольник).



7.




$$OA = \sqrt{BO^2 - AB^2} = \sqrt{29^2 - 21^2} = 20 \text{ см}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot OA^3 =$$

$$= \frac{4}{3}\pi \cdot 8000 = \frac{32000}{3}\pi \text{ см}^3$$


Вариант 85.

6.



StudyPort.ru

7.




$$l = 2\pi r = 10\pi \text{ см}; \quad l = \frac{1}{2} \cdot 2\pi R = \pi R = 10\pi \Rightarrow R = 10 \text{ см};$$

$$H = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{100 - 25} = 5\sqrt{3} \text{ см};$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot H = \frac{1}{3}\pi \cdot 25 \cdot 5\sqrt{3} = \frac{125\sqrt{3}}{3}\pi \text{ см}^3.$$

Ответ: $V = \frac{125\sqrt{3}}{3}\pi \text{ см}^3.$

Вариант 86.



6. Точка C расположена на поверхности цилиндра, так как $MC \parallel OO_1$ и M лежит на поверхности цилиндра.

7. См. рис. вариант 42. Задача 7.

$$\triangle ABM = \triangle ADM \Rightarrow MD = BM; \quad d = a\sqrt{2} \Rightarrow a = 5\sqrt{2} \text{ см.}$$

BMD – равнобедренный: $(BM = MD)$ и

$MO \perp AB \Rightarrow MO$ – медиана BMD

$$MO = \sqrt{MB^2 - BO^2}; \quad BO = \frac{1}{2}BD = 5 \text{ см}$$


$$MB = \frac{AB}{\cos 60^\circ} = 2AB = 10\sqrt{2} \text{ см} \Rightarrow MO = \sqrt{200 - 25} = 5\sqrt{7} \text{ см.}$$

Ответ: $MO = 5\sqrt{7} \text{ см.}$

Вариант 87.

6. O и O' – центры оснований.

1. MN (M и N – середины сторон основания) пересекает AC в точке P .
2. $C'P$ пересекается с OO' в точке Q .
3. Через Q проведем параллельную прямую MN и получим при пересечении ребер BB' и DD' точки L и K . $C'KNML$ – пятиугольник ($KN = LM$, $C'K = C'L$).




7. см. рис. вариант 35. Задача 7 а)

$$S_{\text{бок.}} = \pi Rl = \pi \cdot BC \cdot AB = \pi \cdot BC \cdot \sqrt{AC^2 + BC^2} =$$

$$= \pi \cdot 4\sqrt{16 + 49} = 4\pi\sqrt{65} \text{ (см}^2\text{)}. \quad \text{Ответ: } S_{\text{бок.}} = 4\pi\sqrt{65} \text{ (см}^2\text{)}.$$


Вариант 88.

6.



Из рисунка: AB и CD – секущиеся

7.




$$V = \frac{2}{3}\pi R^2 H = \frac{2}{3}\pi AO^2 \cdot BO =$$


$$= \frac{2}{3}\pi \cdot AB^2 \cos^2 30^\circ \cdot AB \cdot \sin 30^\circ =$$

$$= \frac{2}{3}\pi \cdot 25 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{125}{4}\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Вариант 89.

6. Проведем $MN \parallel AD$, тогда M, N, A и D лежат в одной плоскости и значит AN и MD пересекаются.






7.

$$S = \pi R^2 = 4\pi \Rightarrow R = 2 \text{ (см);}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 8 = \frac{32}{3}\pi \text{ (см}^3\text{).}$$


Ответ: $\frac{32}{3}\pi \text{ (см}^3\text{).}$

Вариант 90.



6. $\triangle ABC'$ – равнобедренный ($C'A = C'B$).
 $C'A$ и $C'B$ – диагонали боковых граней.


$$\begin{aligned} 7. S_{\text{пол.}} &= 2\pi R(R + H) = 2\pi \cdot AO(AO + BC) = \\ &= 2\pi \cdot \frac{AB}{2} \left(\frac{AB}{2} + BC \right) = \\ &= 2\pi \cdot \frac{BD}{2} \cdot \cos 30^\circ \left(\frac{BD}{2} \cos 30^\circ + BD \sin 30^\circ \right) = \\ &= \pi \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{8}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 8 \cdot \frac{1}{2} \right) = \sqrt{3}\pi \cdot 4(2\sqrt{3} + 4) = 8\sqrt{3}\pi(\sqrt{3} + 2) \text{ (см}^2\text{).} \end{aligned}$$



Ответ: $S_{\text{пол.}} = 8\sqrt{3}\pi(\sqrt{3} + 2) \text{ (см}^2\text{).}$

Вариант 91.

6. По построению: точка M – искомая.




7. см. рис. вариант 30. Задача 7.

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot H = \frac{1}{3}\pi \cdot xa^2 \cdot x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{1}{6}\pi a^3 \cdot \sqrt{2} = \frac{32\sqrt{2}}{3}\pi \text{ см}^3$$


Ответ: $\frac{32\sqrt{2}}{3}\pi \text{ см}^3$.

Вариант 92.

6. Точка C принадлежит поверхности цилиндра. (См. Вариант 86. Задача 6).



7.



т.к. $\alpha \parallel AB$, то $BB_1 = AA_1$; $\sin \alpha = \frac{BB_1}{BC}$;

$$\sin 45^\circ = \frac{AA_1}{AC} = \frac{AA_1}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow AA_1 = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{BB_1}{BC} = \frac{AA_1}{BC} = \frac{3\sqrt{2}}{8}$$

Ответ: $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{2}}{8}$.

Вариант 93.

6. K, M, L и D , лежат в одной плоскости, а значит DL и KM – пересекаются. (см. рисунок 114 из задачника).


7. см. рис. вариант 56. Задача 7.

$$S_{\text{пол.}} = 2ab + 2ac + 2bc = 2a \cdot 9 + 2a \cdot 6 + 2 \cdot 9 \cdot 6 = 18a + 12a + 108 = 30a + 108 = 408 \Rightarrow a = 10 \text{ (см);}$$

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{100 + 81 + 36} = \sqrt{217} \text{ (см).}$$

Ответ: $d_1 = d_2 = \sqrt{217} \text{ см.}$

Вариант 94.



6. В силу симметрии $MH = FN$ и $HE = EF$.
 В сечении пятиугольник
 Ответ: пятиугольник $MNFEH$,
 $MH = NF$ и $HE = EF$.


7. см. рис. вариант 63. Задача 7.

$$2S_{\text{бок.}} = S_{\text{осн.}}; \quad 2 \cdot H \cdot \pi R \cdot 2 = \pi R^2 = \pi \cdot 64 \Rightarrow H = 2 \text{ (см)}$$


$$S_{\text{пол.}} = 2\pi R(H + R) = 2\pi \cdot 8(2 + 8) = 160\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

Ответ: $S_{\text{пол.}} = 160\pi \text{ (см}^2\text{)}$.

Вариант 95.



6. Точки B и C лежат на образующей конуса l , другие пары точки A и B , A и C задают прямые, которые не являются образующими конуса, они не проходят через вершину конуса S .



$$7. \quad AC = 8\sqrt{2} \text{ см}; \quad AO = 4\sqrt{2} \text{ см}$$

$SO = AO$, т.к. $\triangle SAO$ — прямоугольный с $\angle = 45^\circ$; $\Rightarrow SO = 4\sqrt{2}$ см;

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot H =$$

$$= \frac{1}{3} AB^2 \cdot SO = \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 4\sqrt{2} = \frac{256\sqrt{2}}{3} \text{ (см}^3\text{)}.$$


Ответ: $V = \frac{256\sqrt{2}}{3} \text{ (см}^3\text{)}$.

Вариант 96.

6.

Плоскость сечения $\triangle OMN$ параллельна грани SBC , значит $OM \parallel BS$, $ON \parallel SC$, т.к. OM и SB принадлежат пл-ти грани ABS , аналогично с ON и SC . В $\triangle ABS$ OM – средняя линия.; в $\triangle ACS$ ON – средняя линия, $SB = SC$, отсюда $OM = ON$.

Ответ: треугольник OMN , $OM = ON$.



7. см. рис. вариант 63. Задача 7.

$$l_{\text{осн.}} = 2\pi R = 8\pi \text{ (см)}; H = 2l_{\text{осн.}} = 16\pi \text{ (см)};$$


$$V = S_{\text{осн.}} \cdot H = \pi R^2 \cdot H = \pi \cdot 16 \cdot 16\pi = 256\pi^2 \text{ (см}^3\text{)}.$$

Ответ: $V = 256\pi^2 \text{ (см}^3\text{)}$.

StudyPort.ru

Задание 8 для экзамена «Математика»

3.1.




$$\begin{aligned} B'D &= \sqrt{BB'^2 + BD^2} = \\ &= \sqrt{2^2 + 14^2} = 10\sqrt{2} \text{ (см)}. \\ 2AD^2 &= B'D^2; \\ AD &= \sqrt{\frac{1}{2}B'D^2} = 10 \text{ (см)}. \\ AB^2 + AD^2 &= BD^2; \end{aligned}$$

$$AB^2 = BD^2 - AD^2; \quad AB = \sqrt{14^2 - 10^2} = 4\sqrt{6} \text{ (см)}.$$


$$V_{\text{парал.}} = AB \cdot AD \cdot h = 4\sqrt{6} \cdot 10 \cdot 2 = 80\sqrt{6} \text{ (см}^3\text{)}. \quad \text{Ответ: } 80\sqrt{6} \text{ см}^3.$$

3.2.




$$\begin{aligned} AB^2 &= AC^2 + BC^2, \\ AC &= \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ (см)}. \\ \text{В } \triangle BCC' \text{ по теореме Пифагора,} \\ \text{т.к. } \angle BCC' &= 90^\circ, \quad CC'^2 = BC'^2 - BC^2. \\ CC' &= \sqrt{8^2 - 6^2} = 2\sqrt{7} \text{ см} \\ \text{Ответ: } h &= 2\sqrt{7} \text{ см}. \end{aligned}$$

3.3.



$$\begin{aligned} BD &\text{ — меньшая диагональ, по условию} \\ BB'D'D &\text{ — квадрат, и значит } DD' = BD = 12 \text{ см} \\ (\triangle ABD &\text{ — равносторонний, } AB = BD) \\ S_{ABCD} &= AB \cdot AD \cdot \sin \angle BAD = 12^2 \cdot \sin 60^\circ = 72\sqrt{3} \text{ см}^2 \\ V &= S_{ABCD} \cdot h = S_{ABCD} \cdot DD' = 864\sqrt{3} \text{ см}^3 \\ \text{Ответ: } &864\sqrt{3} \text{ см}^3. \end{aligned}$$

3.4.



$$\begin{aligned} AC^2 &= AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cdot \cos \angle ADC = \\ &= 4^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ = 4^2 \cdot 3 = 48. \\ AC &= 4\sqrt{3} \text{ (см)}. \\ \text{Т.к. } \angle DAC &= \angle DCA = 30^\circ, \quad \angle CAB = 30^\circ \\ (\text{DC} \parallel \text{AB}) &\text{ и значит в треугольнике ACB} \\ \angle ACB &= 90^\circ. \text{ Тогда по т. Пифагора} \\ AB &= \sqrt{AC^2 + CB^2} = 8 \text{ (см)}. \end{aligned}$$

$$S_{ABCD} = \frac{AB + CD}{2} \cdot h, \text{ для } \triangle BCH \sin \beta = \frac{CH}{BC},$$

$$h = CH = BC \cdot \sin \beta = 4 \cdot \sin 60^\circ = 2\sqrt{3} \text{ (см).}$$

$$S_{ABCD} = \frac{8+4}{2} \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}. \quad V = S_{ABCD} \cdot CC',$$

$$CC' = AC \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 4 \text{ (см)}. \quad V = 12\sqrt{3} \cdot 4 = 48\sqrt{3} \text{ (см}^3\text{)}.$$

Ответ: $V = 48\sqrt{3}$ (см³).

3.5.

$\angle AC'C = 45^\circ$ значит $AC = CC' = 8$.

Аналогично для $\triangle ADD'$, где $A'D'$

$$\frac{DD'}{AD} = \operatorname{tg} A;$$

$$AD = \frac{DD'}{\operatorname{tg} A} = \frac{8}{\operatorname{tg} 60^\circ} = \frac{8}{\sqrt{3}} \text{ см.}$$

Для $\triangle ACD$, где угол D прямой и по теореме Пифагора:

$$CD^2 = AC^2 - AD^2 = 8^2 - \frac{8^2}{3} = 64 \cdot \frac{2}{3} \text{ (см}^2\text{)}.$$

$$CD = 8\sqrt{\frac{2}{3}} \text{ см}; \quad V = AD \cdot CD \cdot CC' = \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot 8\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 8 = \frac{512\sqrt{2}}{3} \text{ см}^3$$

Ответ: $\frac{512\sqrt{2}}{3}$ см³.

3.6.

$$\operatorname{tg} A = \frac{CC'}{AC}, \quad AC = \frac{CC'}{\operatorname{tg} A} = 8\sqrt{3} \text{ (см).}$$



$$BD = \frac{DD'}{\operatorname{tg} B} = \frac{8}{\operatorname{tg} 60^\circ} = \frac{8}{\sqrt{3}} \text{ (см).}$$

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin 90^\circ,$$


$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{3} \cdot \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot 1 = 32 \text{ (см}^2\text{)};$$

$$V = S_{ABCD} \cdot h = 256 \text{ (см}^3\text{)}.$$

Ответ: 256 (см³).



3.7.



Опускаем перпендикуляры из вершины B на CD и $C'D'$.

$AB \parallel CD$, $\angle BHD = \angle ABH = 90^\circ$,

$AB \parallel C'D'$, т.к. $CD \parallel C'D'$ и $AB \parallel CD$,

$BH \perp DD'C'C$, поэтому $BH \perp MH$


$$MH^2 = BM^2 - BH^2, \quad MH = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ см}$$

$$S_{ABCD} = CD \cdot BH = 10 \text{ см} \cdot 5 \text{ см} = 50 \text{ см}^2$$

$$V = S_{ABCD} \cdot MH = 600 \text{ см}^3$$

Ответ: 600 см^3 .

3.8.




$$S = a^2 = 64 \text{ см}^2.$$

$$V = Sh = 640 \text{ см}^3$$

Ответ: 640 см^3 .

3.9.



$$S_{ABCD} = \frac{AB + CD}{2} \cdot DH$$

$V = S_{ABCD} \cdot h$, где h – высота призмы.

1. $S_{ABB'A'} = AB \cdot h = 12 \text{ см}^2$, по условию;

$S_{CDD'C'} = CD \cdot h = 8 \text{ см}^2$, по условию.

$$AB \cdot h + CD \cdot h = (AB + CD) \cdot h =$$

$$= S_{ABB'A'} + S_{CDD'C'} = 20 \text{ см}^2.$$

$$2. \quad V = \frac{1}{2} \cdot (AB + CD) \cdot DH \cdot h = \frac{1}{2} \cdot (S_{ABB'A'} + S_{CDD'C'}) \cdot DH = 50 \text{ см}^3$$

Ответ: 50 см^3 .


3.10. См. рис. к задаче 3.9.

По полученной формуле для нахождения объема в зад. 3.9. найдем DH

$$V = \frac{1}{2} (S_{ABB'A'} + S_{CDD'C'}) \cdot DH; \quad \frac{1}{2} \cdot (14 + 6) \cdot DH = 40; \quad DH = 4 \text{ (см)}$$

Ответ: 4 см.

3.11. Пусть a , b и c длины ребер прямоугольного параллелепипеда. $a^2 + b^2 = 10^2$,
 $a^2 + c^2 = (2\sqrt{10})^2$,
 $b^2 + c^2 = (2\sqrt{17})^2$.




$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 100, \\ a^2 + c^2 = 40, \\ b^2 + c^2 = 68; \end{cases}$$

$2a^2 = 72$, $a = 6$ (см); $b = 8$ (см), $c = 2$ (см); $V = abc = 96$ (см³).
 Ответ: 96 (см³).

3.12.

Пусть длины диагоналей ромба, лежащего в основании, равны d_1 и d_2 , $S_{A_1C_1C} = d_1 h$, $S_{B_1D_1D} = d_2 h$, где h – высота призмы.



$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2,$$

$$S_{A_1C_1C} \cdot S_{B_1D_1D} = d_1 \cdot d_2 \cdot h^2,$$

т.к. по условию $\frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 = 48$ см²,

то $h^2 = \frac{S_{A_1C_1C} \cdot S_{B_1D_1D}}{d_1 \cdot d_2} = \frac{40 \cdot 30}{96} = \frac{25}{2}$, $h = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ (см).

$V = S_{ABCD} \cdot h = 48$ см² $\cdot \frac{5\sqrt{2}}{2} = 120\sqrt{2}$ (см³). Ответ: $120\sqrt{2}$ (см³).

3.13. Обозначим сторону основания a , а высоту в боковом треугольнике за h_1 , тогда $S_{бок} = 4S_{mp} = 2ah_1$.

По т. Пифагора $h_1^2 = h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$; $h_1 = \sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}} = \sqrt{9 + \frac{a^2}{4}}$.

Т.к. $S_{бок} = 2ah_1 = 2a\sqrt{9 + \frac{a^2}{4}} = 80$, то

$$a\sqrt{9 + \frac{a^2}{4}} = 40; \quad a^2 \left(9 + \frac{a^2}{4}\right) = 1600; \quad \frac{1}{4}(a^2)^2 + 9a^2 - 1600 = 0.$$

$a^2 = 2(-9 \pm 41)$; $a^2 = 64$. Искомый $V = \frac{1}{3}a^2h = 64$ (см³).

StudyPort.ru

3.14. Введе обозначения аналогично 3.13.


Получаем $S_{бок} = 2ah = 2a\sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}}$;

И причём это равно $2a^2$, значит $2a\sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}} = 2a^2$;

$h^2 + \frac{a^2}{4} = a^2$; $h^2 = \frac{3}{4}a^2 = 27$; $h = 3\sqrt{3}$ (см).

Значит $V = \frac{1}{3}a^2h = \sqrt{3} \cdot 36 = 36\sqrt{3}$ (см).

3.15.




$S_{\Delta SMO} = \frac{1}{2}SO \cdot MO = \frac{1}{2}Rh$ или
 $S_{\Delta SMO} = \frac{1}{2}MS \cdot OH$, $Rh = 4,8l$; $l = \frac{Rh}{4,8}$.

Подставляем в $S_{бок} = \pi Rl$ (по усл. $S_{бок} = 60\pi \text{ см}^2$)
 $S_{бок} = \frac{\pi R^2 h}{4,8} = 60\pi \text{ см}^2$.

$V = \frac{\pi R^2 h}{3} = 1,6 \cdot 60 \text{ см}^3 = 96 \text{ см}^3$. Ответ: $V = 96 \text{ см}^3$.

3.16.




$AA'C'C$ – диагональное сечение, т.к. это ромб, то $AA' = AC$. AC – диагональ квадрата $ABCD$ со стороной 6 см, значит, по теореме Пифагора $AC^2 = 6^2 + 6^2$,
 $AC = 6\sqrt{2}$ см.
 $A'H$ – высота призмы, и т.к. сечение $AA'C'C$ диагональное, то $A'H$ принадлежит плоскости этого сечения.
 Рассмотрим прямоугольный $\Delta A'AH$, где по условию угол A равен 60° , и
 $\sin A = \frac{A'H}{AA'}$; $A'H = AA' \cdot \sin A = 6\sqrt{2} \cdot \sin 60^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$ (см).

$V = S_{осн} \cdot A'H = 6^2 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 108\sqrt{6}$ (см³). Ответ: $108\sqrt{6}$ (см³).

3.17.

1. $B'H$ высота лежит в плоскости $ABB'A'$

$$\sin B = \frac{B'H}{BB'} \Rightarrow B'H = BB' \cdot \sin 30^\circ = \frac{BB'}{2},$$



2. $AA'D'D$ и $BB'C'C$ – прямоугольники, т.к. AD , $A'D'$ и BC , $B'C'$ перпендикулярны граням $AA'B'B$ и $CC'D'D$.

$S_{AA'D'D} = S_{BB'C'C} = a \cdot b$, где $B'B = b$.

$$S_{\text{полн.}} = 2S_{ABCD} + 2S_{AA'D'D} + 2S_{AA'B'B} = 2 \cdot \left(a^2 + ab + a \cdot \frac{b}{2} \right) = 72 \text{ см}^2.$$

Здесь $S_{AA'B'B} = AB \cdot B'H = a \cdot \frac{b}{2}$; $a^2 + \frac{3ab}{2} = 36$, $9 + \frac{9b}{2} = 36$,

$b = 6$ (см). $V = S_{ABCD} \cdot B'H = a^2 \cdot \frac{b}{2} = 27$ (см³). Ответ: 27 (см³).


3.18.

$$\operatorname{tg} A = \frac{A'B}{AB},$$

$$h = A'B = AB \cdot \operatorname{tg} A = 4 \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = 4\sqrt{3} \text{ см},$$

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin 45^\circ =$$

$$= 16 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 8\sqrt{2} \text{ (см}^2\text{)}.$$




$$V = S_{ABCD} \cdot h = 32\sqrt{6} \text{ (см}^3\text{)}. \text{ Ответ: } 32\sqrt{6} \text{ (см}^3\text{)}.$$

3.19. $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 4^2 \cdot \sin 60^\circ = 4\sqrt{3}$ (см²).

$V = S_{ABC} \cdot h = 24$ см³ (по условию)


$$h = \frac{V}{S_{ABC}} = \frac{24}{4\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \text{ (см)}.$$



Опустим из вершины A' перпендикуляр на плоскость нижнего основания. В $\triangle AA'H$ угол H прямой, а

$\angle A$ искомый. $\sin A = \frac{h}{AA'} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \angle A = 60^\circ$. Ответ: $\angle A = 60^\circ$.

3.20.




Проведем плоскость через вершину A' перпендикулярную боковому ребру AA' .

По обратной теореме Пифагора, т.к. $13^2 = 12^2 + 5^2$, в $\triangle A'MN$ угол M прямой, и двугранный угол, образованный боковыми гранями $AA'C'C$ и $BB'C'C$ – прямой.
 $S_{BB'C'C} = a \cdot MN = 22$,

$$a = \frac{22}{5} = 4,4 \text{ (см)}. \quad S_{AA'C'C} = A'M \cdot a = \frac{22}{5} \cdot 12 = \frac{264}{5} \text{ (см}^2\text{)}.$$

$$V = \frac{1}{3} S_{AA'C'C} \cdot MN = \frac{1}{3} \cdot 5 \cdot \frac{264}{5} = 88 \text{ (см}^3\text{)}. \quad \text{Ответ: } 88 \text{ (см}^3\text{)}.$$

3.21.



C' Объем призмы выразим через произведение площади основания на длину высоты $A'H$.

$$V = S_{ABC} \cdot A'H; \quad A'H = \frac{V}{S_{ABC}}$$

($V = 60 \text{ см}^3$ по условию)


В $\triangle ABC$ угол B прямой по условию, значит

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 = 12 \text{ (см}^2\text{)}, \text{ значит } A'H = \frac{60}{12} = 5 \text{ (см)}.$$

В $\triangle AA'H$ угол H прямой (по построению), и поэтому

$$\sin A = \frac{A'H}{A'A}, \quad A'A = \frac{A'H}{\sin A} = \frac{5}{\sin 60^\circ} = \frac{5 \cdot 2}{\sqrt{3}} \text{ (см)}. \quad \text{Ответ: } \frac{10}{\sqrt{3}} \text{ (см)}.$$

3.22.



Проведем через вершину A' плоскость перпендикулярную боковому ребру AA' , т.к. боковые ребра призмы параллельны друг другу, то они все будут перпендикулярны этой плоскости, и значит, $A'M \perp CC'$, $A'N \perp BB'$ и $MN \perp CC'$, $MN \perp BB'$.

Поэтому $A'M = 5$ см, т.к. $A'M$ равно расстоянию между боковыми ребрами, то же с $A'N = 5$ см.

122

$\angle A'MN : A'M = A'N$ и $\angle MA'N = 60^\circ$. Значит $\triangle A'MN$ – равно-
 сторонний и $MN = 5$ см.

$$S_{\text{бок.пов.}} = a \cdot (A'M + A'N + MN) = 8(5 + 5 + 5) = 120 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Ответ: 120 (см²).

3.23.

$V = \frac{1}{3} S_{AA'C} \cdot a + \frac{1}{3} S_{BB'C} \cdot b$, где a, b – расстояния между боковы-
 ми ребрами BB' и CC' , AA' и CC' , соответственно
 $S = S_{AA'C} + S_{BB'C} = AA' \cdot b + AA' \cdot a$.

Значит, $a + b = \frac{70}{5} = 14$ см. Т.к. $S_{AA'C} = \frac{1}{2} \cdot S_{AA'C'C}$, то

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot AA' \cdot ab + \frac{1}{3} \cdot AA' \cdot ab = \frac{5}{2} ab = 120 \text{ (см}^3\text{)}.$$

$$\begin{cases} ab = 48, \\ a + b = 14; \end{cases} \quad ; \quad a + \frac{48}{a} - 14 = 0; \quad a^2 - 14a + 48 = 0,$$

$$\begin{cases} a = 6, \\ b = 8 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a = 8, \\ b = 6 \end{cases}$$

По теореме Пифагора в $\triangle A'MN$ $c^2 = a^2 + b^2$, т.е. $c = 10$ (см).

$MN = c$. Ответ: 6 см, 8 см и 10 см.

3.24.

a – сторона прав. Треугольного
 основания H – центр $\triangle ABC$, по-

этому $AH = \frac{a}{\sqrt{3}}$;

$$\operatorname{tg} \angle SAH = \frac{SH}{AH} = \frac{a}{\frac{a}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3};$$

$$\angle SAH = 60^\circ.$$

3.25.



H – центр квадрата

$$AC = \sqrt{2} \cdot AB = 6\sqrt{2};$$

$$AH = \frac{1}{2} AC = 3\sqrt{2}.$$

В $\triangle ASH$ $\angle A = 45^\circ$ поэтому

$$\angle S = 45^\circ \Rightarrow SH = AH = 3\sqrt{2}.$$



StudyPort.ru

$$V = \frac{1}{3} AB^2 \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 3\sqrt{2} = 36\sqrt{2} \text{ (см}^3\text{)}.$$

Ответ: $36\sqrt{2}$ (см³).

3.26. $S_{\text{бок.}} = 4 \cdot S_{ASB} = 2AB \cdot SM = 2ab$, где b — длина апофемы

$S = a^2$, где a — длина стороны основания.

$$S_{\text{нов.}} = S_{\text{бок.}} + S_{\text{осн.}} = 2ab + a^2$$

$$AS = \frac{h}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{3} \text{ (см); } AH = \frac{1}{2} AS = \sqrt{3} \text{ (см);}$$

$$AC = 2AH = 2\sqrt{3} \text{ (см); } AB = a = 2\sqrt{\frac{3}{2}} \text{ (см); } MH = \frac{1}{2} a = \sqrt{\frac{3}{2}} \text{ (см);}$$

$$SM = b = \sqrt{SH^2 + MH^2} = \sqrt{9 + \frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{21}{2}} \text{ (см).}$$

$$S = 2 \cdot 2\sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{\frac{21}{2}} + 4 \cdot \frac{3}{2} = 6\sqrt{7} + 6 \text{ (см}^2\text{)}. \text{ Ответ: } 6(1 + \sqrt{7}) \text{ (см}^2\text{)}.$$

3.27. $S = S_{\text{бок.}} + S_{\text{осн.}} = 2ab + a^2$, где a — длина стороны основания, b — длина апофемы.

В $\triangle MHS$ угол H прямой и по условию угол M равен 60° , тогда

$$\operatorname{tg} M = \frac{SH}{MH}; \quad MH = \frac{SH}{\operatorname{tg} M} = \frac{6}{\operatorname{tg} 60^\circ} = 2\sqrt{3} \text{ (см). } a = 2MH = 4\sqrt{3} \text{ (см).}$$

$$SM^2 = MH^2 + SH^2; \quad b = SM = \sqrt{36 + 12} = 4\sqrt{3} \text{ (см).}$$

$$S = 2 \cdot 4\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3} + 16 \cdot 3 = 144 \text{ (см}^2\text{)}. \text{ Ответ: } 144 \text{ (см}^2\text{)}.$$

3.28. $S = 2ab + a^2$ (из предыдущей задачи), где апофема $SM = b$, сторона основания имеет длину a , а по условию равна 12 см.

$$\text{В } \triangle SMH \quad MH = \frac{a}{2} = 6 \text{ (см).}$$

$$\cos M = \frac{MH}{SM}; \quad b = SM = \frac{MH}{\cos 30^\circ} = \frac{12}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4\sqrt{3} \text{ (см).}$$

$$S = 2 \cdot 12 \cdot 4\sqrt{3} + 12^2 = 48(2\sqrt{3} + 3) \text{ (см}^2\text{)}.$$

Ответ: $48(2\sqrt{3} + 3)$ (см²).

3.29. $V = \frac{1}{3} a^2 h$, где a — длина стороны основания.

$$\text{В } \triangle SMH : MH = \frac{a}{2} \text{ (как в предыдущей задаче)}$$

$$\operatorname{tg}MSH = \frac{MH}{SH}; \frac{a}{2} = h \cdot \operatorname{tg}30^\circ; a = 2 \cdot 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} \text{ (см.)}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot (4\sqrt{3})^2 \cdot 6 = 96 \text{ (см}^3\text{)}. \quad \text{Ответ: } 96 \text{ см}^3.$$

3.30. $V = \frac{1}{3} a^2 h$; $\angle ASH = 45^\circ \Rightarrow AH = SH = 10$ см;

$$AC = 2AH; AC = 20 \text{ (см)}. \quad a = \frac{AC}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} \text{ (см.)}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 200 \cdot 10 = \frac{2000}{3} \text{ см}^3. \quad \text{Ответ: } \frac{2000}{3} \text{ см}^3.$$

3.31. $S = 3 \cdot S_{ABS} = 3 \cdot \frac{1}{2} ab$, где a – длина стороны основания, b – длина апофемы.

$$AH = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6 \text{ (см)}. \quad R = \frac{a}{2 \sin 60^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}},$$

т.е. $\frac{a}{\sqrt{3}} = 6$, $a = 6\sqrt{3}$ (см). $b = MS = \sqrt{10^2 - (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{73}$ см.

$$S_{\text{бок.}} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{3} \cdot \sqrt{73} = 9\sqrt{219} \text{ см}^2. \quad \text{Ответ: } 9\sqrt{219} \text{ см}^2.$$

3.32. Задача не имеет решений, т.к. длина бокового ребра должна быть больше высоты пирамиды, а не наоборот. $16 < 20$.

3.33.


1. Основание H высоты, опущенной из вершины S , лежит на центре окружности, описанной вокруг шестиугольника $A_1A_2 \dots A_6$. A_1H имеет длину, равную радиусу R этой окружности.

$\triangle A_1A_2H$ – равносторонний
 $A_1H = R = a$, a – длина стороны основания.

2. В $\triangle A_1HS$ угол H прямой, и $A_1H^2 = SA^2 - SH^2$;

$$a = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ см};$$

3. $\triangle A_1A_2S$ – равнобедренный ($A_1S = A_2S$), и SM – высота и медиана, поэтому A_1M равна половине A_1A_2 , т.е. $A_1M = 2,5$ см



$$SM^2 = SA_1^2 - A_1M^2 = 13^2 - 2,5^2 = 10,5 \cdot 15,5 = 0,5^2 \cdot 21 \cdot 31.$$

$$SM = 0,5\sqrt{21 \cdot 31}.$$

$$S_{\text{бок.}} = 6 \cdot S_{A_1A_2S} = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot A_1A_2 \cdot SM = 15 \cdot 0,5\sqrt{651} \text{ см}^2.$$

$$\text{Ответ: } \frac{15}{2}\sqrt{651} \text{ см}^2.$$

3.34. В $\triangle MHS$ угол H прямой и $\angle M = 60^\circ$, значит, $\operatorname{tg} M = \frac{h}{MH}$, т.е.

$$h = \frac{a}{2} \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = 4\sqrt{3} \text{ (см)}; V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{1}{3} \cdot 8^2 \cdot 4\sqrt{3} = \frac{256}{\sqrt{3}} \text{ (см}^3\text{)}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{256}{\sqrt{3}} \text{ см}^3.$$

3.35. Так же как и в задаче 3.34 находим, что $MH = \frac{a}{2}$ (a – длина стороны основания). Далее рассмотрим $\triangle MHS$.

$$\operatorname{tg} SMH = \frac{h}{MH} = \frac{2h}{a}; a = \frac{2h}{\operatorname{tg} 30^\circ} = \frac{16}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 16\sqrt{3} \text{ см};$$

$$V = \frac{1}{3}a^2h = 2048 \text{ см}^3. \quad \text{Ответ: } 2048 \text{ см}^3.$$

3.36. В $\triangle SMH$ угол H прямой, $\angle M = 45^\circ$ (по условию) и $\angle S = 45^\circ$, т.к. сумма углов треугольника равна 180° , значит $\triangle SMH$ – равнобедренный, $\angle M = \angle S = 45^\circ$, и отсюда $MH = SH$, $MH = \frac{a}{2}$ (a – длина стороны основания). По теореме

$$h = \frac{a}{2} = MH = SM \cdot \cos \angle SMH = SM \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 8\sqrt{2} \text{ (см)}.$$

$$V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{1}{3} \cdot (16\sqrt{2})^2 \cdot 8\sqrt{2} \text{ см}^3. (S_{\text{осн.}} = a^2, \text{ т.к. } ABCD \text{ – квадрат}).$$

$$\text{Ответ: } V = \frac{4096}{3}\sqrt{2} \text{ см}^3.$$

3.37. Т.к. основание – квадрат, то его диагональ, вычисленная по теореме Пифагора, равна $AC = \sqrt{2}a = 5\sqrt{2}$ (см) и $S_{\text{осн.}} = 25\text{см}^2$.

$$S_{ACS} = \frac{1}{2} AC \cdot h, \text{ где } h - \text{ высота пирамиды, } SH = h; S_{осн.} = \frac{5\sqrt{2}}{2} h;$$

$$\frac{5\sqrt{2}}{2} h = 25; h = 5\sqrt{2} \text{ (см). } MH = \frac{a}{2} \text{ т.е. } MH = 2,5 \text{ (см).}$$

В $\triangle SMH$ угол H прямой, значит $SM^2 = MH^2 + SH^2$

$$b = SM = \sqrt{2,5^2 + (5\sqrt{2})^2} = 7,5 \text{ (см).}$$

$$S_{бок.} = 4 \cdot S_{ABS} = 4 \cdot \frac{1}{2} ab = 2ab = 2 \cdot 5 \cdot 7,5 = 75 \text{ (см}^2\text{)}. \text{ Ответ: } 75 \text{ см}^2.$$

$$3.38. S_{ACS} = \frac{1}{2} AC \cdot SH$$

AC – диагональ квадрата со стороной a равна $\sqrt{2}a$ (нах-ся по теор. Пифагора), и $S_{осн.} = a^2$. По условию $\frac{1}{2}\sqrt{2}ah = a^2$,

$$\text{т.е. } \frac{\sqrt{2}}{2}h = a, a = 5\sqrt{2} \text{ см. } MH = \frac{a}{2}, MH = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ см.}$$


В $\triangle SMH$ угол H прямой, и поэтому $SM^2 = MH^2 + SH^2$,

$$b = SM = \sqrt{\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^2 + 10^2} = \frac{15}{\sqrt{2}} \text{ см.}$$

$$S_{бок.} = 4 \cdot S_{ABS} = 4 \cdot \frac{1}{2} ab = 2ab = 2 \cdot 5\sqrt{2} \cdot \frac{15}{\sqrt{2}} = 150 \text{ см}^2$$

Ответ: 150 см^2 .

3.39.




Проведем плоскость через прямую AD и ось цилиндра O_1O_2 . Плоскость пересекает поверхность цилиндра по образующим M_1M_2 и N_1N_2 .

1. $\Delta A_1O_1C = \Delta A_2O_2C$ (по двум углам: $\angle A_1O_1C$ и $\angle A_2O_2C$ – прямые, $\angle A_1CO_1$ и $\angle A_2CO_2$ = вертикальные; и $O_1C = CO_2$ по условию).
 2. Значит, $\angle O_1A_1C = \angle O_2A_2C$ и $O_1A_1 = O_2A_2 = 24$ см, отсюда $A_1N_1 = 24$ см – $R = 16$ см. $\Delta A_1N_1D \sim \Delta A_2N_2D$ (по двум равным углам: $\angle O_1A_1C = \angle O_2A_2C$ и углы $\angle A_2DN_2, \angle A_1DN_1$ – вертикальные).
 $A_2N_2 = A_2O_2 + R = 32$ см. $\frac{N_1D}{DN_2} = \frac{A_1N_1}{A_2N_2} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$.

3. Так же находим отношение $\frac{M_1B}{BM_2} = \frac{2}{1}$, только показываем подобие ΔA_2M_2B и ΔA_1M_1B . Ответ: $\frac{1}{2}$ и $\frac{2}{1}$.

3.40.




Проведем плоскость через прямую AB и образующую, которую прямая AB пересекает M_1M_2 . Этой плоскости принадлежит ось цилиндра O_1O_2 , т.к. она имеет с ней общую точку C и параллельна M_1M_2 .

Т.к. $M_1M_2 \parallel O_1O_2$, то $\angle M_1AC = \angle O_1CB$, как соответственные при параллельных прямых. Отсюда $\Delta ABM_1 \sim \Delta CBO_1$ (по двум равным углам, т.к. еще у этих треугольников $\angle ABM_1 = \text{общий}$). Значит, $\frac{AM_1}{CO_1} = \frac{BM_1}{BO_1} = \frac{BO_1 + R}{BO_1} = \frac{3}{1}$.

$$CO_1 = \frac{1}{3} AM_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{M_1M_2}{2} = \frac{M_1M_2}{3 \cdot 2} \quad (\text{по условию})$$

$$O_1O_2 = M_1M_2, \text{ и } CO_1 = \frac{O_1O_2}{6}; \text{ отсюда } CO_2 = \frac{5O_1O_2}{6} \cdot \frac{CO_1}{CO_2} = \frac{1}{5}.$$

3.41.



Длина O_1O_2 есть высота цилиндра. Проведем плоскость через прямую AB , которая пересекает ось O_1O_2 в середине и т.д. по условию, и саму ось цилиндра O_1O_2 . Эта плоскость пересекает поверхность цилиндра по образующей M_1M_2 . Т.к. любая образующая цилиндра параллельна его оси, то $O_1O_2 \parallel M_1M_2$. Отсюда можно сказать,


что $\angle AM_1C = \angle AO_1B = 90^\circ$, угол A общий у треугольников $\triangle AM_1C$ и $\triangle ABO_1$, значит они подобны по двум равным углам.

$$\frac{AM_1}{AO_1} = \frac{CM_1}{BO_1}, \quad \frac{AM_1}{AO_1} = \frac{AO_1 - R}{AO_1} = \frac{1}{3}, \text{ значит, } BO_1 = 3CM_1 = 6 \text{ см.}$$

$$BO_1 = \frac{O_1O_2}{2} \text{ (по условию). } O_1O_2 = 12 \text{ см. Ответ: 12 см.}$$

3.42.

Проведем плоскость через данную в условии задачи прямую AB и ось цилиндра O_1O_2 . Эта плоскость содержит также образующую M_1M_2 , в которой пересекается с поверхностью цилиндра. Длина M_1M_2 равна высоте цилиндра, т.е. $M_1M_2 = 12$ см, тогда по условию $BM_2 = 6$ см.



$M_1M_2 \parallel O_1O_2$, значит, $\angle BM_2A = \angle CO_2A = 90^\circ$, еще у треугольников $\triangle ABM_2$ и $\triangle ACO_2$ общий угол A , и значит они подобны.

$$\text{Отсюда } \frac{CO_2}{BM_2} = \frac{AO_2}{AM_2}, \text{ т.е. } \frac{4}{6} = \frac{18}{18+R}, \quad 4(18+R) = 6 \cdot 18, \quad 4R = 36,$$

$$R = 9 \text{ (см). Ответ: 9 см.}$$

3.43.

Рассмотрим $\triangle SOM$ с высотой OH . Пусть OM равно R , тогда ($\angle SOM = 90^\circ$) по теореме Пифагора $SM^2 = SO^2 + OM^2$.

$$SM^2 = h^2 + R^2, \quad SM = \sqrt{400 + R^2}.$$

Вычислим площадь $\triangle SOM$.


$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} SO \cdot OM = \frac{1}{2} OH \cdot SM, \text{ т.е.}$$

$$20 \cdot R = 12 \cdot \sqrt{400 + R^2};$$

$$5R = 3 \cdot \sqrt{400 + R^2}; \quad 16R^2 = 400 \cdot 9; \quad R = 15 \text{ см.}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \cdot 225 \cdot 20 = 1500\pi \text{ см}^3$$

$$\text{Ответ: } 1500\pi \text{ см}^3.$$



3.44. см. рис 3.43.


В $\triangle SOM$ угол прямой, его высота OH по условию равна 12 см. Пусть длина SM равна l , тогда по теор. Пифагора

$$h^2 = SO^2 = l^2 - OM^2 = l^2 - 400. \quad S_{\triangle SOM} = \frac{1}{2} l \cdot OH = \frac{1}{2} OM \cdot h, \text{ т.е.}$$

$$12l = 20\sqrt{l^2 - 400}, \quad 3l = 5\sqrt{l^2 - 400}, \quad 16l^2 = 25 \cdot 400, \quad l = 25 \text{ см.}$$

$$S_{\text{бок.}} = \pi Rl = \pi \cdot 20 \cdot 25 = 500\pi \text{ см}^2. \quad \text{Ответ: } 500\pi \text{ см}^2.$$

3.45.



$\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$ с коэффициентом 2

Получаем, что $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$ по трем сторонам, значит


$$\frac{S_{A'B'C'}}{S_{ABC}} = \frac{1}{4};$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} ACBC =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 - BC^2} BC = \frac{1}{2} \sqrt{15^2 - 9^2}$$

$$9 = 54. \quad \text{Ответ: } 13,5 \text{ см}^2.$$

3.46.



Рассмотрим $\triangle A_1'SH'$ и $\triangle A_1SH$, угол A_1 у них общий, угол H' и угол H прямые, т.к. SH перпендикуляр двум параллельным плоскостям, значит, по двум равным углам $\triangle A_1'SH' \sim \triangle A_1SH$.

Аналогично доказывается подобие $\triangle A_2'SH'$ и $\triangle A_2SH$ и т.д., т.е.

$$K = \frac{SH'}{SH} = \frac{A_1'H'}{A_1H} = \frac{A_2'H'}{A_2H} = \frac{A_1'S}{A_1S} = \frac{A_2'S}{A_2S}$$

, отсюда можно сказать, что $\triangle A_1'A_2'S \sim \triangle A_1A_2S$ по двум сторонам и углу между ними (угол S — общий) и т.д.

Получаем, что $\triangle A_1'A_2'H \sim \triangle A_1A_2H$ по трем пропорциональным сторонам и т.д. до $\triangle A_n'A_1'H \sim \triangle A_nA_1H$.

Значит, каждому треугольнику основания соответствует подобный треугольник в сечении с коэф. K

Найдем его: известно, что если треугольник подобный с коэффициентом K , то их площади отн. Как K^2

$$\frac{S_{A_1A_2H'}}{S_{A_1A_2H}} = \frac{S_{A_1A_2H'}}{S_{A_1A_2H}} = K^2,$$

Тогда получаем, что $\frac{S_{A_1A_2...A_n}}{S_{A_1A_2...A_n}} = K^2 = \frac{1}{4}$ по условию $K = \frac{1}{2}$

$$S = 4S' = 40 \text{ см}^2; \quad V = \frac{1}{3}Sh = \frac{320}{3} \text{ см}^3; \quad \text{Ответ: } \frac{320}{3} \text{ см}^3.$$


3.47. $\triangle MSO \sim \triangle M'SO'$ по двум равным углам:

1. Угол S – общий угол.
2. $\angle M'O'S = \angle MOS = 90^\circ$, т.к. SO перпендик. основанию, а плоскость сечения параллельна основанию.

Значит, $\frac{SO'}{SO} = \frac{M'O'}{MO} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

$$SO' = \frac{2}{3}SO, \quad OO' = SO - SO' = \frac{1}{3}SO.$$

$$\frac{SO'}{OO'} = \frac{\frac{2}{3}SO}{\frac{1}{3}SO} = \frac{2}{1}. \quad \text{Ответ: } \frac{2}{1}.$$



3.48. см. рис 3.47.

$$S' = \pi R'^2 = \pi \text{ см}^2 \text{ – по условию. } R' = 1 \text{ см.}$$

$\triangle MSO \sim \triangle M'SO'$ (доказательство см. 3.47)

$$\frac{SO'}{SO} = \frac{R'}{R} = \frac{1}{3}; \quad SO' = \frac{1}{3} \cdot SO = \frac{1}{3}h = 4 \text{ см.} \quad \text{Ответ: } 4 \text{ см.}$$

3.49.


$$V = abc, \text{ где } AD = a, AB = b, AA' = c$$

Запишем выражение объема пирамиды $DACM$. $V' = \frac{1}{3}S_{ACM}h = \frac{50}{3}$

$$\text{или } V' = \frac{1}{3}S_{ADC} \cdot DM,$$


$$S_{ADC} = \frac{1}{2}ab, \quad DM = \frac{c}{2}; \text{ т.е. } V' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}ab \cdot \frac{1}{2}c = \frac{1}{12}abc;$$

$$\frac{1}{12}abc = \frac{50}{3}; \quad V = abc = 200 \text{ см}^3. \quad \text{Ответ: } 200 \text{ см}^3.$$



3.50.

$$S_{ACD'} = \frac{1}{2} AC \cdot D'H = \frac{1}{2} \sqrt{2} a \cdot D'H = 20 \text{ см}^2.$$



$$S_{\text{осн.}} = a^2 = 20 \text{ см}^2, \quad a = 2\sqrt{5} \text{ см}$$

$$D'H = \frac{20}{\frac{\sqrt{2}}{2} a} = \frac{40}{2\sqrt{10}} = 2\sqrt{10} \text{ см}$$


Из прямоугольного треугольника DD'H имеем:

$$D'D^2 = D'H^2 - DH^2$$

$$h = \sqrt{(2\sqrt{10})^2 - (\sqrt{10})^2} = \sqrt{30} \text{ см};$$

$$V = S_{\text{осн.}} \cdot h = 20 \cdot \sqrt{30} \text{ см}^3. \quad \text{Ответ: } 20\sqrt{30} \text{ см}^3.$$

3.51.



$$S_{ABM} = \frac{1}{2} AB \cdot MH.$$

В $\triangle ABC$ ($AB = BC = AC$) CH – медиана и высота, тогда

$$CH^2 = BC^2 - BH^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3}{4} a^2, \text{ где } a - \text{длина стороны основания.}$$

$$\text{В } \triangle MHC: \operatorname{tg} MHC = \frac{MC}{CH},$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{\frac{1}{2} CC'}{\frac{\sqrt{3}}{2} a}, \quad h = CC' = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2, \quad \cos MHC = \frac{CH}{MH};$$

$$\cos 45^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} a}{MH}; \quad MH = \sqrt{\frac{3}{2}} a; \quad S_{ABM} = \frac{1}{2} a \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} a = 4\sqrt{6}$$

$$a^2 = 8 \cdot 2, \quad a = 4$$

$$V = S_{\text{осн.}} \cdot h = \frac{1}{2} AB \cdot CH \cdot h = \frac{1}{2} a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a \cdot \sqrt{3} a = \frac{3}{4} a^3 = 48 \text{ см}^3$$

Ответ: 48 см³.

StudyPort.ru

3.52.

В $\triangle C'HC$ угол C – прямой, а $\angle H = 60^\circ$, тогда

$$\frac{CH}{CC'} = \operatorname{ctg} 60^\circ, \quad CH = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} \text{ см}$$

В $\triangle BCH$ угол H прямой, а $\angle B = 60^\circ$, т.к. $\triangle ABC$ равносторонний, тогда ($BC = a$)

$$a = BC = \frac{CH}{\sin 60^\circ} = 8 \text{ см}; \quad a = 8 \text{ см}$$

$$V = S_{\text{осн.}} \cdot h = \frac{1}{2} AB \cdot CH \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{3} \cdot 12 = 192\sqrt{3} \text{ см}^3$$

Ответ: $192\sqrt{3} \text{ см}^3$.

3.53. см. рис. 3.49. $V = abc$, a, b, c – длины AD, AB, AA' , соответственно (или BC, CD, DD')

$$V_{DACS} = \frac{1}{3} \cdot S_{ACD} \cdot \frac{1}{2} DD' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} AD \cdot CD \cdot \frac{c}{2} = \frac{1}{12} abc;$$

$$V = 12 \cdot V_{DACS} = 480 \text{ см}^3. \quad \text{Ответ: } 480 \text{ см}^3.$$

3.54.

Призма $ABCA'B'C'$ и пирамида $C'ABC$ имеют одну и ту же высоту и одно и то же основание:

$$\frac{V_{C'ABC}}{V} = \frac{\frac{1}{3} S_{\text{осн.}} h}{S_{\text{осн.}} h} = \frac{1}{3}; \quad \frac{V_{C'ABC}}{V - V_{C'ABC}} = \frac{\frac{1}{3} V}{V - \frac{1}{3} V} = \frac{1}{2}$$




Ответ: $\frac{1}{2}$.

3.55.

MN – средняя линия, значит, она параллельна AB , отсюда $\angle BAC = \angle NMC$ как соответственные при параллельных прямых. $\triangle ACB \sim \triangle MNC$ (по двум равным углам, т.к. $\angle C$ – общий), коэф.

Подобия k равен $\frac{1}{2}$, т.к. средняя линия MN равна половине AB^2 .

Значит, $S_{MNC} = \frac{1}{4} S_{ABC}$.



$$V_{SABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h \text{ и } V_{SMNC} = \frac{1}{3} S_{MNC} \cdot h \text{ (высота у них одинаковая),}$$

$$\frac{V_{SMNC}}{V_{SABC}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} S_{ABC} h}{\frac{1}{3} \cdot S_{ABC} h} = \frac{1}{4}; \quad \frac{V_{SMNC}}{V_{SABC} - V_{SMNC}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}. \quad \text{Ответ: } \frac{1}{3}.$$

3.56.

Пусть $AB = BC = CD = AD = a$, $SO = h$. Тогда $V = \frac{1}{3} a^2 \cdot h$.

$$V_1 = V_{MNCL} = \frac{1}{3} MH \cdot CH \cdot NL \cdot \frac{1}{2}.$$

Рассмотрим $\triangle CNL$. $CL = \frac{a}{2}$, $CN = \frac{a}{2}$. $\angle C = 90^\circ$.


$$\text{Значит } NL = \frac{a}{\sqrt{2}}. \quad CH = \frac{1}{2} CO = \frac{a}{2\sqrt{2}}.$$

Так как $CH = \frac{1}{2} CO$ и $\triangle SCO \square \triangle MCH$, то $MH = \frac{1}{2} SO = \frac{1}{2} h$.

$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} h \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{a}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{3} a^2 h \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{16} V.$$

$$\text{Значит } \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_1}{V - V_1} = \frac{1}{15}.$$

3.57.



C_1 Данная плоскость пересекает две параллельные плоскости боковых граней и значит, $MN \parallel CD$.

Но по определению прямоугольного параллелепипеда $AB \parallel CD$, отсюда если одна прямая параллельна одной из двух параллельных прямых, то она параллельна третьей, т.е. $MN \parallel AB$, значит, $\angle BAB' = \angle NOB'$, т.к. это соответственные углы при параллельных прямых. Отсюда $\triangle ABB' \sim \triangle ONB'$ (по двум равным углам, $\angle B'$ у них общий). Коэф. подобия равен $\frac{1}{2}$, т.к. диагонали прямоугольника $ABB'A$ точкой пересечения делятся пополам, т.е.

$$\frac{B'N}{BB'} = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad \frac{BN}{BB'} = \frac{1}{2}.$$

Найдем объем отсекаемой прямой призмы с основанием $\triangle BCN$ (угол B прямой).

$$V' = S'_{\text{осн.}} \cdot AB = \frac{1}{2} BN \cdot BC \cdot AB = \frac{1}{4} AB \cdot BC \cdot BB'.$$

Объем параллелепипеда равен $V = AB \cdot BC \cdot BB'$.

$$\frac{V'}{V} = \frac{1}{4}, \quad \frac{V'}{V - V'} = \frac{\frac{1}{4}V}{V - \frac{1}{4}V} = \frac{1}{3}. \quad \text{Ответ: } \frac{1}{3}.$$

3.58. см. рис. 3.46.

В 3.46 доказано, что площадь параллельного основанию сечения пирамиды относится к площади основания как квадрат отношения длины отрезка (считая от вершины), который отсекает плоскость, к высоте пирамиды.

Пусть k – коэффициент отношения отрезка к высоте, V – объем пирамиды, V' – объем отсекаемой пирамиды.

$$V' = \frac{1}{3} S' h', \quad \text{где} \quad \frac{S'}{S} = k^2, \quad \frac{h'}{h} = k, \quad \text{т.е.} \quad V' = \frac{1}{3} k^3 \cdot Sh. \quad V = \frac{1}{3} Sh.$$

$$\frac{V'}{V} = k^3, \quad \text{а по условию} \quad \frac{V'}{V - V'} = \frac{1}{26} \Rightarrow \frac{V'}{V} = k^3 = \frac{1}{27}, \quad k = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Значит высота делиться в отношении} \quad \frac{k}{1-k} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{2}.$$

3.59. см. рис. 3.46.

Пусть h' – высота отсекаемой пирамиды, h – высота данной пирамиды, S' – основание отсекаемой пирамиды, S – данной пирамиды; тогда по сформулированному в 3.58

$$\frac{h'}{h} = k, \quad \text{по условию} \quad \frac{h'}{h - h'} = \frac{2}{1}; \quad \frac{kh}{h - kh} = \frac{2}{1};$$

$$k = 2 \cdot (1 - k), \quad k = \frac{2}{3}, \quad \text{тогда} \quad \frac{S'}{S} = \frac{4}{9} \quad (\text{см. 3.58}).$$

$$\frac{V'}{V} = \frac{\frac{1}{3}S'h'}{\frac{1}{3}Sh} = \frac{\frac{1}{3}k^3 \cdot Sh}{\frac{1}{3} \cdot Sh} = k^3 = \frac{8}{27}; \quad \frac{V'}{V-V'} = \frac{\frac{8}{27}V}{V - \frac{8}{27}V} = \frac{8}{19}.$$

Ответ: $\frac{8}{19}$.

3.60. см. рис. 3.46.

По условию $\frac{V'}{V-V'} = 1$, где V' – объем отсекаемой пирамиды, а V – объем данной с основанием $S = 1 \text{ м}^2$. Пусть S' – площадь сечения, тогда (см. 3.58) $k^2 = \frac{S'}{S}$, $S' = k^2S$. (см. 3.59) $\frac{V'}{V} = k^3$, $V' = k^3V$

$$\frac{k^3V}{V - k^3V} = 1, \quad \frac{k^3}{1 - k^3} = 1, \quad 2k^3 = 1, \quad k = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}; \quad S' = k^2S = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} \cdot 1 \text{ см}^2.$$

Ответ: $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$.

3.61. 1 случай

Если высота призмы равна 12 см, а периметр основания (треугольник) равен 15, т.е. $h = 12 \text{ см}$, $3a = 15$, $a = 5$.

$$V = h \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin 60^\circ \cdot a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 12 \cdot 25 = 75\sqrt{3}.$$

2 случай

$$h = 15, \quad 3a = 12, \quad a = 4. \quad V = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 \cdot 15 = 60\sqrt{3}.$$

Ответ: $V = 60\sqrt{3} \text{ см}^3$, $V = 75\sqrt{3} \text{ см}^3$.

3.62. Пусть h – высота призмы, периметр $3a$, где a – сторона основания.

1 случай

$$3a = 9 \text{ см}, \quad a = 3 \text{ см}, \quad h = 18 \text{ см};$$

$$S_{\text{осн}} = \frac{1}{2} a \cdot a \cdot \sin 60^\circ = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{9\sqrt{3}}{4};$$

$$S = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн}} = 3ah + \frac{9\sqrt{3}}{2};$$

$$S = 3 \cdot 3 \cdot 18 + \frac{9\sqrt{3}}{2} = 162 + \frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ см}^2$$

2 случай

$$3a = 18 \text{ см}, a = 6 \text{ см}, h = 9 \text{ см};$$

$$S_{\text{бок}} = 9\sqrt{3}; S = 9 \cdot 18 + 2 \cdot 9\sqrt{3} = 162 + 18\sqrt{3}.$$

$$\text{Ответ: } 162 + \frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ (см}^2\text{)} \text{ и } 162 + 18\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}.$$

3.63. Пусть h – высота призмы, $4a$ – периметр, где a – сторона основания

1 случай

$$4a = 12 \text{ см}, a = 3 \text{ см}, h = 16 \text{ см}. V_1 = a^2 h = 144 \text{ см}^3.$$

2 случай

$$4a = 16 \text{ см}, a = 4 \text{ см}, h = 12 \text{ см}; V_2 = a^2 h = 296 \text{ см}^3.$$

$$\text{Ответ: } \frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{4}.$$

3.64. Пусть h – высота призмы, $4a$ – периметр, где a – длина стороны основания.

1 случай

$$4a = 24 \text{ см}, a = 6 \text{ см}, h = 10 \text{ см}. S = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн.}} = 4ah + 2a^2.$$

$$S_1 = 24 \cdot 10 + 2 \cdot 6^2 = 312 \text{ см}^2.$$

2 случай

$$4a = 10 \text{ см}, a = 2,5 \text{ см}, h = 24 \text{ см}. S_2 = 10 \cdot 24 + 2 \cdot 2,5^2 = 252,5 \text{ см}^2.$$

Ответ: S_1 больше на $59,5 \text{ см}^2$, чем S_2 .

3.65. Пусть h – высота призм и по условию равна 8 см , a – длина стороны основания

1 случай

$$3a = 12 \text{ см}, a = 4 \text{ см}.$$

$$V_1 = S_{\text{осн.}} \cdot h = \frac{1}{2} a^2 \cdot \sin 60^\circ \cdot h = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 \cdot 8 = 32\sqrt{3} \text{ см}^3.$$

2 случай

$$4a = 12 \text{ см}, a = 3 \text{ см}; V_2 = a^2 h = 9 \cdot 8 = 72.$$

$$\text{Ответ: } \frac{V_1}{V_2} = \frac{4\sqrt{3}}{9}.$$

3.66. Пусть h – высота обеих призм и по условию равна 10 см , a – длина стороны основания

1 случай

$$3a = 24 \text{ см}, a = 8 \text{ см}$$

$$S_1 = S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн.}} = 3ah + a^2 \cdot \sin 60^\circ = 240 + 2 \cdot 16\sqrt{3} = 16(15 + 2\sqrt{3}) \text{ см}^2.$$

2 случай

$$4a = 24 \text{ см}, a = 6 \text{ см.}$$

$$S_2 = S_{\text{бок.}} + 2S_{\text{осн.2}} = 4ah + 2a^2 = 240 + 2 \cdot 36 = 312 \text{ см}^2.$$

Ответ: S_1 меньше S_2 на $8 \cdot (9 - 4\sqrt{3}) \text{ см}^2$.

3.67. Пусть h – высота пирамиды, по условию она равна стороне квадрата, т.е. 12 см, периметр равен тоже 12 см.

1 случай

$$3a = 12 \text{ см, где } a \text{ – сторона основания. } a = 4 \text{ см.}$$

$$S_{\text{осн.1}} = \frac{1}{2} a^2 \cdot \sin 60^\circ$$

$$S_1 = S_{\text{бок.1}} + 2S_{\text{осн.1}} = 3a \cdot h + a^2 \cdot \sin 60^\circ = 12 \cdot 12 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4^2 = 8 \cdot (18 + \sqrt{3}) \text{ см}^2.$$

2 случай

$$4a = 12 \text{ см, } a = 3 \text{ см. } S_{\text{осн.2}} = a^2,$$

$$S_2 = S_{\text{бок.}} + 2S_{\text{осн.2}} = 4ah + 2a^2 = 12 \cdot 12 + 2 \cdot 9 = 162 \text{ см}^2.$$

Ответ: S_2 больше S_1 на $2S_{\text{осн.2}} - 2S_{\text{осн.1}} = 18 - 8\sqrt{3} \text{ см}^2$.

3.68. Пусть h – высота, тогда по условию она равна стороне квадрата, т.е. 24 см, периметр равен тоже 24 см

1 случай


$$3a = P, a = P/3 = 8 \text{ см. } V_1 = S_{\text{осн.1}} \cdot h = \frac{1}{2} a^2 \cdot \sin 60^\circ \cdot h = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{P^2}{9}$$

2 случай

$$4a = p, a = p/4 = 6 \text{ см. } V_2 = S_{\text{осн.2}} \cdot h = a^2 \cdot h = 36 - 24 \text{ см}^2$$

$$\text{Ответ: } \frac{V_1}{V_2} = \frac{S_{\text{осн.1}}}{S_{\text{осн.2}}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}.$$

3.69.



1. При вращении AB около AD получается конус с образующей равной AB , и радиусом равны BH . (В $\triangle ABH$ $\angle H$ прямой, $\angle A$ по условию

$$60^\circ, BH = AB \cdot \sin 60^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \text{ см, } AH = AB \cdot \cos 60^\circ = 5 \text{ см})$$

2. При вращении BC около AD получаем цилиндр высотой равной BC , т.е. по условию 10 см, и радиусом $BH = 5\sqrt{3}$ см.

При вращении CD – конус, образующая $CD = AB$, и радиус $CH' = BH$ (т.к. по определению ромба $AD \parallel CB$), значит, общий объем V равен.

$V = V_{\text{конус1}} + V_{\text{цилиндр}} - V_{\text{конус2}} = V_{\text{цилиндр}}$ (т.к. $V_{\text{конус1}} = V_{\text{конус2}}$, т.к. $\triangle ABH = \triangle CDH'$ по гипотенузе и катету: $AB = CD$, $BH = CH'$,

т.е. $V_{\text{конус1}} = \frac{1}{3}\pi BH^2 \cdot AH$ и $V_{\text{конус2}} =$

$$= \frac{1}{3}\pi CH'^2 \cdot DH' \text{). } V_{\text{цилиндр}} = \pi BH^2 \cdot BC = \pi \cdot 10 \cdot 75 = 750\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

Ответ: 750π см³.

3.70. см. рис 3.69.

1. AB , вращаясь, дает конус с высотой AH (т.к. в $\triangle ABH$ $\angle H$ прямой и по условию $AB = 8$ см, угол A равен 60° , то радиус $BH = AB \cdot \cos 60^\circ = 4\sqrt{3}$ см), образующая AB по условию равна 8 см.

$$S_{\text{пов.1}} = \pi BH \cdot AB = \pi \cdot 4\sqrt{3} \cdot 8 = 32\sqrt{3}\pi \text{ см}^2$$

2. BC , вращаясь, дает цилиндр с образующей BC , равной по условию 8 см, и радиусом BH , равным $4\sqrt{3}$ см.

$$S_{\text{пов.2}} = 2\pi BH \cdot BC = 2\pi \cdot (4\sqrt{3}) \cdot 8 = 64\sqrt{3}\pi \text{ см}^2$$

3. CD , вращаясь, дает конус с образующей CD , равной по длине AB , и радиусом CH' , равным BH , т.к. $AD \parallel BC$ по определению ромба, значит $S_{\text{пов.3}} = S_{\text{пов.1}}$

$$4. S = 2S_{\text{пов.1}} + S_{\text{пов.2}} = 128\sqrt{3}\pi \text{ см}^2. \text{ Ответ: } 128\sqrt{3}\pi \text{ см}^2.$$



3.71.



1. BC , вращаясь, дает конус с образующей BC , радиусом CH и высотой BH .

$CH = 4$ см (по условию)

$AHCD$ – прямоугольник, значит $AH = DC$ и $BH = AB - AH = AB - CD = 8 \text{ см} - 5 \text{ см} = 3 \text{ см}.$

$$V_{\text{кон.}} = \frac{1}{3}\pi CH^2 \cdot BH = \frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 16\pi \text{ см}^3.$$





2. CD , вращаясь около AB , дает цилиндр с радиусом CH и высотой AH . По условию $AH = DC = 5$ см, $CH = 4$ см.

$$V_{\text{цил.}} = \pi CH^2 \cdot AH = \pi \cdot 4^2 \cdot 5 = 80\pi \text{ см}^3.$$

3. $V = V_{\text{кон.}} + V_{\text{цил.}} = 16\pi + 80\pi = 96\pi \text{ см}^3$. Ответ: $96\pi \text{ см}^3$.

3.72. 1. BC , вращаясь около AB , дает конус с образующей BC и радиусом CH , равным по условию 3 см.

$BC^2 = CH^2 + BH^2$, $BH = AB - AH$, а $AH = CD$, т.к. это стороны прямоугольника $AHCD$, тогда по условию

$$BH = AB - CB = 10 - 6 = 4 \text{ см, и } BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ (см).}$$

$$S_1 = \pi \cdot CH \cdot BC = \pi \cdot 3 \cdot 5 = 15\pi \text{ см}^2$$

2. CD , вращаясь около AB , дает цилиндр с радиусом CH , равным по условию 3 см, и высотой AH , равной 6 см, тогда

$$S_2 = 2\pi CH \cdot AH = 2\pi \cdot 3 \cdot 6 = 36\pi \text{ см}^2$$

3. DA , вращаясь около AB , дает окружность радиусом CH ,

$$S_3 = \pi CH^2 = 9\pi \text{ см}^2, S = S_1 + S_2 + S_3 = 15 + 36 + 9 = 60 \text{ см}^2$$

Ответ: 60 см^2 .

3.73. 1. AB , вращаясь около CD , дает цилиндр с радиусом AD , равным по условию 3 см, и высотой DH' , равной AB , которая по условию равна 14 см, т.к. $ABH'D$ по условию и построению параллелограмм, то его противоположные стороны равны.

$$V_1 = \pi \cdot AD^2 \cdot AB = \pi \cdot 3^2 \cdot 14 = 126\pi \text{ см}^3$$

2. BC , вращаясь вокруг CD , дает конус с высотой CH' , радиусом BH' , равным AD , т.к. $AB \parallel CD$ по определению трапеции, т.е. $BH' = 3$ см.

$$CH' = DH' - CD = AB - CD = 14 - 10 = 4 \text{ см}$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi BH'^2 \cdot CH' = \frac{1}{3} \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 12\pi$$

3. $V = V_1 - V_2 = 126\pi - 12\pi = 114\pi \text{ см}^3$

Ответ: $114\pi \text{ см}^3$.

140

3.74. 1. Вращаясь около CD , AB дает поверхность цилиндра с радиусом, равным CH (по условию $CH = 4$ см) и высотой, равной AB (по условию $AB = 15$ см).

$$S_1 = 2\pi CH \cdot AB = 120\pi \text{ см}^2$$

2. Вращаясь около CD , BC дает поверхность конуса с образующей BC и радиусом BH' .

$BC^2 = CH^2 + BH'^2$, $BH = AB - AH = AB - DC$, т.к. $AHCD$ – прямоугольник, а в прямоугольнике противоположные стороны равны,

значит $BH = 15 \text{ см} - 12 \text{ см} = 3 \text{ см}$, $BC = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ см}$

$$S_2 = \pi BH' \cdot BC = 20\pi \text{ см}^2.$$

3. AD , вращаясь, дает окружность с радиусом AD , $AD = CH = 4$ см.

$$S_3 = \pi CH^2 = 16\pi \text{ см}^2.$$

$$4. S = S_1 + S_2 + S_3 = 120\pi + 20\pi + 16\pi = 156\pi \text{ см}^2$$

Ответ: $156\pi \text{ см}^2$.

3.75. 1 случай

Пользуемся выражениями объема, данными в задаче 3.73.

$$V_1 = \pi \cdot AD^2 \cdot AB = \pi \cdot 12^2 \cdot 15 = 2160\pi \text{ см}^3 \text{ – для цилиндра}$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi BH'^2 \cdot CH' = \frac{1}{3} \cdot 12^2 \cdot 5\pi = 240\pi \text{ см}^3 \text{ – для конуса}$$

$CH' = AB - CD = 15 \text{ см} - 10 \text{ см} = 5 \text{ см}$, $AD = CH = 12 \text{ см}$.

$$V = V_1 - V_2 = 1920\pi \text{ см}^3.$$

2 случай

Возьмем выражения из 3.71.

$$V'_1 = \pi CH^2 \cdot AH = \pi \cdot 12^2 \cdot 10 = 1440\pi \text{ см}^3 \text{ – для цилиндра,}$$

$$AH = CD = 10 \text{ см}$$

$$V'_2 = \frac{1}{3} \pi CH^2 \cdot BH = \frac{1}{3} \pi \cdot 12^2 \cdot 5 = 240\pi \text{ см}^3 \text{ – для конуса,}$$

$$BH = AB - CD = 5 \text{ см}$$

$$V' = V'_1 + V'_2 = 1680\pi \text{ см}^3$$

Ответ: V больше V' на $240\pi \text{ см}^3$.

3.76. см. рис. 3.71.

1 случай

Пользуемся выражением площади из 3.74.

$$S_1 = 2\pi \cdot CH \cdot AB = 2\pi \cdot 15 \cdot 20 = 600\pi \text{ см}^2 \text{ – площадь цилиндра}$$

$$S_2 = \pi \cdot BH' \cdot BC, \text{ где } BH' = CH = 15 \text{ см и } BC = \sqrt{CH^2 + HB^2},$$

$$HB = AB - CD = 20 \text{ см} - 12 \text{ см} = 8 \text{ см}. \quad BC = \sqrt{15^2 + 8^2} = 17 \text{ см}.$$

$$S_2 = \pi \cdot 15 \text{ см} \cdot 17 \text{ см} = 255\pi \text{ см}^2 \text{ – площадь боковой поверхности конуса}$$

$$S_3 = \pi AD^2, AD = CH = 15 \text{ см.}$$

$$S_3 = \pi \cdot 15^2 = 225\pi \text{ см}^2 - \text{площадь окружности.}$$

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = 1080\pi \text{ см}^2.$$

2 случай

Пользуемся выражением из 3.72.

$$S'_1 = \pi CH \cdot BC, \text{ где } CH = 15 \text{ см по условию, а } BC = \sqrt{CH^2 + HB^2},$$

$$BH = AB - CD = 20 \text{ см} - 12 \text{ см} = 8 \text{ см, } BC = 17 \text{ см}$$

$$S'_1 = \pi \cdot 15 \cdot 17 = 255\pi \text{ см}^2 - \text{площадь боковой поверхности конуса}$$

$$S'_2 = 2\pi CH \cdot CD = 2\pi \cdot 15 \cdot 12 = 360\pi \text{ см}^2 - \text{площадь боковой поверхности цилиндра.}$$


По условию $CH = 15 \text{ см, } CD = 12 \text{ см.}$

$$S'_3 = \pi CH^2 = 225\pi \text{ см}^2 - \text{площадь окружности}$$

$$S' = S'_1 + S'_2 + S'_3 = 840\pi \text{ см}^2$$

Ответ: S больше S' на $240\pi \text{ см}^2$, т.е. на $S_1 - S'_2$ (разность площадей поверхностей цилиндров в 1-ом случае и во 2-ом случае).

3.77.



Рассмотрим равнобедренную трапецию $ABCD$ с меньшим основанием CD и большим AB . $BM = CH$, т.к. CH – по построению высота трапеции, и $BM \perp DC$, т.е. расстояние от любой точки одной из параллельных прямых до другой прямой одинаково.

Аналогично, $AN = DH$. $\triangle ADN$ и $\triangle BCM$ – прямоугольные и равны по катетам $AN = BM$ ($AN = DH = CH = BM$) и гипотенузам $AD = BC$, т.к. трапеция равнобедренная, значит, $DN = CM$.

1. При вращении AD и BC вокруг CD , получаем конусы с одинаковым объемом, т.е.

$$V_1 = \frac{1}{3} BM^2 \cdot \pi \cdot CM \text{ и } V_2 = \frac{1}{3} \pi AN^2 \cdot DN. \quad V_1 = V_2 = V_{\text{кон.}}$$

142

2. При вращении AB вокруг DC получается цилиндр с высотой, $AB = 16$ см; с радиусом, $CH = 4$ см.

$$V_{\text{цил.}} = \pi CH^2 \cdot AB = 16^2 \pi = 256\pi \text{ см}^3.$$

3. $ABMN$ – прямоугольник по построению.

$$DN = CM = \frac{AB - CD}{2} \quad CM = \frac{16 - 10}{2} = 3 \text{ см}, \quad BM = CH = 4 \text{ см}.$$

$$V_{\text{кон.}} = \frac{1}{3} \pi BM^2 \cdot CM = \frac{1}{3} \pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 16\pi \text{ см}^3$$

$$4. V = V_{\text{цил.}} - 2V_{\text{кон.}} = 256\pi - 32\pi = 224\pi \text{ см}^3$$

Ответ: $224\pi \text{ см}^3$.

3.78. 1. Т.к. $AD = BC$ и $AN = BM$ (см. 3.77), то

$$S_1 = \pi AN \cdot AD \text{ и } S_2 = \pi BM \cdot BC, \text{ то}$$

$$S_1 = S_2 = S_{\text{кон.}} = \pi \cdot CH \cdot AD$$

Найдем AD по теор. Пифагора, т.е. $AD^2 = AN^2 + DN^2$;

$$AN = CH = 3 \text{ см}, \quad DN = \frac{AB - CD}{2} \quad (\text{см. 3.77}), \text{ значит,}$$

$$AD^2 = CH^2 + \left(\frac{AB - CD}{2}\right)^2. \quad AD = \sqrt{3^2 + \left(\frac{18 - 10}{2}\right)^2} = 5 \text{ см}.$$

$$S_{\text{кон.}} = \pi \cdot 3 \text{ см} \cdot 5 \text{ см} = 15\pi \text{ см}^2.$$

$$2. S_{\text{цил.}} = 2\pi \cdot CH \cdot AB = 2\pi \cdot 3 \cdot 18 = 108\pi \text{ см}^2.$$

$$3. S = S_{\text{цил.}} + 2S_{\text{кон.}} = 108\pi + 2 \cdot 15\pi = 138\pi \text{ см}^2. \quad \text{Ответ: } 138\pi \text{ см}^2.$$

3.79. В трапеции $ABCD$ $AD = BC$ (трапеция равнобокая), CH и DH' – высоты, значит, $\triangle ADH'$ и $\triangle BCH$ – прямоугольные и равные, по катетам и гипотенузе, значит, $BH = AH'$, а $CD = HH'$ (противолежачие стороны прямоугольника $CDH'H$).

$$AH' = BH = \frac{AB - CD}{2}.$$

1. Вращаем AD и BC около AB , получаем два конуса, с радиусом равным CH и DH' ($CH = DH'$) и высотой AH' и BH .

$$V_1 = \frac{1}{3} \pi CH^2 \cdot BH \text{ и } V_2 = \frac{1}{3} \pi \cdot DH'^2 \cdot AH', \text{ т.е.}$$

$$V_1 = V_2 = V_{\text{кон.}} = \pi \cdot CH^2 \cdot \frac{AB - CD}{2}. \quad V_{\text{кон.}} = \frac{1}{3} \pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 16\pi \text{ см}^3.$$

2. Вращаем CD около AB , получаем цилиндр высотой равной длине CD , т.е. по условию 12 см, и радиусом равным длине CH , т.е. 4 см. $V_{\text{цил.}} = \pi \cdot CH^2 \cdot CD = \pi \cdot 4^2 \cdot 12 = 192\pi \text{ см}^3$.

3. $V = V_{\text{цил.}} + 2V_{\text{кон.}} = 224\pi \text{ см}^3$. Ответ: $224\pi \text{ см}^3$.

3.80. Воспользуемся зад. 3.79, найдем AD по теор. Пифагора

$$AD = \sqrt{AH'^2 + DH'^2}, \quad AH' = BH = \frac{AB - CD}{2}, \text{ т.е.}$$

$$AD = BC = \sqrt{CH^2 + \left(\frac{AB - CD}{2}\right)^2}, \text{ т.к. } CH \text{ и } DH' - \text{высоты трапеции.}$$

Вращая AD и BC около AB , получаем конусы с равными боковыми пов-ми, т.к. $S_1 = \pi \cdot CH \cdot BC$ и $S_2 = \pi \cdot DH' \cdot AH'$

$$S_1 = S_2 = S_{\text{кон.}} = \pi \cdot CH \cdot \sqrt{CH^2 + \left(\frac{AB - CD}{2}\right)^2}.$$

$$S_{\text{кон.}} = \pi \cdot 12 \cdot \sqrt{12^2 + 5^2} = 156\pi \text{ см}^2$$

2. Вращаясь CD около AB , дает цилиндр с радиусом CH и высотой равной по длине CD .

$$S_{\text{цил.}} = 2\pi CH \cdot CD; \quad S_{\text{цил.}} = 2\pi \cdot 12 \cdot 15 = 360\pi \text{ см}^2;$$

$$3. S = S_{\text{цил.}} + 2S_{\text{кон.}} = 672\pi \text{ см}^2. \quad \text{Ответ: } 672\pi \text{ см}^2.$$

3.81. См. 3.77 и 3.79

1 случай

CH – высота трапеции, AB и CD – длины оснований трапеции

$$V = V_{\text{цил.}} - 2V_{\text{кон.}} = \pi CH^2 \cdot AB - 2 \cdot \frac{1}{3} \pi \cdot CH^2 \cdot \frac{AB - CD}{2} =$$

$$= \pi \cdot CH^2 \cdot \left(AB - \frac{AB - CD}{3} \right) = \pi \cdot 8^2 \cdot \left(24 - \frac{12}{3} \right) = 1280\pi \text{ см}^3$$

2 случай

$$V' = V'_{\text{цил.}} + 2V'_{\text{кон.}} = \pi CH^2 \cdot CD + 2\pi \cdot \frac{1}{3} CH^2 \cdot \frac{AB - CD}{2} =$$

$$= \pi CH^2 \left(CD + \frac{AB - CD}{3} \right) = \pi \cdot 8^2 \cdot 16 = 1024\pi \text{ см}^3$$

Ответ: V больше на $256\pi \text{ см}^3$, чем V' .

3.82. 1 случай.

$$\text{Из т. Пифагора } AD = \sqrt{AH'^2 + (DH')^2} = 10 \text{ см}^2$$

$$S = S_{\text{цил.}} + 2S_{\text{кон.}} = 2\pi \cdot CH \cdot AB + 2 \cdot \pi CH \cdot \sqrt{AD} =$$

$$= 2\pi CH \cdot (AB + \sqrt{AD}) = 2\pi \cdot 6 \cdot (28 + 10\pi) = 456\pi \text{ см}^2$$

2 случай (см. 3.80)

$$S' = S'_{\text{цил.}} + 2S'_{\text{кон.}} = 2\pi CH \cdot CD + 2\pi CH \cdot \sqrt{AD} =$$

144

StudyPort.ru

$$= 2\pi CH \cdot (CD + \sqrt{AD}) = 2\pi \cdot 6 \cdot (12 + 10) = 264\pi \text{ см}^2.$$

Ответ: S больше, чем S' на $192\pi \text{ см}^2$.

3.83.

1. AB , вращаясь, дает цилиндр с радиусом, равным BH , и высотой, равной AB , по условию $AB = 6 \text{ см}$.

Пусть AC – катет, по условию равный 3 см ,

$$\text{тогда } \sin ABC = \frac{AC}{AB} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \text{ т.е.}$$

$\angle ABC = 30^\circ$, тогда $\angle BCH = \angle ABC = 30^\circ$ как накрест лежащие при параллельных прямых AB и HF .

В $\triangle ACF$ угол $\angle ACF = 180^\circ - (\angle ACB + \angle BCH) = 60^\circ$,

$$AF = AC \cdot \sin ACF = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 3 \text{ см}; \quad CF = AC \cdot \cos ACF = \frac{3}{2} \text{ см}.$$

$AB = HF$, $AF = BH$ ($ABHF$ – прямоугольник), противоположные стороны прямоугольника равны.

$$V_{\text{цил.}} = \pi \cdot BH^2 \cdot AB = \pi \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} \right)^2 \cdot 6 = \frac{81\pi}{2} \text{ см}^3$$

2. BC , вращаясь, дает конус с высотой $CH = AB - CF = \frac{9}{2} \text{ см}$ и

радиусом $BH = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ см}$.


$$V_1 = \frac{1}{3} \pi BH^2 \cdot CH = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} \right)^2 \cdot \frac{9}{2} = \frac{81}{8} \pi \text{ см}^3.$$

3. AC , вращаясь, дает конус с высотой $CF = \frac{3}{2} \text{ см}$ и радиусом

$$AF = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ см}. \quad V_2 = \frac{1}{3} \pi AF^2 \cdot CF = \frac{27}{8} \pi \text{ см}^3.$$

$$4. \quad V = V_{\text{цил.}} - (V_1 + V_2) = \frac{81\pi}{2} - \frac{27}{2} \pi = \frac{54}{2} \pi \text{ см}^3.$$


Ответ: $27\pi \text{ см}^3$.



StudyPort.ru

3.84.

AB , вращаясь, дает усеченный конус с высотой h , равной половине диагонали квадрата, т.е.



$\frac{\sqrt{2}}{2}a$, где a — длина стороны квадрата, $a=8$ см, радиус верхнего основания тоже равен $\frac{\sqrt{2}}{2}a$, а

радиус нижнего основания R равен длине диагонали $\sqrt{2}a$.

$$V = \frac{1}{3}\pi(R^2 + r^2 + Rr) \cdot h = \frac{1}{3}\pi \left(\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2 + (\sqrt{2}a)^2 + \sqrt{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a =$$

$$= \frac{1}{3}\pi \left(\frac{5a^2}{2} + a^2 \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{7\sqrt{2}}{4 \cdot 3} \pi a^3 = \frac{896\sqrt{2}\pi}{3} \text{ см}^3.$$

2. BC , вращаясь, дает конус с высотой, равной $\frac{\sqrt{2}}{2}a$, и радиусом


$$\text{той же длины. } V' = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{2\sqrt{2}}{8} a^3 = \frac{128\sqrt{2}\pi}{3} \text{ см}^3.$$

3. Объем полученной фигуры равен $2 \cdot (V - V')$, т.к. фигура, полученная при вращении отрезков AB и BC , симметрична относительно плоскости большего основания с радиусом $\sqrt{2}a$ фигуре, полученной вращением отрезков AD и CD .

$$2 \cdot (V - V') = 2 \cdot \left(\frac{896\sqrt{2}\pi}{3} - \frac{128\sqrt{2}\pi}{3} \right) = 256\sqrt{2}\pi \cdot 2 = 512\sqrt{2}\pi \text{ см}^3$$

Ответ: $512\sqrt{2}\pi \text{ см}^3$.

3.85.



При вращении треугольника $\triangle ABC$ получается цилиндр (с высотой, равной стороне треугольника, с радиусом, равным $AM = AC \cdot \sin \angle ACM = 4 \cdot \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$ см, по условию) с вырезанными из него одинаковыми конусами с высотой, равной по длине половине BC (т.к. AM — высота и


медиана равностороннего треугольника), т.е. 2 см, и радиусами, равными длине AM , т.е. $2\sqrt{3}$ см.

$$V = V_{\text{цил.}} - 2V_{\text{кон.}} = \pi AM^2 \cdot BC - 2 \cdot \frac{1}{3} \pi AM^2 \cdot \frac{BC}{2} =$$

$$= \pi AM^2 \cdot \left(BC - \frac{BC}{3} \right) = \frac{2\pi AM^2 \cdot BC}{3} = 32\pi \text{ см}^3. \quad \text{Ответ: } 32\pi \text{ см}^3.$$

3.86.

Вращая треугольник, получаем цилиндр высотой, равной AC , т.е. 3 см, и радиусом BC , т.е. по условию 4 см, с вырезанным конусом с тем же радиусом A ($BC = AD$) и той же высотой.




$$V = V_{\text{цил.}} - V_{\text{кон.}} = \pi BC^2 \cdot AC - \frac{1}{3} \pi BC^2 \cdot AC = \frac{2}{3} \pi BC^2 \cdot AC =$$

$$= \frac{2}{3} \pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 32\pi \text{ см}^3. \quad \text{Ответ: } 32\pi \text{ см}^3.$$

3.87.


Фигура, полученная при вращении AB и BD , равна по объему фигуре, полученной при вращении AC и CD , т.к. эти фигуры симметричны относительно плоскости окружности, полученной при вращении AD .

AB , вращаясь, дает усеченный конус с меньшим радиусом r , равным половине AD , т.к. диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам, с большим радиусом R равным AD (по условию 10 см), из прямоугольного $\triangle ABM$ найдем длину высоты h усеченного конуса $BM = \sqrt{AB^2 - AM^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ см. Из этого усеченного конуса вырезается конус с радиусом, равным $\frac{AD}{2}$, т.е. 5 см, и высотой, равной BM , т.е. 12 см.



$$V = 2 \cdot (V_{\text{ус.кон.}} - V_{\text{кон.}}) = 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \pi (R^2 + r^2 + Rr) \cdot h - \frac{1}{3} \pi r^2 h \right) =$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{3} \pi (R^2 + Rr) h = 2 \cdot \frac{1}{3} \pi (10^2 + 10 \cdot 5) \cdot 12 = 1200\pi \text{ см}^3.$$



3.88.

Как и в предыдущей задаче, найдем объем одной из симметричных фигур, состоящей из усеченного конуса (с высотой h , меньшим радиусом r , большим радиусом R) и удаленного из него конуса с радиусом r и высотой h .

$$V = 2 \cdot (V_{\text{ус.кон.}} - V_{\text{кон.}}) = 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \pi (R^2 + r^2 + Rr)h - \frac{1}{3} \pi r^2 h \right) = \frac{2}{3} \pi (R^2 + Rr) \cdot h.$$

1 случай


$R = AC = 12$ см (по условию).

$r = \frac{AC}{2} = 6$ см, т.к. диагонали ромба перпендикулярны между собой и точкой пересечения делятся пополам.

$$h = \sqrt{AB^2 - \left(\frac{AC}{2}\right)^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ см}, \left(\frac{BD}{2} = 8 \text{ см}, BD = 16 \text{ см}\right)$$

$$V_1 = \frac{2}{3} \pi (12^2 + 12 \cdot 6) \cdot 8 = 1152\pi \text{ см}^3. \quad \text{Ответ: } 1152\pi \text{ см}^3.$$

2 случай




$$R = BD = 16 \text{ см}; \quad r = \frac{BD}{2} = 8 \text{ см}; \quad h = \frac{AC}{2} = 6 \text{ см}.$$

$$V_2 = \frac{2}{3} \pi (16^2 + 16 \cdot 8) \cdot 6 = 256 \cdot 6 = 1536\pi \text{ см}^3.$$

Ответ: V_1 меньше V_2 на $384\pi \text{ см}^3$.

3.89.

AD , вращаясь, дает цилиндр с высотой, равной AD (по условию 6 см) и радиусом AB (по условию 18 см). Из него вырезается конус той же высоты и радиусом, равным HB .



$HB = AB - AH = AB - CD$ ($AHCD$ – прямоугольник, поэтому $AH = AB$). $HB = 18 \text{ см} - 10 \text{ см} = 8 \text{ см}$.

$$V = V_{\text{цил.}} - V_{\text{кон.}} = \pi AB^2 \cdot AD - \frac{1}{3} \pi HB^2 \cdot AD =$$

$$= \pi \cdot AD \cdot \left(AB^2 - HB^2 \cdot \frac{1}{3} \right) = \pi \cdot 6 \cdot \left(18^2 - \frac{64}{3} \right) = 1816\pi \text{ см}^3.$$

Ответ: $1816\pi \text{ см}^3$.

3.90. $V_{\text{шар}} = 3V_{\text{куб}} = 3a^3$;

$$\frac{4}{3} \pi R^3 = 3a^3, \quad R = \sqrt[3]{\frac{9}{4} \pi a}; \quad S_{\text{шар}} = 4\pi R^2 = 4\pi \sqrt[3]{\frac{81}{16\pi^2} a^2};$$

$$3S_{\text{куб}} = 3 \cdot 6a^2 = 18a^2;$$

$$\frac{3S_{\text{куб.}}}{S_{\text{шар}}} = \frac{18}{4\pi \sqrt[3]{\frac{81}{16\pi^2}}} = \frac{18}{\sqrt[3]{81 \cdot 4\pi}} > 1;$$

$$18 \sqrt[3]{81 \cdot 4\pi}; \quad 9^3 \cdot 2^3 \sqrt[3]{81 \cdot 4\pi}, \quad 9 \cdot 2 \sqrt[3]{81 \cdot 4\pi}, \quad 18 > \pi.$$

Ответ: $3S_{\text{куб}}$ больше, чем $S_{\text{шар}}$.

3.91. $V_{\text{куб}} = 4V_{\text{шар}} = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi a^3$. Пусть b – сторона куба, тогда

$$b^3 = \frac{16\pi}{3} a^3, \quad b = \sqrt[3]{\frac{16\pi}{3} a}; \quad 4S_{\text{шар}} = 4 \cdot 4\pi a^2 = 16\pi a^2;$$

$$S_{\text{куб}} = 6b^2 = 6 \left(\sqrt[3]{\frac{16\pi}{3} a} \right)^2 = 2 \cdot \sqrt[3]{3 \cdot 16^2 \pi a^2} = 8 \sqrt[3]{12\pi^2 a^2}.$$

$$\frac{S_{\text{куб}}}{4S_{\text{шар}}} = \frac{8 \sqrt[3]{12\pi^2 a^2}}{16\pi a^2} = \frac{\sqrt[3]{12}}{2 \sqrt[3]{\pi}} = \frac{\sqrt[3]{12}}{\sqrt[3]{8\pi}} < 1.$$

$12\pi < 8\pi$. Ответ: $S_{\text{куб}}$ меньше, чем $4S_{\text{шар}}$.

3.92. $V_{\text{куб}} = a^3 = 4^3 = 64 \text{ см}^3$.

$$n \cdot V_{\text{шар}} = n \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = n \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 1^3 = \frac{4}{3} \pi n, \quad n \in \mathbb{N} \left(\frac{d}{2} = R \right)$$

$$\frac{V_{\text{куб}}}{nV_{\text{шар}}} = \frac{64}{4 \cdot \frac{4}{3} \pi n} = \frac{48}{\pi n} \geq 1, \text{ при } n \leq 15. \text{ Ответ: 15 шариков.}$$


3.93. $n \cdot V_{\text{куб}} = na^3$, где a – сторона куба, равная по условию 2 см, n – число кубов.

$$nV_{\text{куб}} = n \cdot 2^3 = 8n; \quad V_{\text{шар}} = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 2^3 = \frac{32}{3} \pi \text{ см}^3.$$

$$\frac{V_{\text{шар}}}{nV_{\text{куб}}} = \frac{\frac{32}{3} \pi}{n \cdot 8} = \frac{4\pi}{3n} \geq 1, \quad n \in \mathbb{N}; \quad \frac{4\pi}{3n} \geq 1; \quad n \leq \frac{4\pi}{3}; \quad n \leq 4.$$

Ответ: 4 кубика.

3.94.




Радиус цилиндра равен половине стороны основания призмы, высота у цилиндра и призмы одинаковая. Пусть a – длина стороны основания, тогда

$$V = V_{\text{цил.}} = \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 \cdot h \text{ и } V_{\text{призмы}} = a^2 \cdot h$$

$$V = \frac{\pi}{4} a^2 \cdot h; \quad \frac{4V}{\pi} = a^2 h = V_{\text{призмы}}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{4V}{\pi}.$$

3.95.



Основание правильной треугольной призмы есть равносторонний треугольник, радиус вписанной окружности выражается через длину стороны этого треугольника.

$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}}.$$

$S = S_{\text{призмы}} = 3a \cdot h$, где a – длина стороны основания, h – высота

$$S_{\text{цил.}} = 2\pi rh = \frac{2\pi \cdot a}{2\sqrt{3}} h = \frac{\pi}{\sqrt{3}} ah = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} S.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{3\sqrt{3}} S.$$


3.96.

Основание правильной треугольной призмы – равносторонний треугольник, радиус описываемой окружности равен $\frac{a}{\sqrt{3}}$.

(a – сторона основания)

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}, S = 3ah,$$

$$S_{\text{цил.}} = 2\pi R h = 2\pi \frac{a}{\sqrt{3}} h = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} S. \text{ Ответ: } \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} S.$$



3.97.


Основание правильной треугольной пирамиды – равносторонний треугольник, радиус описанной окружности равен $\frac{a}{\sqrt{3}}$. Высоты у конуса и пирамиды одинаковые.

$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}}, V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3 \cdot 12} \pi a^2 h;$$

$$a^2 h = \frac{36}{\pi} V.$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{осн.}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} a^2 \cdot \sin 60^\circ \cdot h = \frac{1}{6} a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} h = \frac{1}{4\sqrt{3}} a^2 h =$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{3}} \cdot \frac{36}{\pi} V = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V. \text{ Ответ: } \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V.$$




3.98.


Радиус описанной вокруг квадрата окружности равен $\frac{\sqrt{2}}{2} a$, где a – сторона квадрата

$$V_{\text{пир.}} = \frac{1}{3} a^2 h, V_{\text{кон.}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2} a^2 h$$

$$V_{\text{кон.}} = \frac{\pi}{2} V_{\text{пир.}} = \frac{\pi}{2} V. \text{ Ответ: } \frac{\pi}{2} V.$$



3.99.




С Проведем сечение через точку пересечения диагоналей куба, в этой же точке находится центр шара, вписанного в куб.

$$S_{\text{шар}} = 4\pi R^2 \text{ и } S_{\text{куб}} = 6a^2$$

$$R = \frac{a}{2}, \quad S_{\text{шар}} = \pi a^2, \quad \frac{S_{\text{шар}}}{S_{\text{куб}}} = \frac{\pi}{6}.$$

Ответ: $\frac{S_{\text{шар}}}{S_{\text{куб}}} = \frac{\pi}{6}$.

3.100.



С Если сторона куба a , то его диагональ $\sqrt{3}a$, поэтому радиус шара $= \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

$$\frac{V_{\text{шар}}}{V_{\text{куб}}} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8}a^3 = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}.$$

Ответ: $\frac{V_{\text{шар}}}{V_{\text{куб}}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}$.

StudyPort.ru

**Раздел 4. Задания 9-10 для экзамена
«Математика» Задания 6-7 для экзамена
«Алгебра и начала анализа»**

Тригонометрия

$$4.1. \frac{\sin 75^\circ + \sin 45^\circ}{\sin 285^\circ} = \frac{2 \sin 60^\circ \cos 15^\circ}{-\cos 15^\circ} = -2 \sin 60^\circ = -\sqrt{3}.$$

Ответ: $-\sqrt{3}$.

$$4.2. \frac{\sin 70^\circ + \sin 20^\circ}{\cos 25^\circ} = \frac{2 \sin 45^\circ \cos 25^\circ}{\cos 25^\circ} = 2 \sin 45^\circ = \sqrt{2}.$$

Ответ: $\sqrt{2}$.

$$4.3. \frac{\cos 105^\circ - \cos 15^\circ}{\cos 315^\circ} = \frac{-2 \sin 60^\circ \sin 45^\circ}{\cos 45^\circ} = -\sqrt{3}.$$

Ответ: $-\sqrt{3}$.

$$4.4. \frac{\sin 55^\circ \cos 35^\circ - \cos^2 10^\circ}{\sin 200^\circ} = \frac{\frac{1}{2}(\sin 20^\circ + \sin 90^\circ) - \frac{1}{2}(\cos 0^\circ + \cos 20^\circ)}{-\sin 20^\circ} =$$

$$= \frac{\frac{1}{2}(\sin 20^\circ \cos 20^\circ)}{-\sin 20^\circ} = \frac{1}{2}(\operatorname{ctg} 20^\circ - 1).$$

$$4.5. \frac{1 + \cos 40^\circ + \cos 80^\circ}{\sin 80^\circ + \sin 40^\circ} = \frac{1 + 2 \cos 60^\circ \cos 20^\circ}{2 \sin 60^\circ \cos 20^\circ} = \frac{1 + \cos 20^\circ}{\sqrt{3} \cos 20^\circ};$$

$$\frac{\cos 105^\circ \cos 5^\circ + \sin 105^\circ \sin 5^\circ}{\sin 95^\circ \cos 5^\circ + \cos 95^\circ \sin 5^\circ} = \frac{\cos 100^\circ}{\sin 100^\circ} = \operatorname{ctg} 100^\circ = -\operatorname{tg} 10^\circ.$$

Так как $\frac{1 + \cos 20^\circ}{\sqrt{3} \cos 20^\circ} > 0$ и $-\operatorname{tg} 10^\circ < 0$, то значение первого выражения больше значения второго.

Ответ: значение первого выражения больше.

$$4.6. \frac{\sin 20^\circ - \sin 40^\circ}{1 - \cos 20^\circ + \cos 40^\circ} = \frac{-2 \sin 10^\circ \cos 30^\circ}{1 - 2 \sin 30^\circ \sin 10^\circ} = \frac{\sqrt{3} \sin 10^\circ}{\sin 10^\circ - 1};$$

$$\frac{\sin 25^\circ \cos 5^\circ - \cos 25^\circ \sin 5^\circ}{\cos 15^\circ \cos 5^\circ - \sin 15^\circ \sin 5^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{\cos 20^\circ} = \operatorname{tg} 20^\circ.$$

Так как $\frac{\sqrt{3}\sin 10^\circ}{\sin 10^\circ - 1} < 0$ ($0 < \sin 10^\circ < 1$) и $\operatorname{tg} 20^\circ > 0$.

Ответ: значение первого выражения меньше.

$$4.7. \cos(2\pi - 3x)\cos x + \sin 3x\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) =$$

$$= \cos 3x \cdot \cos x + \sin 3x \cdot \sin x = \cos 2x;$$

$$\cos 2x = -\frac{1}{2}; \quad 2x = \pm\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + 2\pi k; \quad x = \pm\frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \cos 2x; \quad x = \pm\frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$4.8. \sin(\pi - 3x)\cos x + \cos 3x\cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) =$$

$$= \sin 3x \cos x - \cos 3x \sin x = \sin 2x;$$

$$\sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad 2x = (-1)^{k+1}\frac{\pi}{3} + \pi k, \quad x = (-1)^{k+1}\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \sin 2x; \quad x = (-1)^{k+1}\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$4.9. \sin x^\circ = \sin^2 15^\circ - 2\sin 15^\circ \cos 15^\circ + \cos^2 15^\circ;$$

$$\sin x^\circ = 1 - \sin 30^\circ; \quad \sin x^\circ = \frac{1}{2}; \quad x = 30. \quad \text{Ответ: } 30.$$

$$4.10. \cos x^\circ = \frac{\cos^2 75^\circ - \sin^2 75^\circ}{\sin 270^\circ}; \quad \cos x^\circ = \frac{\cos 150^\circ}{-1}; \quad \cos x^\circ = \cos 30^\circ;$$

$$\cos x^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x = 30. \quad \text{Ответ: } 30.$$

$$4.11. \frac{\sin 30^\circ \cos x^\circ + \cos 30^\circ \sin x^\circ}{\cos 180^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \sin(30^\circ + x^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$x = 195. \quad \text{Ответ: } 195.$$

$$4.12. \frac{\cos 45^\circ \cos x^\circ - \sin 45^\circ \sin x^\circ}{\sin 270^\circ} = 0,5; \quad \cos(45^\circ + x^\circ) = -\frac{1}{2};$$

$$x = 75.$$

Ответ: 75.

$$4.13. 2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0. \quad \sin x = a, \quad a \in [-1; 1].$$

$$2a^2 - 3a + 1 = 0; \quad D = 1; \quad a_1 = \frac{1}{2}; \quad a_2 = 1;$$

$$1) \sin x = \frac{1}{2}; x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z;$$

$$2) \sin x = 1; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z.$$

$$\text{Ответ: } (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi n, k, n \in Z.$$

$$4.14. 2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0;$$

$$\cos x = a, a \in [-1; 1].$$

$$2a^2 - a - 1 = 0; D = 9; a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{2}.$$

$$1) \cos x = 1; x = 2\pi k, k \in Z;$$

$$2) \cos x = -\frac{1}{2}; x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z.$$

$$\text{Ответ: } 2\pi k, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z.$$

$$4.15. \cos^2 x + 6\sin x - 6 = 0;$$

$$1 - \sin^2 x + 6\sin x - 6 = 0; \sin^2 x - 6\sin x + 5 = 0.$$

$$\text{Пусть } a = \sin x, a \in [-1; 1]; a^2 - 6a + 5; a_1 = 5, a_1 \notin [-1; 1];$$

$$a_2 = 1; \sin x = 1; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z. \text{ Ответ: } \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z.$$

$$4.16. 2\sin^2 x + 7\cos x + 2 = 0;$$

$$2 - 2\cos^2 x + 7\cos x + 2 = 0; 2\cos^2 x - 7\cos x - 4 = 0.$$

$$\cos x = a, a \in [-1; 1].$$

$$2a^2 - 7a - 4 = 0; D = 81; a_1 = 4 - \text{не удовлетворяет условию}$$

$$a \in [-1; 1]; a_2 = -\frac{1}{2}; \cos x = -\frac{1}{2}; x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z.$$

$$4.17. \cos 2x + 8\sin x = 3;$$

$$1 - 2\sin^2 x + 8\sin x - 3 = 0; \sin^2 x - 4\sin x + 1 = 0.$$

$$\sin x = a, a \in [-1; 1].$$

$$a^2 - 4a + 1 = 0; \frac{D}{4} = 3; a_1 = 2 + \sqrt{3} - \text{не удовлетворяет условию}$$

$$a_2 = 2 - \sqrt{3}; \sin x = 2 - \sqrt{3}; x = (-1)^k \arcsin(2 - \sqrt{3}) + \pi k, k \in Z.$$

$$\text{Ответ: } (-1)^k \arcsin(2 - \sqrt{3}) + \pi k, k \in Z.$$

4.18. $\cos 2x = 1 + 4\cos x$;
 $2\cos^2 x - 1 - 1 - 4\cos x = 0$; $\cos^2 x - 2\cos x - 1 = 0$.
 $\cos x = a$, $a \in [-1; 1]$. $a^2 - 2a - 1 = 0$;

$a_1 = 1 + \sqrt{2}$ - не удовлетворяет условию $a \in [-1; 1]$;

$a_2 = 1 - \sqrt{2}$; $x = \pm(\pi - \arccos(\sqrt{2} - 1)) + 2\pi k, k \in Z$.

Ответ: $\pm(\pi - \arccos(\sqrt{2} - 1)) + 2\pi k, k \in Z$.

4.19. $\cos 2x + \sin x = 0$; $1 - 2\sin^2 x + \sin x = 0$.
 $\sin x = a$, $a \in [-1; 1]$. $2a^2 - a - 1 = 0$; $D = 9$;

$a_1 = 1$; $\sin x = 1$; $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z$.

$a_2 = -\frac{1}{2}$; $\sin x = -\frac{1}{2}$; $x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$.

Ответ: $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$; $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$.

4.20. $\cos 2x + \cos x = 0$; $2\cos^2 x - 1 + \cos x = 0$.

$\cos x = a$, $a \in [-1; 1]$. $2a^2 + a - 1 = 0$; $D = 9$; $a_1 = -1$; $a_2 = \frac{1}{2}$;

$\cos x = -1$ или $\cos x = \frac{1}{2}$;

$x = \pi + 2\pi m, m \in Z$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$.

Ответ: $\pi + 2\pi m$; $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$.

4.21. $5 - 4\sin^2 x = 4\cos x$;
 $5 - 4 + 4\cos^2 x = 4\cos x$; $4\cos^2 x - 4\cos x + 1 = 0$. $\cos x = a$, $a \in [-1; 1]$.

$4a^2 - 4a + 1 = 0$; $(2a - 1)^2 = 0$; $a = \frac{1}{2}$; $\cos x = \frac{1}{2}$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$.

Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$.

4.22. $\cos 2x + 9\sin x + 4 = 0$;
 $1 - 2\sin^2 x + 9\sin x + 4 = 0$; $2\sin^2 x - 9\sin x - 5 = 0$.
 $\sin x = a$, $a \in [-1; 1]$. $2a^2 - 9a - 5 = 0$;

$a_1 = 5$ - не удовлетворяет условию $a \in [-1; 1]$;

$a_2 = -\frac{1}{2}$; $x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$. Ответ: $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$.

4.23. $\cos 2x - 7\cos x + 4 = 0;$
 $2\cos^2 x - 1 - 7\cos x + 4 = 0; 2\cos^2 x - 7\cos x + 3 = 0.$
 $\cos x = a, a \in [-1; 1]. 2a^2 - 7a + 3 = 0; D = 25;$
 $a_1 = 3$ – не удовлетворяет условию $a \in [-1; 1];$
 $a_2 = \frac{1}{2}; \cos x = \frac{1}{2}; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z.$ Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z.$

4.24. $2\cos 2x = 1 + 4\cos x;$
 $4\cos^2 x - 2 - 1 - 4\cos x = 0; 4\cos^2 x - 4\cos x - 3 = 0.$
 $\cos x = a, a \in [-1; 1]. 4a^2 - 4a - 3 = 0; D = 64;$
 $a_1 = 1,5$ – не удовлетворяет условию $a \in [-1; 1];$
 $a_2 = -\frac{1}{2}; \cos x = -\frac{1}{2}; x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z.$

Ответ: $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z.$

4.25. $2\sin^2 x + 5\cos x = 4;$
 $2 - 2\cos^2 x + 5\cos x = 4; 2\cos^2 x - 5\cos x + 2 = 0.$
 $\cos x = a, a \in [-1; 1]. 2a^2 - 5a + 2 = 0; D = 9;$
 $a_1 = 2$ – не удовлетворяет условию $a \in [-1; 1];$
 $a_2 = \frac{1}{2}; \cos x = \frac{1}{2}; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z.$

4.26. $2\cos 2x = 8\sin x + 5;$
 $2 - 4\sin^2 x = 8\sin x + 5; 4\sin^2 x + 8\sin x + 3 = 0. \sin x = a, a \in [-1; 1].$
 $4a^2 + 8a + 3 = 0; a_1 = -1,5$ – не удовлетворяет условию $a \in [-1; 1];$
 $a_2 = -\frac{1}{2}; \sin x = -\frac{1}{2}; x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z.$

Ответ: $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z.$

4.27. $\sin 2x - \sin x = 2\cos x - 1; 2\sin x \cos x - \sin x - 2\cos x + 1 = 0;$
 $2\cos x(\sin x - 1) - (\sin x - 1) = 0; (\sin x - 1)(2\cos x - 1) = 0;$
 $\sin x = 1$ или $\cos x = \frac{1}{2};$
 $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z.$

Ответ: $\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, n, k \in Z.$

4.28. $\sin 2x - \cos x = 2\sin x - 1; 2\sin x \cos x - \cos x - 2\sin x + 1 = 0;$
 $2\sin x(\cos x - 1) - (\cos x - 1) = 0; (\cos x - 1)(2\sin x - 1) = 0;$

$$\begin{aligned} \cos x = 1 & \quad \text{или} \quad 2\sin x = 1; \\ x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; & \quad x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ответ: $2\pi n; (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{4.29.} \quad \sin 2x + 2\sin x = \cos x + 1; \quad 2\sin x \cos x + 2\sin x - \cos x - 1 = 0; \\ 2\sin x(\cos x + 1) - (\cos x + 1) = 0; \quad (\cos x + 1)(2\sin x - 1) = 0; \end{aligned}$$

$$\cos x = -1 \quad \text{или} \quad \sin x = \frac{1}{2};$$

$$x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\pi + 2\pi n; (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, n, k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{4.30.} \quad \sin 2x + 2\cos x = \sin x + 1; \quad 2\sin x \cos x + 2\cos x - \sin x - 1 = 0; \\ 2\cos x(\sin x + 1) - (\sin x + 1) = 0; \quad (\sin x + 1)(2\cos x - 1) = 0; \end{aligned}$$

$$\sin x = -1 \quad \text{или} \quad \cos x = \frac{1}{2};$$

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, n, k \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{4.31.} \quad \cos 2x + \sin^2 x = \cos x, \quad [-\pi; \pi]; \\ \cos^2 x - \sin^2 x + \sin^2 x = \cos x; \quad \cos x(\cos x - 1) = 0; \\ \cos x = 0 \quad \text{или} \quad \cos x = 1; \end{aligned}$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \quad x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Из этих корней отрезку $[-\pi; \pi]$ принадлежат только корни $-\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}$.

Ответ: $-\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{4.32.} \quad \cos 2x + \sin x = \cos^2 x, \quad [0; 2\pi]; \\ \cos^2 x - \sin^2 x + \sin x - \cos^2 x = 0; \quad \sin x(1 - \sin x) = 0; \\ 1) \sin x = 0; \quad 2) \sin x = 1; \end{aligned}$$

$$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $0; \pi/2; \pi; 2\pi$.

4.33. $\cos 2x - \cos^2 x - \sqrt{2} \sin x = 0$, $[-\pi; \pi]$;

$$2 \cos^2 x - 1 - \cos^2 x - \sqrt{2} \sin x = 0; \quad \cos^2 x - 1 - \sqrt{2} \sin x = 0;$$

$$-\sin^2 x - \sqrt{2} \sin x = 0; \quad \sin x (\sin x + \sqrt{2}) = 0;$$

1) $\sin x = 0$; $x = \pi n, n \in Z$;

2) $\sin x = -\sqrt{2}$ не имеет решений, так как $|\sin x| \leq 1$.

Ответ: $-\pi; 0; \pi$.

4.34. $\cos 2x + \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x = 0$, $[-\pi; \pi]$;

$$\cos^2 x - \sin^2 x + \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x = 0; \quad \cos x (\cos x + \sqrt{3}) = 0;$$

1) $\cos x = 0$; $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$;

2) $\cos x = -\sqrt{3}$ - не имеет решений, так как $|\cos x| \leq 1$.

Ответ: $-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}$.

4.35. $\sin x = \cos x$, $[-2\pi; 0]$; $\sin x - \cos x = 0$. Т.к. $\sin x \neq 0$, то

$$1 - \operatorname{ctg} x = 0; \operatorname{ctg} x = 1; \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z.$$

$$-\frac{7\pi}{4} \quad (k = -2), \quad x = -\frac{3\pi}{4} \quad (k = -1). \quad \text{Ответ: } -\frac{7\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}.$$

4.36. $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 0$, $[\pi; 3\pi]$. Т.к. $\sin x \neq 0, x \neq \pi n, n \in Z$.

$$\sqrt{3} + \operatorname{ctg} x = 0; \quad \operatorname{ctg} x = -\sqrt{3}; \quad x = -\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z.$$

$$x = \frac{11\pi}{6} \quad (k = 2) \text{ и } x = \frac{17\pi}{6} \quad (k = 3). \quad \text{Ответ: } \frac{11\pi}{6}; \frac{17\pi}{6}.$$

4.37. $\sin x + \cos x = 0$, $[-\pi; \pi]$.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x = 0; \quad \cos \frac{\pi}{4} \sin x + \sin \frac{\pi}{4} \cos x = 0;$$

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 0; \quad x + \frac{\pi}{4} = \pi k, \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z. \quad \text{Ответ: } -\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}.$$

4.38. $\sin x = \sqrt{3} \cos x$, $[\pi; 3\pi]$; $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$.

$$\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = 0; \quad \sin x \cos \frac{\pi}{3} - \cos x \sin \frac{\pi}{3} = 0;$$

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0; \quad x - \frac{\pi}{3} = \pi k, \quad x = \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z.$$

Отрезку $[\pi; 3\pi]$ принадлежат $x = \frac{4\pi}{3}$ ($k = 1$) и $x = \frac{7\pi}{3}$ ($k = 2$).

Ответ: $\frac{4\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}$.

4.39. $\frac{2\cos x + \sin x}{\cos x - 7\sin x} = -\frac{1}{2}, \quad \cos x - 7\sin x \neq 0;$

$$4\cos x + 2\sin x = -\cos x + 7\sin x; \quad 5\cos x - 5\sin x = 0; \quad \cos x - \sin x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z.$$

Отрезку $[-\pi; \pi]$ принадлежат $x = \frac{\pi}{4}$ ($k = 0$), $x = -\frac{3\pi}{4}$ ($k = -1$).

Ответ: $-\frac{3\pi}{4}; \frac{\pi}{4}$.

4.40. $\frac{3\sin x + \cos x}{\cos x + 5\sin x} = \frac{1}{2}, \quad [-\pi; \pi];$

$$\frac{2(3\sin x + \cos x) - (\cos x + 5\sin x)}{2(\cos x + 5\sin x)} = 0; \quad \frac{\sin x + \cos x}{\cos x - 5\sin x} = 0;$$

$$\begin{cases} \sin x + \cos x = 0, \\ \cos x + 5\sin x \neq 0; \end{cases} \quad \cos x \neq 0; \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x + 1 = 0, \\ 1 + 5\operatorname{tg} x \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x = -1, \\ \operatorname{tg} x \neq -\frac{1}{5}; \end{cases}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z, ; \quad k = 0, k = 1; \quad x_1 = -\frac{\pi}{4}; \quad x_2 = \frac{3}{4}\pi.$$

Ответ: $-\frac{\pi}{4}; \frac{3}{4}\pi$.

4.41. $\frac{2\sin x - \cos x}{5\sin x - 4\cos x} = \frac{1}{3}, \quad [-\pi; \pi];$

$$6\sin x - 3\cos x = 5\sin x - 4\cos x, \quad 5\sin x - 4\cos x \neq 0;$$

$$\sin x + \cos x = 0; \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z.$$

$$x = \frac{3\pi}{4} \quad (k = 1) \quad \text{и} \quad x = -\frac{\pi}{4} \quad (k = 0). \quad \text{Ответ: } -\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}.$$

4.42. $\frac{\sin x - 2\cos x}{2\sin x + \cos x} = -\frac{1}{3}$, $2\sin x + \cos x \neq 0$;

$3\sin x - 6\cos x = -2\sin x - \cos x$; $\sin x - \cos x = 0$; $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$.

Отрезку $[0; 2\pi]$ принадлежат $x = \frac{\pi}{4}$ ($k = 0$) и $x = \frac{5\pi}{4}$ ($k = 1$).

Ответ: $\frac{\pi}{4}$; $\frac{5\pi}{4}$.

4.43. $y = \sin^2 x$; $y = \cos^2 x$.

Решим уравнение $\sin^2 x = \cos^2 x$.

$\sin^2 x - \cos^2 x = 0$; $\cos 2x = 0$; $2x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$;

$y\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}\right) = \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}\right) = \frac{1}{2}$. Ответ: $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, y = \frac{1}{2}, k \in Z$.

4.44. $y = 3\sin^2 x, y = \cos^2 x$. $3\sin^2 x = \cos^2 x$; $3\sin^2 x = 1 - \sin^2 x$;

$\sin x = \pm \frac{1}{2}$; $x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z, y = \frac{3}{4}$. Ответ: $\left(\pm \frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{3}{4}\right), k \in Z$.

4.45. $y = \sin^2 x, y = 3\cos^2 x$.

$\sin^2 x = 3\cos^2 x$; $1 - \cos^2 x = 3\cos^2 x$; $\cos^2 x = \frac{1}{4}$;

$\cos x = \pm \frac{1}{2}$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z, y = \frac{3}{4}$.

Ответ: $x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, y = \frac{3}{4}, k \in Z$.

4.46. $y = \sin 2x, y = 2\cos^2 x$.

$\sin 2x = 2\cos^2 x$; $2\sin x \cos x - 2\cos^2 x = 0$; $2\cos x(\sin x - \cos x) = 0$;

1) $\cos x = 0$; $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$;

2) $\sin x = \cos x$; $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$;

$y\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) = 0$; $y\left(\frac{\pi}{4} + \pi n\right) = 1$.

Ответ: $\left(\frac{\pi}{2} + \pi n; 0\right)$; $\left(\frac{\pi}{4} + \pi k; 1\right)$, $n, k \in Z$.

StudyPort.ru

4.47. $y = \sin x, y = \sin 2x$;
 $\sin x = \sin 2x; 2\sin x \cos x - \sin x = 0; \sin x (2\cos x - 1) = 0$;

1) $\sin x = 0; x = \pi n, n \in Z$;

2) $\cos x = \frac{1}{2}; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$.

Ответ: $\pi n; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, n, k \in Z$.

4.48. $y = 2 + \cos 2x, y = \cos x$
 $2 + \cos 2x = \cos x; 2 + 2\cos^2 x - 1 = \cos x; 2\cos^2 x - \cos x + 1 = 0$.

Пусть $\cos x = a, |a| \leq 1$. Тогда $2a^2 - a + 1 = 0, D < 0$ – уравнение корней не имеет, значит, графики функций $y = 2 + \cos 2x$ и $y = \cos x$ не имеют общих точек.

Ответ: точек пересечения нет.

4.49. $y = 3\sin 2x, y = 4\cos x$;
 $3\sin 2x = 4\cos x; 6\sin x \cos x = 4\cos x; 2\cos x(3\sin x - 2) = 0$

1) $\cos x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$;

2) $\sin x = \frac{2}{3}; x = (-1)^n \arcsin \frac{2}{3} + \pi n, n \in Z$.

Ответ: $\frac{\pi}{2} + \pi k, (-1)^n \arcsin \frac{2}{3} + \pi n, k, n \in Z$.

4.50. $y = 3\cos x - 1$ и $y = \cos 2x$;
 $3\cos x - 1 = \cos 2x; 3\cos x - 1 = 2\cos^2 x - 1$;
 $2\cos^2 x - 3\cos x + 0 = 0; \cos x(2\cos x - 3) = 0$;

$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x = 1,5 \end{cases}$

$\cos x = 1,5$ – не имеет решения, т.к. $|\cos x| \leq 1$;

$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$. Ответ: $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$.

StudyPort.ru

Степени и логарифмы

4.51. $\log_{216} 27 + \log_{36} 16 + \log_6 3 = \log_6 3^3 + \log_6 4^2 + \log_6 3 =$
 $= \log_6 3 + \log_6 4 + \log_6 3 = \log_6 36 = 2$. Ответ: 2.

4.52. $\log_{0,2} 125 : \log_{16} 64 \cdot \log_3 81 = \log_{5^{-1}} 5^3 : \log_{2^4} 2^6 \cdot \log_3 3^4 =$
 $= -3 : \frac{6}{4} \cdot 4 = -8$. Ответ: -8.

$$4.53. \log_1 16 \cdot \log_5 \frac{1}{25} : 9^{\log_3 2} = -\log_2 2^4 \cdot \log_5 5^{-2} : 3^{\log_3 4} =$$

$$= -4 \cdot (-2) : 4 = 2. \quad \text{Ответ: 2.}$$

$$4.54. \log_1 9 \cdot \log_2 \frac{1}{8} : 7^{2 \log_7 2} = -\log_3 3^2 \cdot \log_2 2^{-3} : 7^{\log_7 2} =$$

$$= -2 \cdot (-3) : 2 = 3. \quad \text{Ответ: 3.}$$

$$4.55. (3 \log_7 2 - \log_7 24) : (\log_7 3 + \log_7 9) = \log_7 \frac{8}{24} : \log_7 27 =$$

$$= \log_7 3^{-1} : \log_7 3^3 = \frac{-\log_7 3}{3 \log_7 3} = -\frac{1}{3}. \quad \text{Ответ: } -\frac{1}{3}.$$

$$4.56. (3 \lg 2 + \lg 0,25) : (\lg 14 - \lg 7) = \lg 2 : \lg 2 = 1. \quad \text{Ответ: 1.}$$

$$4.57. (\log_2 12 - \log_2 3 + 3^{\log_2 8})^{\lg 5} = (\log_2 4 + 8)^{\lg 5} = 10^{\lg 5} = 5.$$

Ответ: 5.

$$4.58. (\log_6 2 + \log_6 3 + 2^{\log_2 4})^{\log_6 7} = (\log_6 6 + 4)^{\log_6 7} = 5^{\log_6 7} = 7.$$

Ответ: 7.

$$4.59. 2^{2-x} - 2^{x-1} = 1;$$

$$\frac{2^2}{2^x} - \frac{2^x}{2} - 1 = 0. \quad \text{Пусть } 2^x = y, y > 0.$$

$$\text{Имеем: } \frac{4}{y} - \frac{y}{2} - 1 = 0; \quad 8 - y^2 - 2y = 0;$$

$$y^2 + 2y - 8 = 0; y_1 = -4; y_2 = 2. \quad y > 0; \quad 2^x = 2; x = 1. \quad \text{Ответ: 1.}$$

$$4.60. 3^{1-x} - 3^x = 2$$

$$\text{Пусть } 3^x = y, y > 0, \text{ тогда } 3^{1-x} = \frac{3}{y}. \quad \text{Получаем:}$$

$$\frac{3}{y} - y - 2 = 0; \quad 3 - y^2 - 2y = 0; \quad y^2 + 2y - 3 = 0,$$

$$y_1 = -3, y_2 = 1; \quad y > 0, \quad 3^x = 1, \quad 3^x = 3^0, \quad x = 0. \quad \text{Ответ: 0.}$$

$$4.61. \frac{1}{2} \cdot 2^{x-1} + 2^{3-x} = 3; \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{2^x}{2} + \frac{2^3}{2^x} - 3 = 0; \quad \frac{2^x}{4} + \frac{8}{2^x} - 3 = 0.$$

Пусть $2^x = y, y > 0$. Тогда:

$$\frac{y}{4} + \frac{8}{y} - 3 = 0; \quad y^2 + 32 - 12y = 0; \quad y^2 - 12y + 32 = 0;$$

$$y_1 = 4, y_2 = 8. \quad 2^x = 4; x = 2; \quad 2^x = 8; x = 3. \quad \text{Ответ: 2; 3.}$$

$$4.62. \frac{1}{27} \cdot 3^{x+2} + 3^{2-x} = 4. \quad \frac{3^x \cdot 9}{27} + \frac{9}{3^x} - 4 = 0; \quad \frac{3^x}{3} + \frac{9}{3^x} - 4 = 0.$$

$$3^x = y, y > 0. \text{ Тогда: } \frac{y}{3} + \frac{9}{y} - 4 = 0; \quad y^2 - 12y + 27 = 0; \quad y_1 = 3, y_2 = 9.$$

$$1) 3^x = 3, x = 1; \quad 2) 3^x = 9, x = 2. \quad \text{Ответ: 1; 2.}$$

$$4.63. 5^x - \left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} = 4; \quad 5^x - 5^{1-x} - 4 = 0; \quad 5^x - \frac{5}{5^x} - 4 = 0.$$

$$\text{Пусть } 5^x = m, m > 0. \text{ Тогда: } m - \frac{5}{m} - 4 = 0; \quad m^2 - 5 - 4m = 0;$$

$$m_1 = -1, m_2 = 5. \quad m > 0; \quad 5^x = 5; \quad x = 1. \quad \text{Ответ: 1.}$$

$$4.64. 8 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^{x+1} - 7^{x-1} = 1.$$

$$8 \cdot \frac{1}{7} \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^x - \left(\frac{1}{7}\right)^{1-x} = 1. \text{ Пусть } \left(\frac{1}{7}\right)^x = y, y > 0. \text{ Тогда:}$$

$$\frac{8y}{7} - \frac{1}{7y} - 1 = 0; \quad 8y^2 - 7y - 1 = 0; \quad D = 49 + 32 = 81,$$

$$y_1 = -\frac{1}{8}, y_2 = 1; \quad \left(\frac{1}{7}\right)^x = 1; \quad \left(\frac{1}{7}\right)^x = \left(\frac{1}{7}\right)^0 = 0. \quad \text{Ответ: 0.}$$

$$4.65. \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^x = 0; \quad \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{2x} \cdot 3^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^x = 0.$$

$$\text{Пусть } y = \left(\frac{1}{3}\right)^x, y > 0. \text{ Имеем: } y(3y - 1) = 0.$$

$$y = 0 \text{ или } y = \frac{1}{3}. \quad \text{Условие } y > 0 \text{ удовлетворяет } y = \frac{1}{3}.$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{1}{3}; \quad x = 1. \quad \text{Ответ: 1.}$$

$$4.66. 9 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^x - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x = 0;$$

$$9 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x = 0. \text{ Пусть } \left(\frac{1}{2}\right)^x = y, y > 0.$$

$$9y^2 - 2y = 0; \quad y(9y - 2) = 0,$$

$$y = 0 \text{ или } y = \frac{2}{9}, y > 0; \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{2}{9}; x = \log_{\frac{1}{2}} \frac{2}{9}.$$

$$\text{Ответ: } \log_{\frac{1}{2}} \frac{2}{9}.$$

4.67. $9^x - 3^{x+1} = 54; 3^{2x} - 3 \cdot 3^x - 54 = 0$. Пусть $3^x = t, t > 0$. Имеем:
 $t^2 - 3t - 54 = 0; t_1 = -6, t_2 = 9; t > 0; 3^x = 9; 3^x = 3^2; x = 2$.

Ответ: 2.

4.68. $3^{x+1} + 2 \cdot 3^{-x-1} - 1 = 0. \frac{3^x}{3} + \frac{2}{3 \cdot 3^x} - 1 = 0$. Пусть $3^x = y, y > 0$.

Тогда: $\frac{y}{3} + \frac{2}{3y} - 1 = 0; y^2 + 2 - 3y = 0; y^2 - 3y + 2 = 0;$

$$y_1 = 1, y_2 = 2.$$

1) $3^x = 1, 3^x = 3^0, x = 0;$ 2) $3^x = 2, x = \log_3 2$. Ответ: 0; $\log_3 2$.

4.69. $2^x \cdot 5^x = 0,1 \cdot 10^{3x^2-1}; 10^x = (0,1)^2 \cdot 10^{3x^2}; 10^2 \cdot 10^x - 10^{3x^2} = 0;$

$$10^{2+x} = 10^{3x^2}; 2+x = 3x^2; 3x^2 - x - 2 = 0; x_1 = -\frac{2}{3}, x_2 = 1.$$

$$\text{Ответ: } -\frac{2}{3}; 1.$$

4.70. $5^{x^2-15} = 25^x; 5^{x^2-15} = 5^{2x}$.

$$x^2 - 15 = 2x; x^2 - 2x - 15 = 0; x_1 = 5; x_2 = -3. \text{ Ответ: } -3; 5.$$

4.71. $0,1^{3x-8-x^2} = 100; 10^{x^2-5x+8} = 10^2; x^2 - 5x + 6 = 0; x_1 = 2, x_2 = 3.$

Ответ: 2; 3.

4.72. $3^{x^2-4x} = 243; 3^{x^2-4x} = 3^5; x^2 - 4x - 5 = 0; x_1 = -1, x_2 = 5.$

Ответ: -1; 5.

4.73. $4^x - 3 \cdot 2^x = 4; 2^{2x} - 3 \cdot 2^x = 4$. Пусть $2^x = y, y > 0$.

$$y^2 - 3y - 4 = 0; y_1 = -1, y_2 = 4. 2^x = 4; 2^x = 2^2, x = 2. \text{ Ответ: } 2.$$

4.74. $9^x + 8 \cdot 3^x = 9; 3^{2x} + 8 \cdot 3^x = 9$. Пусть $3^x = t, t > 0$.

Тогда $t^2 + 8t - 9 = 0; t_1 = -9, t_2 = 1. -9$ не удовлетворяет условию $t > 0$.

$$3^x = 1, 3^x = 3^0, x = 0. \text{ Ответ: } 0.$$

4.75. $2^{2x+1} + 7 \cdot 2^x = 4; 2 \cdot 2^{2x} + 7 \cdot 2^x = 4$. Пусть $2^x = y, y > 0$.

Тогда: $2y^2 + 7y - 4 = 0; D = 49 + 32 = 81; y = \frac{-7 \pm 9}{4}, y_1 = -4, y_2 = \frac{1}{2}.$

$$2^x = \frac{1}{2}, x = -1. \text{ Ответ: } -1.$$

4.76. $3^{2x+1} - 8 \cdot 3^x = 3$. $3 \cdot 3^{2x} - 8 \cdot 3^x - 3 = 0$. Пусть $3^x = t, t > 0$.

Тогда: $3t^2 - 8t - 3 = 0$; $\frac{D}{4} = 16 + 9 = 25$; $t = \frac{4 \pm 5}{3}$; $t_1 = -\frac{1}{3}$, $t_2 = 3$.

$t > 0$. $3^x = 3, x = 1$. Ответ: 1.

4.77. $9^x - 5 \cdot 3^{x+1} + 54 = 0$; $3^{2x} - 15 \cdot 3^x + 54 = 0$; $3^x = 6$ или $3^x = 9$;
 $x = \log_3 6$ или $x = 2$. Ответ: 2; $\log_3 6$.

4.78. $2^{2x+1} - 7 \cdot 2^x + 3 = 0$; $2 \cdot 2^{2x} - 7 \cdot 2^x + 3 = 0$. Пусть $2^x = y, y > 0$.

Тогда: $2y^2 - 7y + 3 = 0$; $D = 49 - 24 = 25$; $y = \frac{7 \pm 5}{4}$; $y_1 = \frac{1}{2}$, $y_2 = 3$.

1) $2^x = \frac{1}{2}$, $x = -1$; 2) $2^x = 3, x = \log_2 3$. Ответ: -1; $\log_2 3$.

4.79. $4^x + 2^x = 12$; $2^{2x} + 2^x - 12 = 0$. Пусть $2^x = y, y > 0$.

Тогда $y^2 + y - 12 = 0$; $y_1 = -4, y_2 = 3$; $y > 0$; $2^x = 3$; $x = \log_2 3$.

Ответ: $\log_2 3$.

4.80. $2^{x^2-1} \cdot 5^{x^2-1} = 0,001(10^{x+2})^3$;


$10^{x^2-1} = 10^{-3} \cdot 10^{3x+6}$; $10^{x^2-1} = 10^{3x+3}$; $x^2 - 1 = 3x + 3$;

$x^2 - 3x - 4 = 0$; $x_1 = -1, x_2 = 4$. Ответ: -1; 4.

4.81. $3^{x^2} \leq 81$; $3^{x^2} \leq 3^4$; т.к. $a = 3 > 1$, то $x^2 \leq 4$; $(x-2)(x+2) \leq 0$;

$-2 \leq x \leq 2$. Ответ: $[-2; 2]$.

4.82. $27^x < 9^{x^2-1}$; $3^{3x} < 3^{2x^2-2}$; $3x < 2x^2 - 2$;

 $2x^2 - 3x - 2 > 0$; $2(x-2)\left(x + \frac{1}{2}\right) > 0$.
 Ответ: $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (2; \infty)$.

4.83. $10^x - 8 \cdot 5^x \geq 0$; $2^x \cdot 5^x - 8 \cdot 5^x \geq 0$; $5^x(2^x - 8) \geq 0$.

Так как $5^x > 0$, то $2^x - 8 \geq 0$; $2^x \geq 2^3$; $x \geq 3$ (т.к. $a = 2 > 1$). Ответ: $[3; \infty)$.

4.84. $3^x - 2 \cdot 6^x > 0$; $3^x(1 - 2 \cdot 2^x) > 0$; $3^x > 0$; $(3^x > 0)$;

$1 - 2 \cdot 2^x > 0$; $2^x < \frac{1}{2}$; $x < -1$, т.к. $a = 2 > 1$. Ответ: $(-\infty; -1)$.

4.85. $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} > 0$;

$\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x > 0$; $\left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\left(\frac{1}{2}\right)^x - 2\right) > 0$; $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 0$;

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}; x < -1, \text{ т.к. } a = \frac{1}{2} < 1. \text{ Ответ: } (-\infty; -1).$$

$$4.86. \frac{1}{16} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{4}\right)^{3x+2} < 0;$$

$$\frac{1}{16} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^x - \frac{1}{16} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{3x} < 0; \left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} > 0; 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{2x} < 0;$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{2x} > 1; \left(\frac{1}{4}\right)^{2x} > \left(\frac{1}{4}\right)^0; 2x < 0; x < 0. \text{ Ответ: } (-\infty; 0).$$

$$4.87. 2^x + 2^{3-x} < 9;$$

$$2^{2x} - 9 \cdot 2^x + 8 < 0;$$

$$(2^x - 1)(2^x - 8) < 0;$$

$$1 < 2^x < 8; 0 < x < 3. \text{ Ответ: } 2.$$



$$4.88. 3^x + 3^{2-x} < 10; 3^x + 3^2 \cdot 3^{-x} - 10 < 0; 3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 < 0;$$

$$(3^x - 1)(3^x - 9) < 0; 1 < 3^x < 9 \Rightarrow 0 < x < 2. \text{ Ответ: } 1$$

$$4.89. \log_7(x^2 - 2x - 8) = 1; \log_7(x^2 - 2x - 8) = \log_7 7; x^2 - 2x - 15 = 0; x_1 = 5, x_2 = -3. \text{ Ответ: } 5; -3.$$

$$4.90. \log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 4x - 5) = -4; \log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 4x - 5) = \log_{\frac{1}{2}} 16;$$

$$x^2 + 4x - 5 = 16; x^2 + 4x - 21 = 0; x = -7 \text{ или } x = 3. \text{ Ответ: } -7; 3.$$

$$4.91. \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 6) = -1; x^2 - 5x + 6 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1};$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0; x = 1 \text{ или } x = 4. \text{ Ответ: } 1; 4.$$

$$4.92. \log_2(x^2 - 4x + 4) = 4; x^2 - 4x + 4 = 2^4; x^2 - 4x - 12 = 0;$$

$$x_1 = 6, x_2 = -2. \text{ Ответ: } -2; 6.$$

$$4.93. \log_4(x^2 + 2x - 8) < 2;$$

$$\log_4(x^2 + 2x - 8) < \log_4 16. \text{ Так как } 4 > 1, \text{ то } \begin{cases} x^2 + 2x - 8 < 16, \\ x^2 + 2x - 8 > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 24 < 0, \\ x^2 + 2x - 8 > 0; \end{cases} \begin{cases} (x+6)(x-4) < 0, \\ (x+4)(x-2) > 0; \end{cases}$$

$$(-6; -4) \cup (2; 4). \text{ Ответ: } -5; 3.$$



$$4.94. \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 6x + 8) \geq -1;$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 6x + 8) \geq \log_{\frac{1}{3}} 3.$$

$$\begin{cases} x^2 - 6x + 8 > 0, & \{(x-2)(x-4) > 0, \\ x^2 - 6x + 8 \leq 3; & \{(x-1)(x-5) \leq 0; \\ x < 2 \text{ или } x > 4, \\ 1 \leq x \leq 5; \end{cases}$$

[1; 2) ∪ (4; 5]. Ответ: 1; 5.

4.95. $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 7x + 10) > -2$;

$$\log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 7x + 10) > \log_{\frac{1}{2}} 4; \quad 0 < \frac{1}{2} < 1;$$

$$\begin{cases} x^2 + 7x + 10 < 4, & \{(x+1)(x+6) < 0, & \{x < -5; x > -2, \\ x^2 + 7x + 10 > 0; & \{(x+2)(x+5) > 0; & \{-6 < x < -1; \end{cases}$$

(-6; -5) ∪ (-2; -1). Ответ: (-6; -5) ∪ (-2; -1).

4.96. $\log_2(x^2 - 13x + 30) < 3$; $\log_2(x^2 - 13x + 30) < \log_2 8$;

$$\begin{cases} x^2 - 13x + 30 < 8, & \text{т.к. } 2 > 1; \\ x^2 - 13x + 30 > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 13x + 22 < 0, & \{(x-2)(x-11) < 0, & \{2 < x < 11, \\ x^2 - 13x + 30 > 0; & \{(x-3)(x-10) > 0; & \{x < 3, \\ & & \{x > 10; \end{cases}$$

Ответ: (2; 3) ∪ (10; 11).

4.97. $\log_3(x^2 - 2x) > 1$;

$$\begin{cases} x^2 - 2x > 0, & \text{(т.к. } a = 3 > 1); \\ x^2 - 2x > 3 \end{cases}$$

$x^2 - 2x - 3 > 0$; $cc(x-3)(x+1) > 0$. Ответ: $(-\infty; -1) \cup (3; \infty)$.

4.98. $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 + x - 3) < -2$;

$$\begin{cases} x^2 + x - 3 > 0, & x^2 + x - 12 > 0; \\ x^2 + x - 3 > 9; \end{cases}$$

$(x+4)(x-3) > 0$; Ответ: $(-\infty; -4) \cup (3; \infty)$.

4.99. $\log_2(x^2 - x - 2) \geq 2$;


$$\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0, \\ x^2 - x - 2 \geq 4 \quad (a = 2 > 1); \end{cases} \quad x^2 - x - 6 \geq 0; \quad (x-3)(x+2) \geq 0;$$



Ответ: $(-\infty; 2] \cup [3; \infty)$.

4.100. $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 11x - 4) \leq -5;$

$$\begin{cases} x^2 - 11x - 4 > 0, \\ x^2 - 11x - 4 \geq 32; \end{cases} \quad x^2 - 11x - 36 \geq 0.$$



Корни уравнения $x^2 - 11x - 36 = 0$: $x_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{265}}{2};$

Ответ: $\left(-\infty; \frac{11 - \sqrt{265}}{2}\right] \cup \left[\frac{11 + \sqrt{265}}{2}; \infty\right)$.

4.101. $3^{3x} + 3^{2x+1} = 3^x + 3;$

$$3^{2x}(3^x + 3) - (3^x + 3) = 0; (3^{2x} - 1)(3^x + 3) = 0;$$

$$3^{2x} = 1 \text{ или } 3^x = -3 - \text{решений нет. } x = 0. \text{ Ответ: } 0.$$

4.102. $5^{4x-1} + 5^{3x+1} = 5^x + 25;$

$$5^x(5^{3x-1} - 1) + 5^2(5^{3x-1} - 1) = 0; (5^{3x-1} - 1)(5^x + 5^2) = 0;$$

$$5^{3x-1} = 1 \text{ или } 5^x + 5^2 = 0 - \text{нет решений.}$$

$$3x - 1 = 0; \quad x = \frac{1}{3}. \quad \text{Ответ: } \frac{1}{3}.$$

4.103. $6^x - 3^x = 2^x - 1; \quad 2^x \cdot 3^x - 3^x = 2^x - 1; \quad 3^x(2^x - 1) = 2^x - 1;$

$$(2^x - 1)(3^x - 1) = 0; \quad 2^x - 1 = 0 \text{ или } 3^x - 1 = 0.$$

$$1) \quad 2^x - 1 = 0; \quad 2^x = 2^0; \quad x = 0; \quad 2) \quad 3^x - 1 = 0; \quad 3^x = 3^0; \quad x = 0. \quad \text{Ответ: } 0.$$

4.104. $6^{x+1} - 18 \cdot 2^x = 3^{x+1} - 9; \quad 6^{x+1} - 3^{x+1} = 18 \cdot 2^x - 9;$

$$3^{x+1}(2^{x+1} - 1) = 9(2^{x+1} - 1); \quad (2^{x+1} - 1)(3^{x+1} - 9) = 0;$$

$$2^{x+1} - 1 = 0 \text{ или } 3^{x+1} - 9 = 0.$$

$$1) \quad 2^{x+1} - 1 = 0; \quad 2^{x+1} = 2^0; \quad x + 1 = 0; \quad x = -1; \quad 2) \quad 3^{x+1} = 3^2; \quad x = 1.$$

Ответ: -1; 1.

4.105. $2^{3x+1} - 2^{2x} = 2^{x+1} - 1; \quad 2^{2x}(2^{x+1} - 1) - (2^{x+1} - 1) = 0;$

$$(2^{2x} - 1)(2^{x+1} - 1) = 0;$$

$$2^{x+1} = 1 \text{ или } 2^{2x} = 1;$$

$$x = -1 \text{ или } x = 0. \quad \text{Ответ: } -1.$$

4.106. $4^{3x} - 4^{2x-1} = 4^{3x+1} - 1; \quad 4^{3x+1}(4^{2x-1} - 1) - (4^{2x-1} - 1) = 0;$

$$4^{3x+1} = 1 \quad \text{или} \quad 4^{2x-1} = 1;$$

$$3x + 1 = 0 \quad \text{или} \quad 2x - 1 = 0;$$

$$x = -\frac{1}{3} \quad \text{или} \quad x = \frac{1}{2}. \quad \text{Ответ: } \frac{1}{2}.$$

StudyPort.ru

$$4.107. \log_5 \frac{1-2x}{x+3} = 1; \log_5 \frac{1-2x}{x+3} = \log_5 5; \frac{1-2x}{x+3} = 5;$$

$$\begin{cases} x+3 \neq 0, \\ 7x = -14; \end{cases} \begin{cases} x \neq -3, \\ x = -2. \end{cases} \quad \text{Ответ: } -2.$$

$$4.108. \log_4 \frac{4+2x}{x-5} = 2; \log_4 \frac{4+2x}{x-5} = \log_4 16; \frac{4+2x}{x-5} = 16;$$

$$\begin{cases} x-5 \neq 0, \\ 14x = 84; \end{cases} \begin{cases} x \neq 5, \\ x = 6. \end{cases} \quad \text{Ответ: } 6.$$

$$4.109. \log_{\frac{1}{4}} \frac{3x+2}{2x-7} = -1; \log_{\frac{1}{4}} \frac{3x+2}{2x-7} = \log_{\frac{1}{4}} 4; \frac{3x+2}{2x-7} = 4;$$

$$\begin{cases} 2x-7 \neq 0, \\ 5x = 30; \end{cases} \begin{cases} x \neq 3,5, \\ x = 6. \end{cases} \quad \text{Ответ: } 6.$$

$$4.110. \log_{\frac{1}{6}} \frac{16-20x}{3x+4} = -2; \log_{\frac{1}{6}} \frac{16-20x}{3x+4} = \log_{\frac{1}{6}} 36;$$

$$\frac{16-20x}{3x+4} = 36; \begin{cases} 4; \\ \frac{4-5x}{3x+4} = 9; \end{cases} \begin{cases} 3x+4 \neq 0, \\ 32x = -32; \end{cases} \begin{cases} x \neq -\frac{4}{3}, \\ x = -1. \end{cases} \quad \text{Ответ: } -1.$$

$$4.111. \frac{6^{x^2}}{3^2} = \frac{2^2}{6^{8-5x}}; \quad 6^{x^2-5x+8} = 6^2; x^2 - 5x + 8 = 2; x^2 - 5x + 6 = 0;$$

$$x = 2 \text{ или } x = 3. \quad \text{Ответ: } 2; 3.$$

$$4.112. \frac{14^{x^2+2}}{2^7} = \frac{7^7}{14^{4x}}; \quad 14^{x^2+4x+2} = 14^7; x^2 + 4x + 2 - 7 = 0;$$

$$x^2 + 4x - 5 = 0; x_1 = -5, x_2 = 1. \quad \text{Ответ: } -5; 1.$$

$$4.113. \frac{10^{x^2}}{2^4} = \frac{5^4}{10^{9-6x}}; \quad 10^{x^2-6x+9} = 10^4; x^2 - 6x + 5 = 0; \begin{cases} x=1, \\ x=5. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } 1; 5.$$

$$4.114. \frac{15^{x^2-16}}{3^2} = \frac{5^2}{15^{8-9x}}; \quad 15^{x^2-16+8-9x} = 15^2; x^2 - 9x - 8 = 2;$$

$$x^2 - 9x - 10 = 0; x_1 = -1, x_2 = 10. \quad \text{Ответ: } -1; 10.$$

$$4.115. \frac{2^{x^2+2}}{6^2} = \frac{6^2}{3^{x^2+2}}; \quad 6^{x^2+2} = 6^4; x^2 - 2 = 0; x = \pm\sqrt{2}.$$

$$\text{Ответ: } -\sqrt{2}; \sqrt{2}.$$

4.116. $\frac{4^{x^2}}{14^x} = \frac{14^{2x}}{7^{2x^2}}$; $14^{2x^2} = 14^{3x}$; $2x^2 = 3x$; $x_1 = 0$, $x_2 = 1,5$.

Ответ: 0; 1,5.

4.117. $\frac{2^{2x^2-6x}}{12^{3-x}} = \frac{12^{1-2x}}{3^{x^2-3x}}$; $12^{x^2-3x} = 12^{4-3x}$; $x^2 = 4$; $x = -2$ или $x = 2$.

Ответ: -2; 2.


4.118. $\frac{3^{x^2+3x}}{21^{2x}} = \frac{21^{2x}}{7^{x^2+3x}}$; $21^{x^2+3x} = 21^{4x}$; $x^2 - x = 0$; $x(x-1) = 0$;

$x = 0$ или $x = 1$. Ответ: 0; 1.

4.119. $\frac{4^x - 2}{1 - 3x} > 0$. 1. $\begin{cases} 4^x - 2 > 0, \\ 1 - 3x > 0. \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 4^x - 2 < 0, \\ 1 - 3x > 0. \end{cases}$

Решим их: 1. $\begin{cases} 2^{2x} > 2, \\ -3x > -1; \end{cases} \begin{cases} x > \frac{1}{2}, \\ x < \frac{1}{3}; \end{cases}$ решений нет;

2. $\begin{cases} 2^{2x} < 2, \\ -3x < -1; \end{cases} \begin{cases} x < \frac{1}{2}, \\ x > \frac{1}{3}; \end{cases} \frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$. Ответ: $(\frac{1}{3}; \frac{1}{2})$.

4.120. $\frac{2^x - 1}{3x + 2} < 0$; $\frac{2^x - 1}{3(x + \frac{2}{3})} < 0$. 

$2^x - 1 = 0$, $x = 0$. Ответ: $(-\frac{2}{3}; 0)$.


4.121. $\frac{27 - 9^x}{4x - 1} > 0$;

$\begin{cases} 27 - 9^x > 0, \\ 4x - 1 > 0 \end{cases}$ или $\begin{cases} 27 - 9^x < 0, \\ 4x - 1 < 0; \end{cases}$
 $\begin{cases} 3^{2x} < 3^3, \\ x > \frac{1}{4} \end{cases}$ или $\begin{cases} x > 1,5, \\ x < \frac{1}{4} \end{cases}$ - решений нет;

$\frac{1}{4} < x < \frac{3}{2}$. Ответ: (0,25; 1,5).

StudyPort.ru

4.122. $\frac{5-25^x}{2(x+2,5)} < 0$. $2x=1$; $x=\frac{1}{2}$. $x+2,5=0$; $x=-2,5$.



Имеем: $\frac{x-0,5}{2(x+2,5)} > 0$.

Ответ: $(-\infty; -2,5) \cup (0,5; \infty)$.

4.123. $\frac{x+4}{\lg x} \geq 0$;

$$\begin{cases} x+4 \geq 0, \\ \lg x > 0, \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x+4 \leq 0, \\ \lg x < 0, \\ x > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -4, \\ x > 1, \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x \leq -4, \\ x < 1, \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{— решений нет; } \quad x > 1. \quad \text{Ответ: } (1; \infty).$$

4.124. $\frac{x+5}{\log_1 x} > 0$.

$$1) \begin{cases} x+5 > 0, \\ \log_1 x > 0, \\ x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > -5, \\ x < 1, \\ x > 0; \end{cases} \quad 0 < x < 1.$$

$$2) \begin{cases} x+5 < 0, \\ \log_1 x < 0, \\ x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -5, \\ x > 1, \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{— решений нет;} \quad \text{Ответ: } (0; 1).$$

4.125. $\frac{x-3}{\log_5 x} \leq 0$.

$$1) \begin{cases} x-3 \geq 0, \\ \log_5 x < 0, \\ x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 3, \\ x < 1, \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{— решений нет;}$$

$$2) \begin{cases} x-3 \leq 0, \\ \log_5 x > 0, \\ x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 3, \\ x > 1, \\ x > 0; \end{cases} \quad 1 < x \leq 3. \quad \text{Ответ: } (1; 3].$$

$$4.126. \frac{3x-1}{\log_{\frac{1}{4}} x} > 0. \quad 1) \begin{cases} 3x-1 > 0, & \begin{cases} x > \frac{1}{3}, \\ x < 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ \log_{\frac{1}{4}} x > 0, & \begin{cases} x < 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ x > 0; \end{cases} \quad \frac{1}{3} < x < 1;$$

$$2) \begin{cases} 3x-1 < 0, & \begin{cases} x < \frac{1}{3}, \\ x > 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ \log_{\frac{1}{4}} x < 0, & \begin{cases} x > 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ x > 0; \end{cases} \quad \text{— решений нет.} \quad \text{Ответ: } \left(\frac{1}{3}; 1\right).$$

$$4.127. \frac{3x-4}{\log_{\frac{1}{2}} x} < 0. \quad 1) \begin{cases} 3x-4 < 0, & \begin{cases} x < \frac{4}{3}, \\ x < 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ \log_{\frac{1}{2}} x > 0, & \begin{cases} x < 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ x > 0; \end{cases} \quad 0 < x < 1;$$

$$2) \begin{cases} 3x-4 > 0, & \begin{cases} x > \frac{4}{3}, \\ x > 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ \log_{\frac{1}{2}} x < 0, & \begin{cases} x > 1, \\ x > \frac{4}{3}, \end{cases} \\ x > 0; \end{cases} \quad \text{Ответ: } (0; 1) \cup \left(\frac{4}{3}; \infty\right).$$

$$4.128. \frac{2x-1}{\lg x} > 0; \quad 1) \begin{cases} 2x-1 > 0, & \begin{cases} x > \frac{1}{2}, \\ x > 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ \lg x > 0, & \begin{cases} x > 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ x > 0; \end{cases} \quad x > 1;$$

$$2) \begin{cases} 2x-1 < 0, & \begin{cases} x < \frac{1}{2}, \\ x < 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ \lg x < 0, & \begin{cases} x < 1, \\ x > 0; \end{cases} \\ x > 0; \end{cases} \quad 0 < x < \frac{1}{2}. \quad \text{Ответ: } \left(0; \frac{1}{2}\right) \cup (1; \infty).$$


$$4.129. \frac{(0,1)^x + 1000}{2x-3} < 0. \quad 2x-3 < 0; \quad x < 1,5. \quad \text{Ответ: } (-\infty; 1,5).$$

$$4.130. \frac{4-(0,5)^x}{x-1} > 0. \quad \begin{array}{c} f(x) \\ \text{+} \quad \text{-} \quad \text{+} \\ \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ \text{-2} \quad \text{1} \quad \text{x} \end{array}$$

Пусть $f(x) = \frac{4-(0,5)^x}{x-1}$;


$D(f) = (-\infty; 1) \cup (1; \infty)$. $4 = (0,5)^x$; $2^2 = 2^{-x}$; $x = -2$; Ответ: $(-\infty; -2) \cup (1; \infty)$.

4.131. $\frac{\lg x + 1}{4x - 1} < 0$.




$\lg x = -1$; $x = 0,1$; $x \in (0,1; 0,25)$. Ответ: (0,1; 0,25).


4.132. $\frac{\log_1 x + 2}{2x + 1} > 0$. Пусть $f(x) = \frac{\log_1 x + 2}{2x + 1}$;



4.133. $\frac{x - 3}{4^x - 1} \leq 0$. Пусть $f(x) = \frac{x - 3}{4^x - 1}$;



4.134. $\frac{x - 9}{2^x - 1} \geq 0$. Пусть $f(x) = \frac{x - 9}{2^x - 1}$; $D(f) = (-\infty; 0) \cup (0; \infty)$.



4.135. $\begin{cases} 27^x = 9^y, \\ 81^x = 3^{y+1}; \end{cases} \begin{cases} 3^{3x} = 3^{2y}, \\ 3^{4x} = 3^{y+1}; \end{cases} \begin{cases} 3x = 2y, \\ 4x = y + 1; \end{cases} \begin{cases} 3x = 8x - 2, \\ y = 4x - 1; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{2}{5}, \\ y = \frac{3}{5}. \end{cases}$

Ответ: (2/5; 3/5).

4.136. $\begin{cases} 16^x = 64^y, \\ 27^{x+1} = 81^{y-1}; \end{cases} \begin{cases} 4^{2x} = 4^{3y}, \\ 3^{3x+3} = 3^{4y-4}; \end{cases} \begin{cases} 2x = 3y, \\ 3x - 4y = -7; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{3}{2}y, \\ 3 \cdot \frac{3}{2}y - 4y = -7; \end{cases}$

$\begin{cases} x = -21, \\ y = -14. \end{cases}$ Ответ: (-21; -14).

$$4.137. \begin{cases} x - y = 8, \\ 2^{x-3y} = 16; \end{cases} \begin{cases} x = 8 + y, \\ 2^{x-3y} = 2^4; \end{cases} \begin{cases} x = 8 + y, \\ x = 3y + 4; \end{cases}$$

$$8 + y = 3y + 4; y = 2, x = 10. \quad \text{Ответ: } (10; 2).$$

$$4.138. \begin{cases} x + y = 3, \\ 5^{x+3y} = \frac{1}{5}; \end{cases} \begin{cases} x + y = 3, \\ x + 3y = -1; \end{cases}$$

$$-2y = 4; y = -2; x = 5. \quad \text{Ответ: } (5; -2).$$

$$4.139. \begin{cases} x + 2y = 3, \\ \frac{4^{x-2.5}}{4^{3y}} = 2; \end{cases} \begin{cases} x + 2y = 3, \\ 2x - 5 = 6y + 1; \end{cases} \begin{cases} x + 2y = 3, \\ x - 3y = 3; \end{cases} \begin{cases} 5y = 0, \\ x = 3y + 3; \end{cases} \begin{cases} y = 0, \\ x = 3. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (3; 0).$$

4.140.

$$\begin{cases} 3x - 2y = -1, \\ \frac{3^{8x}}{3^{3y}} = 9; \end{cases} \begin{cases} 3x - 2y = -1, \\ 3^{8x} = 3^{3y+2}; \end{cases} \begin{cases} -9x + 6y = 3, \\ 16x - 6y = 4; \end{cases} \begin{cases} 7x = 7, \\ 3x - 2y = -1; \end{cases} \begin{cases} x = 1, \\ y = 2. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (1; 2).$$

$$4.141. \begin{cases} y - x = 7, \\ 3^x \cdot 3^{2(y-1)} = 27; \end{cases} \begin{cases} y = x + 7, \\ 3^x \cdot 3^{2(x+6)} = 3^3; \end{cases} \begin{cases} y = x + 7, \\ 3x = -9; \end{cases} \begin{cases} y = 4, \\ x = -3. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (-3; 4).$$

$$4.142. \begin{cases} \frac{y}{3} - \frac{x}{2} = 1, \\ 2^{x^2} \cdot 2^y = 8; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2y - 3x = 6, \\ 2^{x^2+y} = 2^3; \end{cases} \begin{cases} 2y - 3x = 6, \\ x + y = 5; \end{cases} \begin{cases} 2y - 3x = 6, \\ -2y - 2x = -10; \end{cases} \begin{cases} x = 0, 8, \\ y = 5 - 0, 8 = 4, 2. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (0, 8; 4, 2).$$

$$4.143. \begin{cases} 2x + 7y = 1, \\ 2^{x+y} = 4^{x-y+2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 7y = 1, \\ 2^{x+y} = 2^{2(x-y+2)}; \end{cases} \begin{cases} 2x + 7y = 1, \\ x + y = 2x - 2y + 4; \end{cases} \begin{cases} 2x + 7y = 1, \\ -x + 3y = 4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2(3y - 4) + 7y = 1, \\ x = 3y - 4; \end{cases} \begin{cases} 13y = 9, \\ x = 3y - 4; \end{cases} \begin{cases} y = \frac{9}{13}, \\ x = -1\frac{12}{13}. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \left(-1\frac{12}{13}; \frac{9}{13}\right).$$

StudyPort.ru

$$4.144. \begin{cases} 2y - x = 6, \\ 9^{2x+y} = 3^{2-3y}, \end{cases} \begin{cases} x = 2y - 6, \\ 3^{2(2x+y)} = 3^{2-3y}, \end{cases} \begin{cases} x = 2y - 6, \\ 4x + 5y = 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2y - 6, \\ 13y = 26; \end{cases} \begin{cases} x = -2, \\ y = 2. \end{cases} \text{ Ответ: } (-2; 2).$$

$$4.145. \begin{cases} 2x - y = 1, \\ \frac{3^y}{27} = \left(\frac{1}{9}\right)^{x-2}; \end{cases} \begin{cases} 2x - y = 1, \\ 3^{y-3} = 3^{4-2x}; \end{cases} \begin{cases} 2x - y = 1, \\ 2x + y = 7; \end{cases}$$

$$4x = 8; x = 2, \text{ тогда } y = 3. \text{ Ответ: } (2; 3).$$

$$4.146. \begin{cases} x - y = 7, \\ \log_2(2x + y) = 3; \end{cases} \begin{cases} x - y = 7, \\ 2x + y = 8; \end{cases} \begin{cases} 3x = 15, \\ y = x - 7; \end{cases} \begin{cases} x = 5, \\ y = 5 - 7 = -2. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (5; -2).$$

$$4.147. \begin{cases} 3x + 4y = 8, \\ 8 \cdot 2^y = 4^{2x+2.5}; \end{cases} \begin{cases} 3x + 4y = 8, \\ 2^{3+y} = 2^{4x+5}; \end{cases} \begin{cases} 3x + 4y = 8, \\ 4x - y = -2; \end{cases} \begin{cases} 3x + 4y = 8, \\ 16x - 4y = -8; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 19x = 0, \\ y = 4x + 2; \end{cases} \begin{cases} x = 0, \\ y = 2. \end{cases} \text{ Ответ: } (0; 2).$$

$$4.148. \begin{cases} 4x + y = -10, \\ \log_3(3y - x) = 2; \end{cases} \begin{cases} 4x + y = -10, \\ -x + 3y = 9; \end{cases} \begin{cases} 4x + y = -10, \\ -4x + 12y = 36; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x + y = -10, \\ 13y = 26; \end{cases} \begin{cases} x = -3, \\ y = 2. \end{cases} \text{ Ответ: } (-3; 2).$$

$$4.149. \begin{cases} x - y - 7 = 0, \\ \log_3 \frac{x+1}{y} = 2; \end{cases} \begin{cases} x - y - 7 = 0, \\ x + 1 = 9y; \end{cases} \begin{cases} 8y = 8, \\ x = 7 + y; \end{cases} \begin{cases} y = 1, \\ x = 8. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (8; 1).$$

$$4.150. \begin{cases} x + y - 10 = 0, \\ \log_2 \frac{y-1}{x} = 3; \end{cases} \begin{cases} x + y = 10, \\ 8x - y = -1; \end{cases} \begin{cases} 9x = 9, \\ y = 8x + 1; \end{cases} \begin{cases} x = 1, \\ y = 9. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (1; 9).$$

$$4.151. \begin{cases} 3x + y = 3, \\ \log_3(5x + 4y) = \log_3(y + 5); \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + y = 3, \\ 5x + 4y = y + 5; \end{cases} \begin{cases} 3x + y = 3, \\ 5x + 3y = 5; \end{cases} \begin{cases} -4x = -4, \\ y = 3 - 3x; \end{cases} \begin{cases} x = 1, \\ y = 0. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (1; 0).$$

$$4.152. \begin{cases} y - 2x = 2, \\ \log_5(y - x) = \log_5(x + 2); \end{cases} \begin{cases} y - 2x = 2, \\ y - x = x + 2, \\ x + 2 > 0; \end{cases} \begin{cases} y - 2x = 2, \\ y - 2x = 2, \\ x > -2. \end{cases}$$

Решение данной системы – любая пара $(x; 2x + 2)$, где $x > -2$.
 Ответ: $(x; 2x + 2), x > -2$.

$$4.153. \begin{cases} 4x - y = 2, \\ \log_{12} x + \log_{12} 3 = \log_{12}(y + 1); \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - y = 2, \\ 3x = y + 1, \\ x > 0; y > -1; \end{cases} \begin{cases} 4x - y = 2, \\ 3x - 1 = y, \\ x > 0; y > -1; \end{cases} \begin{cases} 4x - 2 = 3x - 1, \\ y = 3x - 1, \\ x > 0; y > -1; \end{cases} \begin{cases} x = 1, \\ y = 2. \end{cases}$$

Ответ: (1; 2).

$$4.154. \begin{cases} x + 4y = 16, \\ \log_7 y - \log_7 4 = \log_7(x + 1); \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 4y = 16, \\ \frac{y}{4} = x + 1, \\ x > -1; y > 0; \end{cases} \begin{cases} x = 16 - 4y, \\ y = 4(16 - 4y) + 4, \\ x > -1; y > 0; \end{cases} \begin{cases} y = 4, \\ x = 0, \\ x > -1; y > 0. \end{cases}$$

Ответ: (0; 4).

$$4.155. \begin{cases} 2x + y = 15, \\ x - 3y = \log_2 144 - \log_2 9; \end{cases} \begin{cases} y = 15 - 2x, \\ x = 3y + \log_2 \frac{144}{9}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 15 - 2x, \\ x = 3(15 - 2x) + \log_2 16; \end{cases} \begin{cases} y = 15 - 2x, \\ x = 45 - 6x + 4; \end{cases} \begin{cases} y = 15 - 2x, \\ x = 7; \end{cases} \begin{cases} y = 1, \\ x = 7. \end{cases}$$

Ответ: (7; 1).

$$4.156. \begin{cases} 2y - 3x = 6, \\ 2x + y = \log_3 135 - \log_3 5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2y - 3x = 6, \\ 2x + y = \log_3 \frac{135}{5}; \end{cases} \begin{cases} 2y - 3x = 6, \\ y = 3 - 2x; \end{cases} \begin{cases} 2(3 - 2x) - 3x = 6, \\ y = 3 - 2x; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6 - 4x - 3x = 6, \\ y = 3 - 2x; \end{cases} \begin{cases} -7x = 0, \\ y = 3 - 2x; \end{cases} \begin{cases} x = 0, \\ y = 3. \end{cases}$$

Ответ: (0; 3).

StudyPort.ru

Производная и ее приложения

4.157. $y' = 4\cos\left(4x - \frac{\pi}{6}\right)$; $y\left(\frac{\pi}{12}\right) = 4\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) = 4\cos\frac{\pi}{6} = 2\sqrt{3}$.

Ответ: $2\sqrt{3}$.

4.158. $y = \ln(2-x)$, $x_0 = -1$; $y' = -\frac{1}{2-x}$; $y'(-1) = -\frac{1}{2+1} = -\frac{1}{3}$.

Ответ: $-\frac{1}{3}$.

4.159. $y' = 2e^{2x-1}$; $y'\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^0 = 2$. Ответ: 2.

4.160. $y' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2x+5}} = \frac{1}{\sqrt{2x+5}}$; $y'(2) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 2 + 5}} = \frac{1}{3}$.

Ответ: $\frac{1}{3}$.

4.161. $y' = e^x \sin x + e^x \cos x + 1$; $y'(0) = e^0 \sin 0 + e^0 \cos 0 + 1 = 2$.

Ответ: 2.

4.162. $y' = \frac{x+1-x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$; $y'(-2) = \frac{1}{(-2+1)^2} = 1$. Ответ: 1.

4.163. $y = x \ln x$, $x_0 = 1$; $y' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$; $y'(1) = \ln 1 + 1 = 1$.

Ответ: 1.

4.164. $y = \frac{\ln x}{x}$, $x_0 = 1$; $y' = \frac{\frac{1}{x} - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$; $y'(1) = \frac{1 - \ln 1}{1} = 1$.

Ответ: 1.

4.165. $y = x - 3x^2$, $x_0 = 2$. $y' = 1 - 6x$, $y'(2) = -10$, $y(2) = -11$;
 $y = -10 - 11(x-2)$, $y = 12 - 11x$. Ответ: $y = -11x + 12$.

4.166. $y = 2 - \frac{x}{2} - x^2$, $x_0 = 0$; $y' = -\frac{1}{2} - 2x$, $y'(0) = -\frac{1}{2}$, $y(0) = 2$.

$y = 2 - \frac{1}{2}(x-0)$, $y = 2 - 0,5x$. Ответ: $y = -0,5x + 2$.

4.167. $y = \sin x$, $x_0 = \pi$, $y' = \cos x$, $y'(\pi) = \cos \pi = -1$, $y(\pi) = \sin \pi = 0$;
 $y = 0 - 1(x - \pi)$, $y = \pi - x$.

Ответ: $y = -x + \pi$.

4.168. $y = \sqrt{x}$, $y_0 = 2$. Тогда $x_0 = 4$;

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y'(4) = \frac{1}{4}, \quad y(4) = 2. \quad y = 2 + \frac{1}{4}(x-4), \quad y = 1 + 0,25x.$$

Ответ: $y = 0,25x + 1$.

4.169. $y = 4x^3$, $y = 12x - 10$; $y' = 12x^2$. $y = 12x - 10$, то $k = 12$;
 $12x^2 = 12$; $x = \pm 1$. $12 \cdot 1 - 10 \neq 4 \cdot 1^3$; $12 \cdot (-1) - 10 \neq 4 \cdot (-1)^3$,
значит не является. Ответ: не является.

4.170. $y = x + 1$, $y = e^x$; $y = e^x$, $y' = e^x$.

Так как уравнение прямой $y = x + 1$, то $k = 1$, значит, $e^x = 1$, $x = 0$.
Уравнение касательной к функции $y = e^x$ в точке $x = 0$: $y = x + 1$

Ответ: является.

4.171. $y = \sin x$, $y = x$; $y = \sin x$, $y' = \cos x$.

Так как уравнение прямой $y = x$, то $k = 1$, значит, $\cos x = 1$,
 $x = 0$ – абсцисса возможной точки касания.

$y = x$, $y(0) = 0$; $y = \sin x$, $y(0) = 0$.

Так как $0 = 0$, то точка $(0; 0)$ является точкой касания прямой
 $y = x$ и графика функции $y = \sin x$. Ответ: является.

4.172. $y = \sqrt{x}$, $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Так как уравнение прямой $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$,

то $k = \frac{1}{2}$, значит, $\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}$; $x = 1$. Составим уравнение

касательной к графику функции $y = \sqrt{x}$ в точке с абсциссой 1:

$$y = 1 + \frac{1}{2}(x-1), \quad y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}. \quad \text{Ответ: является.}$$

4.173. $y = x^3$, $x_0 = 1$. $y' = 3x^2$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 3$. $y = 1 + 3(x-1)$,
 $y = 3x - 2$. Тогда $3x^2 = 3$; $x^2 = 1$; $x_1 = 1$, $x_2 = -1$; $y_1 = 1$, $y_2 = -1$.

Ответ: $y = 3x - 2$; $(-1; -1)$.

4.174. $y = \frac{4}{x}$, $x_0 = 2$; $y' = -\frac{4}{x^2}$, $y'(2) = -1$, $y(2) = 2$.

Уравнение касательной: $y = 2 - 1(x-2)$, $y = 4 - x$, значит, $k = -1$.

Тогда $-\frac{4}{x^2} = -1$; $x = \pm 2$, $y(-2) = -2$, $y(2) = 2$. Ответ: $y = 4 - x$, $(-2; -2)$.

4.175. $y = 1 + \cos x$, $x_0 = \frac{\pi}{2}$; $y' = -\sin x$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Уравнения касательной: $y = 1 - \left(x - \frac{\pi}{2}\right)$, $y = 1 + \frac{\pi}{2} - x$; $k = -1$;

$$\sin x_0 = -1; x_0 = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z, y_0\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1.$$

$$\text{Ответ: } y = 1 + \frac{\pi}{2} - x; x_0 = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, y_0 = 1, n \in Z.$$

$$4.176. y = x + \sin x; x_0 = -\frac{\pi}{2}; y' = 1 + \cos x;$$

$$y'\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1, y\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} - 1. \quad y = -\frac{\pi}{2} - 1 + \left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y = x - 1; k = 1; 1 + \cos x_0 = 1; \cos x_0 = 0; x_0 = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z.$$

$$\begin{cases} y\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) = \frac{\pi}{2} + \pi n + 1, n \in Z - \text{четное,} \\ y\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) = \frac{\pi}{2} + \pi n - 1, n \in Z - \text{нечетное.} \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } y = x - 1, x_0 = \frac{\pi}{2} + \pi n, y_0 = (-1)^n + \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z.$$

$$4.177. y = x + e^{-2x}; y = -x; y' = 1 - 2e^{-2x}.$$

Так как касательная параллельна прямой $y = -x$, то $k = -1$.

$$1 - 2e^{-2x_0} = -1; e^{-2x_0} = 1; x_0 = 0; y'(0) = -1, y(0) = 1.$$

$$y = 1 - 1(x - 0), y = 1 - x. \quad \text{Ответ: } y = 1 - x.$$

$$4.178. y = x - \frac{1}{x^2}, y = 3x; y' = 1 + \frac{2}{x^3}; y(x_0) = 3;$$

$$1 + \frac{2}{x_0^3} = 3, \Rightarrow x_0 = 1; y(1) = 0, \text{ значит уравнение касательной:}$$

$$y = 0 + 3(x - 1). \quad \text{Ответ: } y = 3x - 3.$$

$$4.179. y = 2x - \ln x, y = x; y' = 2 - \frac{1}{x}.$$

Так как касательная параллельна прямой $y = x$, то $k = 1$.

$$2 - \frac{1}{x_0} = 1; x_0 = 1; y'(1) = 1, y(1) = 2. \quad y = 2 + 1(x - 1), y = x + 1.$$

$$\text{Ответ: } y = x + 1.$$

$$4.180. y = 2\sqrt{x} + x; y = 2x; y' = \frac{1}{\sqrt{x}} + 1.$$

Так как касательная параллельна прямой $y = 2x$, то $k = 2$.

$$\frac{1}{\sqrt{x_0}} + 1 = 2; \quad x_0 = 1; \quad y'(1) = 2, \quad y(1) = 3.$$

$$y = 3 + 2(x - 1), \quad y = 2x + 1. \quad \text{Ответ: } y = 2x + 1.$$

4.181. $y = x^2 - 5x; y = -x; y' = 2x - 5$. Так как $y = -x$, то $k = -1$;
 $2x_0 - 5 = -1; x_0 = 2; y_0 = 2^2 - 5 \cdot 2 = -6$. Ответ: (2; -6).

4.182. $y = \sqrt{x}, y = x; y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Так как $y = x$, то $k = 1$;

$$\frac{1}{2\sqrt{x_0}} = 1; \quad x_0 = 0,25; \quad y_0 = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}. \quad \text{Ответ: } (0,25; 0,5).$$

4.183. $y = x^3 - 3x + 1; y' = 3x^2 - 3$. Так как $y = 0$, то $k = 0$.
 $3x_0^2 - 3 = 0; x_0 = \pm 1, y_{01} = (-1)^3 - 3 \cdot (-1) + 1 = 3, y_{02} = -1$.
 Ответ: (-1; 3); (1; -1).

4.184. $y = \frac{1}{x}, y' = -\frac{1}{x^2}, y = -x, k = -1$;

$$-\frac{1}{x_0^2} = -1; \quad x_0 = \pm 1, y_{01} = -1, y_{02} = 1. \quad \text{Ответ: } (-1; -1); (1; 1).$$

4.185. $y = -x^4 + 4x^2 - 3$;
 $y' = -4x^3 + 8x = 4x(2 - x^2)$.

$y' = 0$ при $x = 0$ или $x = \pm\sqrt{2}$. 0;

$\pm\sqrt{2}$ - критические точки.

Ответ: возрастает на $(-\infty; -\sqrt{2}]$ и $[0; \sqrt{2}]$; убывает - $[-\sqrt{2}; 0]$

и $[\sqrt{2}; \infty)$.

4.186. $y = e^x - x; y' = e^x - 1; y' = 0$ при $x = 0$.

Ответ: возрастает на $[0; \infty)$;

убывает на $(-\infty; 0]$.

4.187. $y = \cos x + 2x; D(y) = \mathbb{R}$.

$y' = -\sin x + 2 > 0$, т.е. возрастает. Ответ: возрастает на $(-\infty; \infty)$.




4.188. $y = x + \frac{1}{x}$;

$D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; \infty)$;

$$y' = 1 - \frac{1}{x^2}.$$

$y'(x) = 0$ при $x = \pm 1$.

Ответ: возрастает на $(-\infty; -1]$ и $[1; \infty)$; убывает на $[-1; 0)$ и $(0; 1]$.



StudyPort.ru

4.189. $y = \ln x + \frac{1}{x}$; $D(y) = (0; \infty)$;

y' $-$ $+$ $y' = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$.
 y 0 1 \rightarrow Ответ: возрастает на $[1; \infty)$,
 убывает на $(0; 1]$.

4.190. $y = \frac{2x}{e^x}$;

y' $+$ $-$ $D(y) = R$;
 y 1 \rightarrow $y' = \frac{2e^x - e^x \cdot 2x}{e^{2x}} = \frac{2(1-x)}{e^x}$.

Ответ: возрастает на $(-\infty; 1]$; убывает на $[1; \infty)$.

4.191. $y = 2xe^x$; $D(y) = R$;

y' $-$ $+$ $y' = 2(e^x + xe^x) = 2e^x(1+x)$; $y' = 0$.
 y -1 \rightarrow Ответ: возрастает на $[-1; \infty)$;
 убывает на $(-\infty; -1]$.

4.192. $y = 0,5x + \sin x$; $y' = 0,5 + \cos x$; $y' = 0$; $\cos x = -0,5$.

Промежутки возрастания функции $y = 0,5x + \sin x$:

$$\left[-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \right], k \in Z.$$

Промежутки убывания: $\left[\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{4\pi}{3} + 2\pi k \right], k \in Z.$

Ответ: возрастает на $\left[-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \right],$

убывает на $\left[\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \frac{4\pi}{3} + 2\pi k \right], k \in Z.$

4.193. $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$, $[4; 5]$; $y' = 6x^2 - 6x - 12$;
 $y' = 0$; $x^2 - x - 2 = 0$; $x = -1, x = 2$. $y(4) = 33$; $y(5) = 116$.

Ответ: $\min_{[4;5]} y = 33$, $\max_{[4;5]} y = 116$.

4.194. $y = 2x^3 - 15x^2 + 24x + 3$, $[2; 3]$; $y' = 6x^2 - 30x + 24$;
 $y' = 0$; $x^2 - 5x + 4 = 0$; $x = 1, x = 4$. $y(2) = 7$; $y(3) = -6$.

Ответ: $\min_{[2;3]} y = -6$, $\max_{[2;3]} y = 7$.

4.195. $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 1$, $[-1; 2]$; $y' = 6x^2 + 6x - 12$;
 $y' = 0$; $x^2 + x - 2 = 0$; $x = 1, x = -2$

$$y(-1) = 12; y(1) = -8; y(2) = 3.$$

$$\text{Ответ: } \min_{[-1;2]} y = -8, \max_{[-1;2]} y = 12.$$

$$4.196. y = -x^3 - 3x^2 + 9x - 2, [-2; 2]; y' = -3x^2 - 6x + 9;$$
$$y' = 0: x^2 + 2x - 3 = 0; x = -3; x = 1. y(-2) = -24; y(1) = 3; y(2) = -4.$$

$$\text{Ответ: } \min_{[-2;2]} y = -24, \max_{[-2;2]} y = 3.$$

$$4.197. y = 2x^3 + 3x^2 + 2, [-2; 1]; y' = 6x^2 + 6x;$$
$$y' = 0: x^2 + x = 0; x = 0, x = -1. y(-2) = -2; y(-1) = 3; y(0) = 2; y(1) = 7.$$

$$\text{Ответ: } \min_{[-2;1]} y = -2, \max_{[-2;1]} y = 7.$$

$$4.198. y = -x^3 + 3x^2 + 4, [-3; 3]; y' = -3x^2 + 6x;$$
$$y' = 0: x^2 - 2x = 0; x = 0, x = 2. y(-3) = 58; y(0) = 4; y(2) = 8; y(3) = 4.$$

$$\text{Ответ: } \min_{[-3;3]} y = 4, \max_{[-3;3]} y = 58.$$

$$4.199. y = 2x^3 - 9x^2 - 3, [-1; 4]; y' = 6x^2 - 18x; y' = 0: x^2 - 3x = 0;$$
$$x = 0, x = 3. y(-1) = -14; y(0) = -3; y(3) = -30; y(4) = -19.$$

$$\text{Ответ: } \min_{[-1;4]} y = -30, \max_{[-1;4]} y = -3.$$

$$4.200. y = x^3 - 3x^2 - 9x - 4, [-4; 4]; y' = 3x^2 - 6x - 9; y' = 0: x^2 - 2x - 3 = 0;$$
$$x = 3, x = -1; y(-4) = -80; y(-1) = 1; y(3) = -31; y(4) = -24.$$

$$\text{Ответ: } \min_{[-4;4]} y = -80, \max_{[-4;4]} y = 1.$$

StudyPort.ru

Раздел 5. Задание 8 для экзамена
«Алгебра и начала анализа»

Тригонометрия

5.1. $-\sin \frac{x}{2} = \cos x$, $\cos x + \sin \frac{x}{2} = 0$; $2\sin^2 \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} - 1 = 0$.

Пусть $\sin \frac{x}{2} = t$. Имеем: $2t^2 - t - 1 = 0$. $D = 1 + 8 = 9$;

$$t_{1,2} = \frac{1 \pm 3}{4}, \quad t_1 = 1; \quad t_2 = -\frac{1}{2}.$$

1) $\sin \frac{x}{2} = 1$, $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = \pi + 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2) $\sin \frac{x}{2} = -\frac{1}{2}$, $\frac{x}{2} = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;

$x = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\pi + 4\pi n$, $(-1)^{n+1} \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

5.2. $\cos \frac{x}{2} + 2\cos^2 \frac{x}{2} - 1 = 0$; $2\cos^2 \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} - 1 = 0$.

Пусть $\cos \frac{x}{2} = t$. Тогда: $2t^2 + t - 1 = 0$. $D = 1 + 8 = 9 > 0$.

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{4}, \quad t_1 = -1, \quad t_2 = \frac{1}{2}.$$

1) $\cos \frac{x}{2} = -1$, $\frac{x}{2} = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = 2\pi + 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

2) $\cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$, $\frac{x}{2} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $2\pi + 4\pi n$, $\pm \frac{2\pi}{3} + 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

5.3. $3\cos 2x = 4 - 11\cos x$; $3(2\cos^2 x - 1) - 4 + 11\cos x = 0$;
 $6\cos^2 x - 3 - 4 + 11\cos x = 0$; $6\cos^2 x + 11\cos x - 7 = 0$.

Пусть $\cos x = t$. Тогда $6t^2 + 11t - 7 = 0$; $D = 121 + 168 = 289 > 0$,

$$t_{1,2} = \frac{-11 \pm 17}{12}; \quad t_1 = -\frac{7}{3}; \quad t_2 = \frac{1}{2}.$$

1) $\cos x = -\frac{7}{3}$; решений нет, т.к. $|\cos x| \leq 1$;

2) $\cos x = \frac{1}{2}$, $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

5.4. $\cos^2 6x - \sin^2 3x - 1 = 0$. $(1 - 2\sin^2 3x)^2 - \sin^2 3x - 1 = 0$,
 $1 - 4\sin^2 3x + 4\sin^4 3x - \sin^2 3x - 1 = 0$; $4\sin^4 3x - 5\sin^2 3x = 0$;
 $\sin^2 3x(4\sin^2 3x - 5) = 0$; $4\sin^2 3x - 5 \neq 0$. Значит, $\sin^2 3x = 0$; $\sin 3x = 0$;

$3x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$.

5.5. $\sin x = 1 + \frac{1}{x^2 + 1}$; $-1 \leq \sin x \leq 1$, а $1 + \frac{1}{x^2 + 1} > 1$ при всех значениях x . Ответ: решений нет.

5.6. $\cos x = x^2 + 1$; Т.к. $-1 \leq \cos x \leq 1$, а $x^2 + 1 \geq 1$ при всех значениях x , то $\cos x = x^2 + 1$ при одновременном выполнении двух условий: $\cos x = 1$ и $x^2 + 1 = 1$. $x^2 + 1 = 1$ при $x = 0$.

Если $x = 0$, то $\cos x = \cos 0 = 1$. Ответ: 0.

5.7. $\cos x = 1 + |x|$; Т.к. $-1 \leq \cos x \leq 1$, а $1 + |x| \geq 1$ при всех значениях x , то $\cos x = 1 + |x|$ при одновременном выполнении двух условий: $\cos x = 1$ и $1 + |x| = 1$. Второе условие выполняется при $x = 0$.

Если $x = 0$, то $\cos x = \cos 0 = 1$. Ответ: 0.

5.8. $\sin x = 1 + 2^x$; Т.к. $-1 \leq \sin x \leq 1$, а $1 + 2^x > 1$ при всех значениях x , т.к. $2^x > 0$. Одновременно эти условия не выполняются, т.е. уравнение решений не имеет. Ответ: решений нет.

5.9. $2\cos^2 4x - 6\cos^2 2x + 1 = 0$; $2(2\cos^2 2x - 1)^2 - 6\cos^2 2x + 1 = 0$;

$2(4\cos^4 2x - 4\cos^2 2x + 1) - 6\cos^2 2x + 1 = 0$;

$8\cos^4 2x - 8\cos^2 2x + 2 - 6\cos^2 2x + 1 = 0$; $8\cos^4 2x - 14\cos^2 2x + 3 = 0$.

Пусть $\cos^2 2x = t$. Тогда: $8t^2 - 14t + 3 = 0$. $\frac{D}{4} = 49 - 24 = 25 > 0$.

$t_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{8}$; $t_1 = \frac{3}{2}$; $t_2 = \frac{1}{4}$. $\cos^2 2x = \frac{1}{4}$; $\cos 2x = \pm \frac{1}{2}$;

$2x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$;

Ответ: $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n$, $\pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

5.10. $-2\sin x + 5\sin 2x = 0$; $5 \cdot 2\sin x \cdot \cos x - 2\sin x = 0$;

$2\sin x(5\cos x - 1) = 0$;

$\sin x = 0$ или $5\cos x - 1 = 0$;

$$x = \pi, n \in Z \text{ или } \cos x = \frac{1}{5}; x = \pi, n \in Z \text{ или}$$

$$x = \pm \arccos \frac{1}{5} + 2\pi n, n \in Z. \text{ Ответ: } \pi, \pm \arccos \frac{1}{5} + 2\pi n, n \in Z.$$

5.11. $2\cos 2x - 3\cos x + 2 = 0; 2(2\cos^2 x - 1) - 3\cos x + 2 = 0;$
 $4\cos^2 x - 2 - 3\cos x + 2 = 0; \cos^2 x - 3\cos x = 0; \cos x \cdot (4\cos x - 3) = 0,$
 $\cos x = 0 \text{ или } \cos x = \frac{3}{4};$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z \text{ или } x = \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi n, n \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{2} + \pi n, \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi n, n \in Z.$$

5.12. $2\sin x + 3\cos 2x - 3 = 0; 2\sin x + 3(1 - 2\sin^2 x) - 3 = 0;$
 $2\sin x + 3 - 6\sin^2 x - 3 = 0; 3\sin^2 x - \sin x = 0; \sin x(3\sin x - 1) = 0;$

$$\sin x = 0 \text{ или } \sin x = \frac{1}{3}; x = \pi, n \in Z \text{ или}$$

$$x = (-1)^n \arcsin \frac{1}{3} + \pi n, n \in Z. \text{ Ответ: } \pi, (-1)^n \arcsin \frac{1}{3} + \pi n, n \in Z.$$

5.13. $6\sin^2 x + \sin x \cos x - \cos^2 x = 0; \cos x \neq 0. 6\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 1 = 0.$
 Пусть $\operatorname{tg} x = t$. Тогда: $6t^2 + t - 1 = 0; D = 1 + 24 = 25;$

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm 5}{12}; t_1 = \frac{1}{3}; t_2 = -\frac{1}{2}.$$

1) $\operatorname{tg} x = \frac{1}{3}; x = \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \pi n, n \in Z;$

2) $\operatorname{tg} x = -\frac{1}{2}; x = -\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, n \in Z.$

$$\text{Ответ: } -\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \pi n, n \in Z.$$

5.14. $\sin^2 x - 2\sin x \cos x = 3\cos^2 x; \sin^2 x - 2\sin x \cos x - 3\cos^2 x = 0;$
 $\cos x \neq 0; \operatorname{tg}^2 x - 2\operatorname{tg} x - 3 = 0.$ Пусть $\operatorname{tg} x = t$.
 Имеем: $t^2 - 2t - 3 = 0; t_1 = 3, t_2 = -1.$

1) $\operatorname{tg} x = 3; x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n, n \in Z;$

2) $\operatorname{tg} x = -1; x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z.$

$$\text{Ответ: } -\frac{\pi}{4} + \pi n, \operatorname{arctg} 3 + \pi n, n \in Z.$$

$$5.15. \begin{cases} y + \sin x = 5, \\ 4y + 2\sin x = 19, \end{cases} \cdot (-2); \quad + \begin{cases} -2y - 2\sin x = -10, \\ 4y + 2\sin x = 19. \end{cases}$$

$2y = 9, y = 4,5$. Тогда: $4,5 + \sin x = 5; \sin x = 0,5$;

$$x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z. \quad \text{Ответ: } \left((-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n; 4,5 \right), n \in Z.$$

$$5.16. \begin{cases} 3y + 2\operatorname{tg} x = 4 \cdot 3, \\ 2y + 3\operatorname{tg} x = 1 \end{cases} \cdot (-2); \quad + \begin{cases} 9y + 6\operatorname{tg} x = 12, \\ -4y - 6\operatorname{tg} x = -2. \end{cases}$$

$5y = 10; y = 2$. Решим уравнение:

$$3 \cdot 2 + 2\operatorname{tg} x = 4; 2\operatorname{tg} x = -2; \operatorname{tg} x = -1; x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \left(-\frac{\pi}{4} + \pi n; 2 \right), n \in Z.$$

$$5.17. \begin{cases} 4y + \sqrt{3} \cos x = -\frac{1}{2}, \\ 28y + 4\sqrt{3} \cos x = 1; \end{cases} \cdot (-4) \quad + \begin{cases} -16y - 4\sqrt{3} \cos x = 2, \\ 28y + 4\sqrt{3} \cos x = 1; \end{cases}$$

$$12y = 3; \quad y = \frac{1}{4}.$$

$$4 \cdot \frac{1}{4} + \sqrt{3} \cos x = -\frac{1}{2}; \quad 1 + \sqrt{3} \cos x = -\frac{1}{2}; \quad \sqrt{3} \cos x = -\frac{3}{2};$$

$$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x = \pm \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) + 2\pi n, n \in Z; \quad x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \left(\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \frac{1}{4} \right), n \in Z.$$

$$5.18. \begin{cases} 2\sqrt{3} \sin x - 8y = -1, \\ \sqrt{3} \sin x - 7y = \frac{1}{4}; \end{cases} \cdot (-2) \quad + \begin{cases} 2\sqrt{3} \sin x - 8y = -1, \\ -2\sqrt{3} \sin x + 14y = -\frac{1}{2}; \end{cases}$$

$$6y = -\frac{3}{2}; \quad y = -\frac{1}{4}.$$

$$2\sqrt{3} \sin x - 8 \cdot \left(-\frac{1}{4} \right) = -1; \quad 2\sqrt{3} \sin x = -3; \quad \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$x = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in Z. \quad \text{Ответ: } \left((-1)^{n+1} \frac{\pi}{3} + \pi n; -\frac{1}{4} \right), n \in Z.$$

- 5.19. $\cos x < x^2 + 1$; $-1 \leq \cos x \leq 1$, $x^2 + 1 \geq 1$. Ответ: $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$.
- 5.20. $-1 \leq \cos x \leq 1$, $1 + |x| \geq 1$ при всех значениях x . Ответ: $(-\infty; \infty)$.
- 5.21. $\cos x \leq 1 + 3^x$; $-1 \leq \cos x \leq 1$, $1 + 3^x > 1$ при $x \in \mathbb{R}$. Ответ: $(-\infty; \infty)$.
- 5.22. $\cos x \geq x^2 + 1$; $-1 \leq \cos x \leq 1$, $x^2 + 1 \geq 1$. Данное неравенство выполняется только при $x = 0$. Ответ: 0.
- 5.23. $\cos x \geq 1 + |x|$; $-1 \leq \cos x \leq 1$, $1 + |x| \geq 1$. Значит, данному неравенству удовлетворяет только $x = 0$. Ответ: 0.
- 5.24. $\cos x \geq 1 + 2^x$; $-1 \leq \cos x \leq 1$, $1 + 2^x > 1$. Значит, данное неравенство решений не имеет. Ответ: решений нет.
- 5.25. $\cos x < 1 + \frac{1}{2 - \sin^2 x}$; $-1 \leq \cos x \leq 1$, $1 + \frac{1}{2 - \sin^2 x} \geq \frac{1}{2}$ при всех значениях x . Ответ: $(-\infty; \infty)$.
- 5.26. $\cos x > 1 + \frac{1}{1 + x^4}$; $-1 \leq \cos x \leq 1$, $1 + \frac{1}{1 + x^4} > 1$ при всех значениях x . Ответ: нет решений.

Иррациональные уравнения

- 5.27. $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} - \sqrt{x^2 - 3x + 2} = 0$; $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$.
 $(\sqrt{2x^2 - 3x + 1})^2 = (\sqrt{x^2 - 3x + 2})^2$; $2x^2 - 3x + 1 = x^2 - 3x + 2$;
 $x^2 = 1$; $x_1 = -1$, $x_2 = 1$. $x = -1$ $\sqrt{x^2 - 3x + 2} = \sqrt{1 + 3 + 2} = \sqrt{6}$;
при $x = 1$ $x^2 - 3x + 2 = 1 - 3 + 2 = 0 \geq 0$. Ответ: -1; 1.
- 5.28. $\sqrt{3x^2 - 4x - 2} = \sqrt{2x^2 - 2x + 1}$; $3x^2 - 4x - 2 = 2x^2 - 2x + 1$;
 $x^2 - 2x - 3 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -1$;
при $x = 3$ $2x^2 - 2x + 1 = 18 - 6 + 1 = 13 > 0$;
при $x = -1$ $2x^2 - 2x + 1 = 2 + 2 + 1 = 5 > 0$. Ответ: -1; 3.
- 5.29. $\sqrt{3x^2 - 2x - 2} = \sqrt{4x^2 - 5x}$;
 $3x^2 - 2x - 2 = 4x^2 - 5x$; $x^2 - 3x + 2 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = 1$
при $x = 2$ $4x^2 - 5x = 16 - 10 = 6 > 0$;
при $x = 1$ $4x^2 - 5x = 4 - 5 = -1 < 0$; Ответ: 2.
- 5.30. $\sqrt{3x^2 - 2x + 1} = \sqrt{2x^2 - 6x + 13}$;
 $3x^2 - 2x + 1 = 2x^2 - 6x + 13$; $x^2 + 4x - 12 = 0$; $x_1 = -6$; $x_2 = 2$
1) при $x = -6$; $2x^2 - 6x + 13 = 72 + 36 + 13 = 121 < 0$;

2) при $x = 2$; $2x^2 - 6x + 13 = 8 - 12 + 13 = 9 > 0$ $3 = 3$. Ответ: 2.

5.31. $\sqrt{2x^2 - 5x + 1} = \sqrt{x^2 - 2x - 1}$;

$2x^2 - 5x + 1 = x^2 - 2x - 1$; $x^2 - 3x + 2 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = 1$.

При $x = 2$ и при $x = 1$ получим отрицательные подкоренные выражения. Ответ: корней нет.

5.32. $\sqrt{3x^2 - 4x - 1} = \sqrt{2x^2 - 5x - 3}$; $3x^2 - 4x - 1 = 2x^2 - 5x - 3$;

$x^2 + x + 2 = 0$; $D = 1 - 8 < 0$ — решений нет. Ответ: решений нет.

5.33. $\sqrt{x^2 - x + 3} = \sqrt{3x^2 - 5x + 6}$; $x^2 - x + 3 = 3x^2 - 5x + 6$;

$2x^2 - 4x + 3 = 0$. $D = 16 - 24 < 0$ — решений нет. Ответ: решений нет.

5.34. $\sqrt{x^2 - 2x - 4} = \sqrt{2x^2 - 6x - 1}$; $x^2 - 2x - 4 = 2x^2 - 6x - 1$;

$x^2 - 4x + 3 = 0$; $x_1 = 1$, $x_2 = 3$. При $x = 1$ и $x = 3$ получим отрицательные значения подкоренных выражений. Ответ: решений нет.

5.35. $3x + 1 = \sqrt{1 - x}$; $\begin{cases} (3x + 1)^2 = 1 - x, \\ 3x + 1 \geq 0; \end{cases}$ $\begin{cases} 9x^2 + 6x + 1 - 1 - x = 0, \\ 3x \geq -1; \end{cases}$

$\begin{cases} 9x^2 + 7x = 0, \\ x \geq -\frac{1}{3}; \end{cases}$ $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x \geq -\frac{1}{3}; \end{cases}$ $x_2 = -\frac{7}{9}$, $x = 0$. Ответ: 0.

5.36. $8 - 3x = \sqrt{x + 2}$;

$\begin{cases} (8 - 3x)^2 = x + 2, \\ 8 - 3x \geq 0; \end{cases}$ $\begin{cases} 64 - 48x + 9x^2 = x + 2, \\ -3x \geq -8; \end{cases}$ $\begin{cases} 9x^2 - 49x + 62 = 0, \\ x \leq \frac{8}{3}. \end{cases}$

Решим уравнение: $9x^2 - 49x + 62 = 0$, $D = 2401 - 2232 = 169 > 0$,

$x_1 = 3\frac{4}{9}$, $x_2 = 2$. Условию $x \leq \frac{8}{3}$ удовлетворяет $x = 2$. Ответ: 2.

5.37. $8 - 2x = \sqrt{x + 1}$;

$\begin{cases} (8 - 2x)^2 = x + 1, \\ 8 - 2x \geq 0; \end{cases}$ $\begin{cases} 64 - 32x + 4x^2 = x + 1, \\ -2x \geq -8; \end{cases}$ $\begin{cases} 4x^2 - 33x + 63 = 0, \\ x \leq 4. \end{cases}$

$D = 1089 - 1008 = 81 > 0$; $x_1 = \frac{33 - 9}{8}$, $x_2 = \frac{33 + 9}{8}$;

$x_1 = 3$, $x_2 = 5\frac{1}{4}$. Условию $x \leq 4$ удовлетворяет $x = 3$. Ответ: 3.

5.38. $x - 2 = \sqrt{2 - x}$; $(x - 2)^2 = (\sqrt{2 - x})^2$, $x^2 - 4x + 4 = 2 - x$;
 $x^2 - 3x + 2 = 0$; $x_1 = 1, x_2 = 2$;
 при $x = 1$ $1 - 2 \neq \sqrt{2 - 1}$; при $x = 2$ $2 - 2 = \sqrt{2 - 2}$. Ответ: 2.

5.39. $\sqrt{4 - 6x - x^2} = x + 4$; $4 - 6x - x^2 = (x + 4)^2$; $2x^2 + 14x + 12 = 0$;
 $x^2 + 7x + 6 = 0$; $x_1 = -1, x_2 = -6$. 1) при $x = -1$ $x + 4 > 0$;
 2) при $x = -6$; $x + 4 < 0$ т.е. решений нет. Ответ: -1.

5.40. $\sqrt{8 - 6x - x^2} - x = 6$; $\sqrt{8 - 6x - x^2} = 6 + x$;
 $\begin{cases} 8 - 6x - x^2 = 36 + 12x + x^2, & \begin{cases} 2x^2 + 18x + 28 = 0, \\ x \geq -6; \end{cases} \\ 6 + x \geq 0; \end{cases}$
 $\begin{cases} x^2 + 9x + 14 = 0, & \begin{cases} x_1 = -2, x_2 = -7, \\ x \geq -6. \end{cases} \end{cases}$ Ответ: -2.

5.41. $\sqrt{6 - 4x - x^2} = x + 4$; $6 - 4x - x^2 = x^2 + 8x + 16$;
 $2x^2 + 12x + 10 = 0$; $x^2 + 6x + 5 = 0$; $x_1 = -1; x_2 = -5$
 при $x = -1$; $x + 4 > 0$; при $x = -5$; $x + 4 < 0$, т.е. решений нет.
 Ответ: -1.

5.42. $\sqrt{1 + 4x - x^2} = x - 1$;
 $\begin{cases} 1 + 4x - x^2 = x^2 - 2x + 1, & \begin{cases} 2x^2 - 6x = 0, & \begin{cases} x^2 - 3x = 0, \\ x \geq 1; \end{cases} \\ x - 1 \geq 0; \end{cases} \end{cases}$
 $\begin{cases} x(x - 3) = 0, & \begin{cases} x = 0, & x - 3 = 0, \\ x \geq 1; \end{cases} \end{cases}$ $x = 3$. Ответ: 3.

5.43. $\sqrt{3x^2 - 4x + 2} = 2x - 3$;
 $\begin{cases} 3x^2 - 4x + 2 = 4x^2 - 12x + 9, & \begin{cases} x^2 - 8x + 7 = 0, & \begin{cases} x = 1, & x = 7, \\ x \geq \frac{3}{2}; \end{cases} \\ 2x - 3 \geq 0; \end{cases} \end{cases}$
 $x = 7$. Ответ: 7.

5.44. $\sqrt{4 + 2x - x^2} = x - 2$;
 $\begin{cases} 4 + 2x - x^2 = x^2 - 4x + 4, & \begin{cases} 2x^2 - 6x = 0, \\ x - 2 \geq 0; \end{cases} \end{cases}$
 $\begin{cases} 2x(x - 3) = 0, & \begin{cases} x = 0, \\ x = 3. \end{cases} \end{cases}$ Значит, $x = 3$. Ответ: 3.

5.45. $2\sqrt{x+5} = x+2$;

$$\begin{cases} (2\sqrt{x+5})^2 = (x+2)^2, \\ x+2 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} 4(x+5) = x^2 + 4x + 4, \\ x \geq -2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x+20 = x^2 + 4x + 4, \\ x \geq -2; \end{cases} \begin{cases} x^2 = 16, \\ x \geq -2; \end{cases} \begin{cases} x = -4, \\ x = 4, \\ x \geq -2. \end{cases} \quad \text{Ответ: 4.}$$

5.46.

$$2\sqrt{x^2+8} = 2x+1; \begin{cases} (2\sqrt{x^2+8})^2 = (2x+1)^2, \\ 2x+1 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} 4(x^2+8) = 4x^2 + 4x + 1, \\ 2x \geq -1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x^2 + 32 = 4x^2 + 4x + 1, \\ x \geq -\frac{1}{2}; \end{cases} \begin{cases} 4x = 31, \\ x \geq -\frac{1}{2}; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{31}{4}, \\ x \geq -\frac{1}{2}. \end{cases} \quad \text{Ответ: 7,75}$$

5.47. $4\sqrt{x+6} = x+1$; $\begin{cases} (4\sqrt{x+6})^2 = (x+1)^2, \\ x+1 \geq 0; \end{cases}$

$$\begin{cases} 16x+96 = x^2 + 2x + 1, \\ x \geq -1; \end{cases} \begin{cases} x^2 - 14x - 95 = 0, \\ x \geq -1; \end{cases} \begin{cases} x = -5, \\ x = 19, \\ x \geq -1. \end{cases} \quad \text{Ответ: 19.}$$

5.48. $2\sqrt{5-x^2} = x-1$; $\begin{cases} (2\sqrt{5-x^2})^2 = (x-1)^2, \\ x-1 \geq 0; \end{cases}$

$$\begin{cases} 4(5-x^2) = x^2 - 2x + 1, \\ x \geq 1; \end{cases} \begin{cases} 5x^2 - 2x - 19 = 0, \\ x \geq 1. \end{cases}$$

$$\frac{D}{4} = 1 + 95 = 96 > 0; \sqrt{96} = 4\sqrt{6}. \quad x_1 = \frac{1-4\sqrt{6}}{5}, \quad x_2 = \frac{1+4\sqrt{6}}{5},$$

$x_1 < 1, x_2 > 1$. Ответ: $\frac{1+4\sqrt{6}}{5}$.

5.49. $\begin{cases} \sqrt{x+3y+6} = 2, \\ \sqrt{2x-y+2} = 1. \end{cases} \begin{cases} x+3y+6 = 4, \\ 2x-y+2 = 1; \end{cases} \begin{cases} x+3y = -2, \\ 2x-y = -1. \end{cases}$

$$\begin{cases} x+3y=-2, \\ 6x-3y=-3; \end{cases}$$

$$7x = -5;$$

$$y = 2x + 1 = 1 - \frac{10}{7} = -\frac{3}{7}.$$

Проверка: 1) $-\frac{5}{7} - \frac{9}{7} + 6 > 0$. 2) $2 \cdot \left(-\frac{5}{7}\right) + \frac{9}{7} + 2 > 0$.

Ответ: $\left(-\frac{5}{7}; -\frac{3}{7}\right)$.

5.50. $\begin{cases} \sqrt{x+y-3}=1, & \begin{cases} x+y-3=1, \\ 3x-2y+1=4; \end{cases} & \begin{cases} x+y=4, \\ 3x-2y=3. \end{cases} \end{cases}$

$$\begin{cases} 2x+2y=8, \\ 3x-2y=3; \end{cases}$$

$$5x = 11; \quad x = \frac{11}{5}.$$

$$y = 4 - x = \frac{9}{5}, \quad x = \frac{11}{5}, \quad y = \frac{9}{5}: \quad 1) \sqrt{\frac{11}{5} + \frac{9}{5} - 3} = \sqrt{4-3} = 1,$$

$$2) \sqrt{3 \cdot \frac{11}{5} - 2 \cdot \frac{9}{5} + 1} = \sqrt{3+1} = 2, \quad \text{Ответ: } \left(\frac{11}{5}; \frac{9}{5}\right).$$

5.51. $\begin{cases} \sqrt{2x-3y+2}=3, & \begin{cases} 2x-3y+2=9, \\ \sqrt{3x+2y-5}=2. \end{cases} & \begin{cases} 2x-3y=7, \\ 3x+2y=9. \end{cases} \end{cases}$

$$\begin{cases} 2x-3y=7, | :2 \\ 3x+2y=9, | :3 \end{cases} + \begin{cases} 4x-6y=14, \\ 9x+6y=27; \end{cases} \quad x = \frac{41}{13}, \quad y = \frac{2x-7}{3} = \frac{\frac{82}{13}-7}{3} = -\frac{3}{13}.$$

$$2) \sqrt{\frac{123}{13} - \frac{6}{13} - 5} = \sqrt{9-5} = 2. \quad \text{Ответ: } \left(\frac{41}{13}; -\frac{3}{13}\right).$$

5.52. $\begin{cases} \sqrt{3y-2x-2}=1, \\ \sqrt{4x-2y+3}=2. \end{cases}$

$$\begin{cases} 3y-2x-2=1, & \begin{cases} 3y-2x=3, \\ 4x-2y+3=4; \end{cases} & \begin{cases} -2x+3y=3, \\ 4x-2y=1; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4x + 6y = 6, \\ 4x - 2y = 1; \end{cases}; \quad x = \frac{2y+1}{4} = \frac{9}{8}; \quad x = \frac{9}{8};$$

$$4y = 7; \Rightarrow y = \frac{7}{4}$$

при $x = \frac{9}{8}$; $y = \frac{7}{4}$ имеем:

$$1) \sqrt{3 \cdot \frac{7}{4} - 2 \cdot \frac{9}{8} - 2} = \sqrt{\frac{21}{4} - \frac{9}{4} - 2} = \sqrt{3 - 2} = 1,$$

$$2) \sqrt{4 \cdot \frac{9}{8} - 2 \cdot \frac{7}{4} + 3} = \sqrt{\frac{9}{2} - \frac{7}{2} + 3} = \sqrt{1 + 3} = 2. \text{ Ответ: } \left(\frac{1}{8}; \frac{3}{4} \right).$$

5.53. $y = \frac{1}{2}x + 5$ и $y = \sqrt{1 - 2x}$. $\sqrt{1 - 2x} = \frac{1}{2}x + 5$.

$$\begin{cases} (\sqrt{1 - 2x})^2 = \left(\frac{1}{2}x + 5\right)^2, & \begin{cases} 1 - 2x = \frac{1}{4}x^2 + 5x + 25, \\ \frac{1}{2}x + 5 \geq 0; \end{cases} \\ \frac{1}{2}x + 5 \geq 0; & \begin{cases} \frac{1}{2}x \geq -5; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x^2 + 7x + 24 = 0, & \begin{cases} x_1 = -4, \quad x_2 = -24, \\ x \geq -10; \end{cases} & y = \frac{1}{2} \cdot (-4) + 5; \end{cases}$$

Ответ: $x = -4, y = 3$.

5.54. $y = 2x - 7$ и $y = \sqrt{2x - 1}$. $2x - 7 = \sqrt{2x - 1}$;

$$\begin{cases} (2x - 7)^2 = (\sqrt{2x - 1})^2, & \begin{cases} 4x^2 - 28x + 49 = 2x - 1, \\ 2x - 7 \geq 0; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x^2 - 30x + 50 = 0, & \begin{cases} 2x^2 - 15x + 25 = 0, & \begin{cases} x_1 = 2,5; \quad x_2 = 5, \\ x \geq 3,5; \end{cases} \end{cases} \\ x \geq \frac{7}{2}; & \begin{cases} x \geq 3,5; \end{cases} \end{cases}$$

$x = 5$. Тогда $y = 2 \cdot 5 - 7 = 3$.

Ответ: $x = 5, y = 3$.

5.55. $y = 1 - 4x$ и $y = \sqrt{2x + 1}$. $1 - 4x = \sqrt{2x + 1}$;

$$\begin{cases} (1 - 4x)^2 = (\sqrt{2x + 1})^2, & \begin{cases} 1 - 8x + 16x^2 = 2x + 1, \\ 1 - 4x \geq 0; \end{cases} \\ 1 - 4x \geq 0; & \begin{cases} -4x \geq -1; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 16x^2 - 10x = 0, \\ x \leq \frac{1}{4}; \end{cases} \begin{cases} x_1 = 0, x_2 = \frac{5}{8}, \\ x \leq \frac{1}{4}. \end{cases} \text{ Значит, } x = 0. \text{ Тогда } y = 1.$$

Ответ: (0; 1).

$$5.56. y = -1 - 2x \text{ и } y = \sqrt{2x+3}. \quad y = \sqrt{2x+3} = -1 - 2x.$$

$$\begin{cases} (\sqrt{2x+3})^2 = (-1-2x)^2, \\ -1-2x \geq 0; \end{cases} \begin{cases} 2x+3 = 1+4x+4x^2, \\ -2x \geq 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x^2 + 2x - 2 = 0, \\ x \leq -\frac{1}{2}; \end{cases} \begin{cases} 2x^2 + x - 1 = 0, \\ x \leq -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$2x^2 + x - 1 = 0; D = 1 + 8 = 9 > 0, x_1 = \frac{-1-3}{4}, x_1 = -1;$$

$$x_2 = \frac{-1+3}{4}, x_2 = \frac{1}{2}. y = -1 - 2 \cdot (-1) = -1 + 2 = 1. \text{ Ответ: } (-1; 1).$$

Степени и логарифмы

$$5.57. 3^x - 8 \cdot 3^{\frac{x}{2}} + 15 = 0. \text{ Пусть } 3^{\frac{x}{2}} = y, y > 0. \text{ Имеем: } y^2 - 8y + 15 = 0, \\ y_1 = 3, y_2 = 5.$$

$$1) 3^{\frac{x}{2}} = 3, \frac{x}{2} = 1, x = 2; 2) 3^{\frac{x}{2}} = 5, \frac{x}{2} = \log_3 5, x = 2 \log_3 5, x = \log_3 25.$$

Ответ: 2; $\log_3 25$.

$$5.58. 3 \cdot 2^x - 2^{2x+1} = 1; 3 \cdot 2^x - 2 \cdot 2^{2x} = 1. \text{ Пусть } 2^{\frac{x}{2}} = y, y > 0.$$

$$\text{Тогда: } 3y^2 - 2y - 1 = 0; \frac{D}{4} = 1 + 3 = 4; y = \frac{1 \pm 2}{3}; y_1 = 1, y_2 = -\frac{1}{3};$$

$$\frac{x}{2} = 1; 2^{\frac{x}{2}} = 2^0; \frac{x}{2} = 0; x = 0. \quad \text{Ответ: } 0.$$

$$5.59. 3 \cdot 25^x - 8 \cdot 15^x + 5 \cdot 9^x = 0; 3 \cdot \left(\frac{25}{9}\right)^x - 8 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^x + 5 = 0;$$

$$3 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^{2x} - 8 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^x + 5 = 0. \text{ Пусть } \left(\frac{5}{3}\right)^x = y, y > 0. \text{ Тогда:}$$

$$3y^2 - 8y + 5 = 0; \frac{D}{4} = 16 - 15 = 1; y = \frac{4 \pm 1}{3}; y_1 = 1, y_2 = \frac{5}{3}.$$

$$1) \left(\frac{5}{3}\right)^x = 1; x = 0; 2) \left(\frac{5}{3}\right)^x = \frac{5}{3}; x = 1. \quad \text{Ответ: } 0; 1.$$

$$5.60. 9^x + 4^x = 2,5 \cdot 6^x; 3^{2x} + 2^{2x} = \frac{5}{2} \cdot 3^x \cdot 2^x. 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} = \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x.$$

$$\text{Пусть } \left(\frac{2}{3}\right)^x = y, y > 0. \text{ Тогда: } y^2 - \frac{5}{2}y + 1 = 0; 2y^2 - 5y + 2 = 0;$$

$$D = 25 - 16 = 9, y = \frac{5 \pm 3}{4}; y_1 = 2; y_2 = \frac{1}{2}. 1) \left(\frac{2}{3}\right)^x = 2, x = \log_{\frac{2}{3}} 2;$$

$$2) \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{1}{2}, x = \log_{\frac{2}{3}} \frac{1}{2}. \quad \text{Ответ: } \log_{\frac{2}{3}} 2; \log_{\frac{2}{3}} \frac{1}{2}.$$

$$5.61. 9^x + 4^{x+1,5} = 6^{x+1}; 3^{2x} + 4^{1,5} \cdot 2^{2x} = 6 \cdot 2^x \cdot 3^x.$$

$$1 + 8 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 6 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x = 0. \text{ Пусть } \left(\frac{2}{3}\right)^x = t, t > 0. \text{ Тогда:}$$

$$8t^2 - 6t + 1 = 0; \frac{D}{4} = 9 - 8 = 1; y = \frac{3 \pm 1}{8}; y_1 = \frac{1}{2}, y_2 = \frac{1}{4}.$$

$$1) \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{1}{2}, x = \log_{\frac{2}{3}} \frac{1}{2}; 2) \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{1}{4}, x = \log_{\frac{2}{3}} \frac{1}{4}.$$

$$\text{Ответ: } \log_{\frac{2}{3}} \frac{1}{2}; \log_{\frac{2}{3}} \frac{1}{4}.$$

$$5.62. 4^{x+1} - 6^x - 2 \cdot 9^{x+1} = 0; 4 \cdot 2^{2x} - 2^x \cdot 3^x - 2 \cdot 9 \cdot 3^{2x} = 0.$$

$$4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - \left(\frac{2}{3}\right)^x - 18 = 0. \text{ Пусть } \left(\frac{2}{3}\right)^x = y, y > 0.$$

$$\text{Тогда: } 4y^2 - y - 18 = 0; D = 1 + 288 = 289.$$

$$y = \frac{1 \pm 17}{8}; y_1 = \frac{9}{4}, y_2 = -2. \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{9}{4}; \left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}; x = -2$$

Ответ: -2.

$$5.63. 32^{3(x^2-8)} = 8^{19(2x-x^2)}; (2^5)^{3(x^2-8)} = (2^3)^{19(2x-x^2)}; 2^{15(x^2-8)} = 2^{57(2x-x^2)};$$

$$15(x^2 - 8) = 57(2x - x^2); 15x^2 - 120 - 114x + 57x^2 = 0;$$

$$72x^2 - 114x - 120 = 0 | : 6; 12x^2 - 19x - 20 = 0;$$

$$D = 361 + 960 = 1321; x = \frac{19 \pm \sqrt{1321}}{24}. \quad \text{Ответ: } \frac{19 \pm \sqrt{1321}}{24}.$$

$$5.64. 8^{4(x^2+8)} = 16^{7(x^2+2x)}; (2^3)^{4(x^2+8)} = (2^4)^{7(x^2+2x)}; 2^{12(x^2+8)} = 2^{28(x^2+2x)},$$

$$12(x^2+8) = 28(x^2+2x) | :4; 3(x^2+8) = 7(x^2+2x); 3x^2 - 7x^2 - 14x + 24 = 0;$$

$$4x^2 + 14x - 24 = 0 | :2; 2x^2 + 7x - 12 = 0; D = 49 + 96 = 145;$$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{145}}{4}. \quad \text{Ответ: } \frac{-7 \pm \sqrt{145}}{4}.$$

$$5.65. \log_2(x-1) + \log_2 x < 1; \log_2(x-1)x < \log_2 2, \text{ т.к. } 2 > 1, \text{ то}$$

$$\begin{cases} x(x-1) < 2, & \begin{cases} x^2 - x - 2 < 0, & \begin{cases} (x+1)(x-2) < 0, & \begin{cases} -1 < x < 2, \\ x-1 > 0; & \begin{cases} x > 1; \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$1 < x < 2. \quad \text{Ответ: } (1; 2).$$

$$5.66. \log_3(x+2) + \log_3 x > 1; \log_3(x+2)x > \log_3 3, \text{ т.к. } 3 > 1, \text{ то}$$

$$\begin{cases} x(x+2) > 3, & \begin{cases} x^2 + 2x - 3 > 0, & \begin{cases} (x+3)(x-1) > 0, & \begin{cases} x < -3, & x > 1, \\ x > 0; & \begin{cases} x > 0; \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$x > 1. \quad \text{Ответ: } (1; +\infty).$$

$$5.67. \log_2(x+1) + \log_2 x < 1; \log_2 x(x+1) < \log_2 2, \text{ т.к. } 2 > 1, \text{ то}$$

$$\begin{cases} x(x+1) < 2, & \begin{cases} x^2 + x - 2 < 0, & \begin{cases} (x+2)(x-1) < 0, & \begin{cases} -2 < x < 1, \\ x > 0; & \begin{cases} x > 0; \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$0 < x < 1. \quad \text{Ответ: } (0; 1).$$

$$5.68. \lg x + \lg(x-3) > 1; \lg x(x-3) > \lg 10, \text{ т.к. } 10 > 1, \text{ то}$$

$$\begin{cases} x(x-3) > 10, & \begin{cases} x^2 - 3x - 10 > 0, & \begin{cases} (x+2)(x-5) > 0, & \begin{cases} x > 5. \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } (5; +\infty).$$

$$5.69. \log_{0.5}(4-x) \geq \log_{0.5} 2 - \log_{0.5}(x-1); \begin{cases} 4-x > 0, & \begin{cases} x < 4, \\ x-1 > 0; & \begin{cases} x > 1; \end{cases} \end{cases} \quad 1 < x < 4.$$

$$\log_{0.5}(4-x) \geq \log_{0.5} \frac{2}{x-1}, \text{ т.к. } 0,5 < 1, \text{ то}$$

$$4-x \leq \frac{2}{x-1}; 4-x - \frac{2}{x-1} \leq 0; \frac{x^2 - 5x + 6}{x-1} \geq 0; \frac{(x-2)(x-3)}{x-1} \geq 0.$$



5.70. $\log_3(x^2 - 7x + 12) < \log_3 20$;

$$\begin{cases} x^2 - 7x + 12 > 0, \\ x^2 - 7x + 12 < 20; \end{cases} \begin{cases} (x-3)(x-4) > 0, \\ (x+1)(x-8) < 0; \end{cases} \begin{cases} x < 3, \\ x > 4, \\ -1 < x < 8; \end{cases}$$

$x \in (-1; 3) \cup (4; 8)$. Ответ: $(-1; 3) \cup (4; 8)$.

5.71. $\log_{0.3}(x^2 + x + 31) < \log_{0.3}(10x + 11)$, т.к. $0 < 0.3 < 1$, то

$$\begin{cases} x^2 + x + 31 > 10x + 11, \\ 10x + 11 > 0; \end{cases} \begin{cases} x^2 - 9x + 20 > 0, \\ x > -\frac{11}{10}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 5, \\ x < 4, \\ x > -\frac{11}{10}; \end{cases} x \in \left(-\frac{11}{10}; 4\right) \cup (5; +\infty). \text{ Ответ: } \left(-\frac{11}{10}; 4\right) \cup (5; +\infty).$$

5.72. $-\log_2(x^2 + 3x) \geq 0$;

$\log_2(x^2 + 3x) \leq 0$; $\log_2(x^2 + 3x) \leq \log_2 1$, т.к. $2 > 1$, то

$$\begin{cases} x^2 + 3x - 1 \leq 0, \\ x^2 + 3x > 0; \end{cases} \begin{cases} x^2 + 3x - 1 = 0, \\ D = 9 + 4 = 13, \\ x = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{-3 - \sqrt{13}}{2} \leq x \leq \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, \\ x < -3, \\ x > 0; \end{cases} x \in \left[\frac{-3 - \sqrt{13}}{2}; -3\right) \cup \left(0; \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}\right]$$

Ответ: $\left[\frac{-3 - \sqrt{13}}{2}; -3\right) \cup \left(0; \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}\right]$.


5.73. $\log_1 \frac{6-x}{x+1} \leq -2$;

$\log_1 \frac{6-x}{x+1} \leq \log_1 4$, т.к. $0 < \frac{1}{2} < 1$,



то $\frac{6-x}{x+1} \geq 4$; $\frac{2-5x}{x+1} \geq 0$; $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$. Ответ: $\left[-1; \frac{2}{5}\right]$.

5.74. $\log_3 \frac{8-x}{x+2} \geq 1$; $\log_3 \frac{8-x}{x+2} \geq \log_3 3$, т.к. $3 > 1$, то $\frac{8-x}{x+2} \geq 3$;



$\frac{2-4x}{x+2} \geq 0$; $\frac{4\left(\frac{1-x}{2}\right)}{x+2} \geq 0$; $\frac{x-\frac{1}{2}}{x+2} \leq 0$.

Ответ: $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$.

5.75. $\log_2 \frac{6+x}{x-3} < 2$; $\log_2 \frac{6+x}{x-3} < \log_2 4$, т.к. $2 > 1$, то

$$\begin{cases} \frac{6+x}{x-3} < 4, \\ \frac{6+x}{x-3} > 0, \end{cases} \begin{cases} \frac{18-3x}{x-3} < 0, \\ \frac{6+x}{x-3} > 0, \end{cases} \begin{cases} \frac{x-6}{x-3} > 0, \\ \frac{6+x}{x-3} > 0, \end{cases} \begin{cases} x < 3, \\ x > 6, \\ x < -6, \\ x > 3. \end{cases}$$

Ответ: $(-\infty; -6) \cup (6; +\infty)$.

5.76. $\log_{\frac{1}{3}} \frac{3x+1}{x-2} > -1$; $\log_{\frac{1}{3}} \frac{3x+1}{x-2} > \log_{\frac{1}{3}} 3$, т.к. $0 < \frac{1}{3} < 1$, то

$$\begin{cases} \frac{3x+1}{x-2} < 3, \\ \frac{3x+1}{x-2} > 0, \end{cases} \begin{cases} \frac{7}{x-2} < 0, \\ 3\left(x+\frac{1}{3}\right) > 0, \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ x < -\frac{1}{3}, \\ x > 2, \end{cases} \text{ Ответ: } \left(-\infty; -\frac{1}{3}\right).$$

5.77. $\begin{cases} 3^x \cdot 2^y = \frac{1}{9}, \\ y - x = 2; \end{cases} \begin{cases} 3^x \cdot 2^y = \frac{1}{9}, \\ y = 2 + x; \end{cases} \begin{cases} 3^x \cdot 2^{x+2} = \frac{1}{9}, \\ y = 2 + x; \end{cases} \begin{cases} 4 \cdot 6^x = \frac{1}{9}, \\ y = 2 + x; \end{cases}$

$\begin{cases} 6^x = 6^{-2}, \\ y = 2 + x; \end{cases} \begin{cases} x = -2, \\ y = 0. \end{cases}$ Ответ: $(-2; 0)$.

5.78. $\begin{cases} 2^y = 200 \cdot 5^x, \\ x + y = 1; \end{cases}$

$\begin{cases} x = 1 - y, \\ 2^y = 200 \cdot 5^{1-y}; \end{cases} \begin{cases} x = 1 - y, \\ 2^y = 200 \cdot 5 \cdot \frac{1}{5^y}, \end{cases} 5^y > 0 \text{ при всех значениях } x;$

$\begin{cases} x = 1 - y, \\ 10^y = 10^3; \end{cases} \begin{cases} x = -2, \\ y = 3. \end{cases}$ Ответ: $(-2; 3)$.

$$5.79. \begin{cases} 7^{x+1} \cdot 2^y = 4; \\ y-x=3; \end{cases} \begin{cases} y=x+3; \\ 7^{x+1} \cdot 2^{x+3} = 4; \end{cases} \begin{cases} y=x+3; \\ 14^{x+1} \cdot 4 = 4; \end{cases} \begin{cases} x+1=0; \\ y=x+3; \end{cases} \begin{cases} x=-1; \\ y=2. \end{cases}$$

Ответ: (-1; 2).

$$5.80. \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^x \cdot 5^y = 75; \\ x+y=1; \end{cases} \begin{cases} x=1-y; \\ 3^{y-1} \cdot 5^y = 75; \end{cases} \begin{cases} x=1-y; \\ \frac{1}{3} \cdot 15^y = 75; \end{cases} \begin{cases} y=2; \\ x=-1. \end{cases}$$

Ответ: (-1; 2).

$$5.81. \begin{cases} 5^{x-1} \cdot 7^y = \frac{1}{7}; \\ y-x=-2; \end{cases} \begin{cases} y=x-2; \\ 5^{x-1} \cdot 7^{x-2} = \frac{1}{7}; \end{cases} \begin{cases} y=x-2; \\ 5^{x-1} \cdot 7^{x-1} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{7}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=x-2; \\ 35^{x-1} = 35^0; \end{cases} \begin{cases} x=1; \\ y=-1. \end{cases} \text{ Ответ: (1; -1).}$$

$$5.82. \begin{cases} \left(\frac{1}{7}\right)^x \cdot 3^y = 63; \\ y+x=1; \end{cases} \begin{cases} x=1-y; \\ \left(\frac{1}{7}\right)^x \cdot 3^y = 63; \end{cases} \frac{1}{7} \cdot 7^y \cdot 3^y = 63;$$

$21^y = 21^2; y=2$, тогда $x=-1$. Ответ: (-1; 2).

Производная и ее приложения

$$5.83. y = \frac{x+1}{x-3}, k = -1$$

$$y'(x) = \frac{(x+1)'(x-3) - (x+1)(x-3)'}{(x-3)^2} = \frac{x-3-x-1}{(x-3)^2} = -\frac{4}{(x-3)^2};$$

$$y'(x_0) = -\frac{4}{(x_0-3)^2}; -\frac{4}{(x_0-3)^2} = -1; (x_0-3)^2 = 4, x_0 \neq 3;$$

$$x_0^2 - 6x_0 + 9 - 4 = 0; x_0^2 - 6x_0 + 5 = 0; x_{01} = 1, x_{02} = 5.$$

$$a) x_0 = 1, y(x_0) = -1, y'(x_0) = -1; y = -1 - 1(x-1); y = -x;$$

$$b) x_0 = 5, y(x_0) = 3, y'(x_0) = -1; y = 3 - 1(x-5); y = -x + 8.$$

$$a) -x = 0; x = 0; б) -x + 8 = 0; x = 8. \text{ Ответ: (0; 0), (8; 0).}$$

$$5.84. y = \frac{2x-3}{x+3}, k = 9; y'(x) = \frac{(2x-3)'(x+3) - (2x-3)(x+3)'}{(x+3)^2} =$$

$$= \frac{2(x+3) - (2x-3) \cdot 1}{(x+3)^2} = \frac{2x+6-2x+3}{(x+3)^2} = \frac{9}{(x+3)^2};$$

$$y'(x_0) = \frac{9}{(x_0+3)^2}; \frac{9}{(x_0+3)^2} = 9; (x_0+3)^2 = 1, x_0 \neq -3;$$

$$x_0^2 + 6x_0 + 8 = 0; x_{01} = -2, x_{02} = -4.$$

2) а) $x_0 = -2; y(x_0) = -7; y'(x_0) = 9; y = -7 + 9(x + 2); y = 9x + 11;$
 б) $x_0 = -4; y(x_0) = 11; y'(x_0) = 9; y = 11 + 9(x + 4); y = 9x + 47.$

3) $y = 0;$ а) $9x + 11 = 0; x = -1\frac{2}{9};$ б) $9x + 47 = 0; x = -5\frac{2}{9};$

4) $x = 0;$ а) $y = 9 \cdot 0 + 11 = 11;$ б) $y = 9 \cdot 0 + 47 = 47;$

Ответ: $\left(-1\frac{2}{9}; 0\right), \left(-5\frac{2}{9}; 0\right); (0; 11), (0; 47).$

5.85. $y = \frac{3x-1}{x+8}, k = 1.$

$$1) y'(x) = \frac{(3x-1)(x+8) - (3x-1)(x+8)'}{(x+8)^2} = \frac{3(x+8) - 3x + 1}{(x+8)^2} = \frac{25}{(x+8)^2};$$

$$\frac{25}{(x_0+8)^2} = 1; (x_0+8)^2 = 25, x_0^2 + 16x_0 + 39 = 0; x_{01} = -3, x_{02} = -13.$$

2) а) $x_0 = -3; y(x_0) = \frac{3 \cdot (-3) - 1}{-3 + 8} = -2, y'(x_0) = 1;$

$y = -2 + 1(x + 3); y = x + 1;$

б) $x_0 = -13; y(x_0) = \frac{3 \cdot (-13) - 1}{-13 + 8} = 8; y = 8 + x + 13; y = x + 21.$

3) $x = 0;$ а) $y = 1;$ б) $y = 21.$ Ответ: $(0; 1), (0; 21).$

5.86. $y = \frac{2x-2}{x+1}, k = 4.$

$$1) y'(x) = \frac{(2x-2)(x+1) - (2x-2)(x+1)'}{(x+1)^2} = \frac{2(x+1) - 2x + 2}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{4}{(x+1)^2}; \frac{4}{(x_0+1)^2} = 4; (x_0+1)^2 = 1; x_0^2 + 2x_0 = 0;$$

$x_{01} = 0, x_{02} = -2.$

2) а) $x_0 = 0; y(x_0) = -2; y'(x_0) = 4; y = -2 + 4x;$

б) $x_0 = -2; y(x_0) = 6; y'(x_0) = 4; y = 4x + 14.$

3) $y = 0;$ а) $4x - 2 = 0, x = \frac{1}{2};$ б) $4x + 14 = 0, x = -3\frac{1}{2};$

4) $x = 0;$ а) $y = 4 \cdot 0 - 2 = -2;$ б) $y = 4 \cdot 0 + 14 = 14;$

Ответ: $\left(\frac{1}{2}; 0\right), \left(-3\frac{1}{2}; 0\right); (0; -2), (0; 14).$

5.87. $y = \frac{x+4}{x-5}$, $k = -1$.

$$y'(x) = \frac{(x+4)'(x-5) - (x+4)(x-5)'}{(x-5)^2} = \frac{x-5-x-4}{(x-5)^2} = -\frac{9}{(x-5)^2};$$

$$-\frac{9}{(x_0-5)^2} = -1; x_0^2 - 10x_0 + 16 = 0, x_0 \neq 5; x_{01} = 2, x_{02} = 8.$$

- 2) а) $x_0 = 2$; $y(2) = -2$; $y'(2) = -1$; $y = -2 - 1 \cdot (x-2)$; $y = -x$;
 б) $x_0 = 8$; $y(8) = 4$; $y'(8) = -1$; $y = 4 - (x-8)$; $y = -x + 12$.
 3) $x = 0$; а) $y = 0$; б) $y = 0 + 12 = 12$; Ответ: (0; 0), (0; 12).

5.88. $y = \frac{3x-5}{x-3}$, $k = 25$.


$$y'(x) = \frac{(3x-5)'(x-3) - (3x-5)(x-3)'}{(x-3)^2} = \frac{3x-9-3x+5}{(x-3)^2} = -\frac{4}{(x-3)^2};$$

$$-\frac{4}{(x_0-3)^2} = 25; \text{решений нет. Ответ: искомым координат - нет.}$$

5.89. $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 3$, $\left(-\frac{6}{5}; 2\right)$;

$$y' = 3x^2 - 12x + 9;$$


$$x^2 - 4x + 3 = 0; x_1 = 1, x_2 = 3.$$



$$1 \in \left(-\frac{6}{5}; 2\right), 3 \notin \left(-\frac{6}{5}; 2\right). \text{ Ответ: } x = 1.$$

5.90. $y = -x^3 - 3x^2 + 24x - 4$, $\left(-5; \frac{1}{5}\right)$;

$$y' = -3x^2 - 6x + 24; x^2 + 2x - 8 = 0; x_1 = -4, x_2 = 2.$$




$$-4 \in \left(-5; \frac{1}{5}\right), 2 \notin \left(-5; \frac{1}{5}\right). \text{ Ответ: } x = -4.$$


5.91. $y = x^3 - 3x^2 - 9x - 4$;
 $y'(x) = 3x^2 - 6x - 9$. $D(y') = R$;
 $x^2 - 2x - 3 = 0; x_1 = 3, x_2 = -1$;

$$x_{\max} = -1, y_{\max} = y(-1) = 1;$$

$$x_{\min} = 3, y_{\min} = y(3) = -31. \text{ Ответ: } 1; -31.$$



5.92. $y = -x^3 + 6x^2 + 15x + 1$;
 $y' = -3x^2 + 12x + 15$; $x^2 - 4x - 5 = 0$;
 $x_1 = 5, x_2 = -1$. $x_{\min} = -1, y(-1) = -7$;
 $x_{\max} = 5, y(5) = 101. \text{ Ответ: } -7; 101.$



5.93. $y = \sin x - \cos x, [0; \pi]$;

y' $\begin{array}{c} + \\ - \end{array}$ $\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array}$ $\begin{array}{c} 0 \\ \frac{3\pi}{4} \\ \pi \end{array}$ $\begin{array}{l} y' = \cos x + \sin x; \\ \cos x + \sin x = 0; \\ 1 + \operatorname{tg} x = 0; \operatorname{tg} x = -1; x = -\operatorname{arctg} 1 + \pi n, \\ n \in Z, x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z. \end{array}$

Отрезку $[0; \pi]$ принадлежат $x = \frac{3\pi}{4}$, (при $n = 1$), Ответ: $x_{\max} = \frac{3\pi}{4}$.

5.94. $y = \cos x - \sin x, [0; 2\pi]$; $y' = -\sin x - \cos x$;

y' $\begin{array}{c} - \\ + \\ - \end{array}$ $\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array}$ $\begin{array}{c} 0 \\ \frac{3\pi}{4} \\ \frac{7\pi}{4} \\ 2\pi \end{array}$ $\begin{array}{l} -\operatorname{tg} x - 1 = 0; \operatorname{tg} x = -1; \\ x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z. \end{array}$

При $n=1$, $x = \frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \in [0; 2\pi]$.

При $n=2$, $x = \frac{7\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \in [0; 2\pi]$. $x_{\max} = \frac{7\pi}{4}$, $x_{\min} = \frac{3\pi}{4}$.

Ответ: $\frac{7\pi}{4}$ - точка максимума; $\frac{3\pi}{4}$ - точка минимума.

5.95. $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x, [0; \pi]$; $y' = \cos x + \sqrt{3} \sin x$;

y' $\begin{array}{c} + \\ - \end{array}$ $\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array}$ $\begin{array}{c} 0 \\ \frac{5\pi}{6} \\ \pi \end{array}$ $\begin{array}{l} 1 + \sqrt{3} \operatorname{tg} x = 0; \operatorname{tg} x = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \\ x = -\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z. x = \frac{5\pi}{6} \text{ (при } n = 1). \end{array}$

$y_{\max} = y\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3} \cos \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2} - \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2$.

Ответ: $y_{\max} = 2$.

5.96. $y = \sqrt{3} \sin x + \cos x, [0; 2\pi]$; $y' = \sqrt{3} \cos x - \sin x$;

y' $\begin{array}{c} + \\ - \\ + \end{array}$ $\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array}$ $\begin{array}{c} 0 \\ \frac{\pi}{3} \\ \frac{4\pi}{3} \\ 2\pi \end{array}$ $\begin{array}{l} \sqrt{3} \cos x - \sin x = 0, \cos x \neq 0, \\ \sqrt{3} - \operatorname{tg} x = 0; \operatorname{tg} x = \sqrt{3}, \\ x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in Z. \end{array}$

При $n=0$, $x = \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \in [0; 2\pi]$. При $n=1$, $x = \frac{4\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \in [0; 2\pi]$.

$$x_{\max} = \frac{\pi}{3}, \quad y_{\max} = y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = 2.$$


$$x_{\min} = \frac{4\pi}{3}, \quad y_{\min} = y\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) = -2.$$

Ответ: $y_{\max} = 2; y_{\min} = -2$.

5.97. $y = x + 2e^x; D(y) = R;$

$y' = 1 - 2e^{-x}; D(y') = R;$

$y'(x) = 0$, если $1 - 2e^{-x} = 0; e^{-x} = \frac{1}{2};$



$$-x = \ln \frac{1}{2}; \quad x = -\ln \frac{1}{2}; \quad \left(\ln \frac{1}{2} = \ln 1 - \ln 2 = 0 - \ln 2 = -\ln 2 \right); \quad x = \ln 2.$$


Значит, $x = \ln 2$ – точка минимума. Ответ: $x_{\min} = \ln 2$.

5.98. $y = 2x + 3e^x; y' = 2 - 3e^x; 2 - 3e^x = 0; e^x = 2/3; -x = \ln 2/3;$

$x = \ln 3/2$. Ответ: $x = \ln 3/2$ – точка минимума.

5.99. $y = -x + 2e^x; y' = -1 + 2e^x;$

$-1 + 2e^x = 0; 2e^x = 1; e^x = \frac{1}{2}; x = \ln \frac{1}{2};$



$x = \ln 1 - \ln 2; x = -\ln 2.$

$x_{\min} = -\ln 2.$

$$y_{\min} = y(-\ln 2) = -(-\ln 2) + 2 \cdot e^{-\ln 2} = \ln 2 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 + \ln 2.$$

Ответ: $(-\ln 2; 1 + \ln 2)$ – минимум.

5.100. $y = -3x + 2e^x;$

$y' = -3 - 2e^{-x} = 2e^{-x} - 3 = 0; e^{-x} = 3/2; -x = \ln 3/2; x = \ln 2/3.$

$y(\ln \frac{2}{3}) = -3 \ln \frac{2}{3} - 2 \cdot e^{-\ln \frac{2}{3}} = -3(1 + \ln \frac{2}{3}).$ Ответ: $y_{\max} = -3(1 + \ln \frac{2}{3}).$

StudyPort.ru

**Раздел 6. Задания 9, 10 для экзамена
«Алгебра и начала анализа»**

Уравнения

6.1. $\log_{x+1}(x^2 + x - 6)^2 = 4$; $\log_{x+1}|x^2 + x - 6| = 2$; $\log_{x+1}|x^2 + x - 6| = 2$;

$$\begin{cases} x+1 > 0, \\ x+1 \neq 1, \\ |x^2 + x - 6| = (x+1)^2; \end{cases} \quad \begin{cases} x > -1, \\ x \neq 0, \\ |x^2 + x - 6| = x^2 + 2x + 1. \end{cases}$$

$|x^2 + x - 6| = x^2 + 2x - 1$.

1) $x^2 + x - 6 \geq 0$; $x \in (-\infty; 3] \cup [2; \infty)$; $x^2 + x - 6 = x^2 + 2x + 1$; $x = -7$.

2) $x^2 + x - 6 < 0$; $x \in (-3; 2)$; $-x^2 - x + 6 = x^2 + 2x + 1$;

$2x^2 + 3x - 5 = 0$; $D = 49$; $x_1 = 1$, $x_2 = -2,5$. Ответ: 1.

6.2. $\log_5(x-8)^2 = 2 + 2\log_5(x-2)$; $\log_5(x-8)^2 = \log_5 25 + \log_5(x-2)^2$;

$(x-8)^2 = 25 \cdot (x-2)^2$; $x^2 - 16x + 64 = 25x^2 - 100x + 100$;

$24x^2 - 84x + 36 = 0$; $2x^2 - 7x + 3 = 0$; $D = 25$; О.Д.З. $x \neq 8$; $x > 2$

$x_1 = 3$, $x_2 = \frac{1}{2}$. — не подходит в О.Д.З. Ответ: 3.

6.3. $\log_{9x^2}(6 + 2x - x^2) = \frac{1}{2}$;

$$\begin{cases} 6 + 2x - x^2 > 0, \\ 9x^2 \neq 1, \\ 6 + 2x - x^2 = (9x^2)^{\frac{1}{2}}; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - 2x - 6 < 0, \\ x \neq \pm \frac{1}{3}, \\ 6 + 2x - x^2 = 3|x|. \end{cases}$$

$6 + 2x - x^2 = 3|x|$.

1) $x \geq 0$; $6 + 2x - x^2 = 3x$; $x^2 + x - 6 = 0$; $x_1 = -3$, $x_2 = 2$. Значит, $x = 2$.

2) $x < 0$; $6 + 2x - x^2 = -3x$; $x^2 - 5x - 6 = 0$; $x_1 = 6$, $x_2 = -1$. Значит, $x = -1$.

Ответ: 2; -1.

6.4. $\log_{x-3}(x^2 - 4x) = 4$; $2\log_{x-3}|x^2 - 4x| = 4$; $\log_{x-3}|x^2 - 4x| = 2$;

$$\begin{cases} x-3 > 0, \\ x-3 \neq 1, \\ |x^2 - 4x| = (x-3)^2; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 3, \\ x \neq 4, \\ |x^2 - 4x| = (x-3)^2; \end{cases}$$

1) $x^3 - 4x > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 0) \cup (4; \infty)$. $x^2 - 4x = x^2 - 6x + 9$; $x = 4,5$;

2) $x^2 - 4x < 0 \Leftrightarrow x \in (0; 4)$. $4x - x^2 = x^2 - 6x + 9$;

$$2x^2 - 10x + 9 = 0; x = \frac{5 \pm \sqrt{7}}{2}; \frac{5 - \sqrt{7}}{2} < 3. \quad x_1 = 4,5; \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{7}}{2}.$$

Ответ: $x_1 = 4,5; x_2 = \frac{5 + \sqrt{7}}{2}$.

6.5. $\log_3(3^x - 8) = 2 - x;$

$$\begin{cases} 3^x - 8 > 0, \\ 3^x - 8 = 3^{2-x}; \end{cases} \quad 3^x - 8 = 3^{2-x}, \quad 3^{2x} - 8 \cdot 3^x - 9 = 0;$$

делаем замену $3^x = t, t > 0: t^2 - 8t - 9 = 0; t_1 = 9, t_2 = -1.$

$t > 0 \Rightarrow 3^x = 9; 3^x = 3^2; x = 2.$ Ответ: 2.

6.6. $\log_7(7^{-x} + 6) = 1 + x; \quad 7^x + 6 = 7^{1+x}; \quad 1 + 6 \cdot 7^x - 7 \cdot 7^{2x} = 0,$ замена

$7^x = t, t > 0; \quad 7t^2 - 6t - 1 = 0; t_1 = 1, t_2 = -\frac{1}{7}; \quad t = 1;$

$7^x = 1; 7^x = 7^0; x = 0.$ Ответ: 0.

6.7. $\log_2(2^x - 7) = 3 - x; \quad 2^x - 7 = 2^{3-x}; \quad 2^{2x} - 7 \cdot 2^x - 8 = 0;$ сделаем

замену $2^x = t, t > 0; \quad t^2 - 7t - 8 = 0; t_1 = 8, t_2 = -1; \quad 2^x = 8; \quad 2^x = 2^3; x = 3.$

Ответ: 3.

6.8. $\log_4(4^{-x} + 3) = x + 1. \quad 4^{-x} + 3 = 4^{x+1}; \quad 1 + 3 \cdot 4^x = 4 \cdot 4^{2x};$

Пусть $t = 4^x, t > 0; \quad 4t^2 - 3t - 1 = 0; t_1 = -1/4 < 0; t_2 = 1; \quad 4^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$

Ответ: $x = 0.$

6.9. $\log_6(6^{-x} + 5) = 1 + x; \quad 6^{-x} + 5 = 6^{1+x}; \quad 6 \cdot 6^{2x} - 5 \cdot 6^x - 1 = 0,$

пусть $6^x = t, t > 0; \quad 6t^2 - 5t - 1 = 0; t_1 = 1, t_2 = -\frac{1}{6}; \quad 6^x = 1; \quad 6^x = 6^0; x = 0.$

Ответ: 0.

6.10. $\log_5(5^x - 4) = 1 - x; \quad 5^x - 4 = 5^{1-x}; \quad 5^{2x} - 4 \cdot 5^x - 5 = 0; \quad 5^x = t, t > 0;$

$t^2 - 4t - 5 = 0; t_1 = 5, t_2 = -1; \quad 5^x = 5; x = 1.$ Ответ: 1.

6.11. $2\log_7(x-2) = -2 + \log_7(x-10)^2;$

$\log_7(x-2)^2 = \log_7\left(\frac{1}{49}(x-10)^2\right), x > 2, x \neq 10;$

$49(x-2)^2 = (x-10)^2; \quad 49x^2 - 196x + 196 = x^2 - 20x + 100;$

$48x^2 - 176x + 96 = 0; \quad 3x^2 - 11x + 6 = 0; D = 49; \quad x_1 = \frac{2}{3}, x_2 = 3.$

Ответ: 3.

6.12. $\log_{(x-6)^2}(x^2 - 5x + 9) = \frac{1}{2}; \quad x^2 - 5x + 9 = |x-6|, (x-6)^2 \neq 0,$

$(x-6)^2 \neq 1. \quad \text{Значит, } x \neq 6, x \neq 7, x \neq 5.$

1) $x > 6; \quad x^2 - 5x + 9 = x - 6; \quad x^2 - 6x + 15 = 0;$

$$\frac{D}{4} = -6 < 0, \text{ корней нет;}$$

$$2) x < 6; x^2 - 5x + 9 = -x + 6; x^2 - 4x + 3 = 0; x_1 = 1, x_2 = 3. \text{ Ответ: } 1; 3.$$

$$6.13. (2x^2 - 5x + 2)(\log_{2x} 18x + 1) = 0; \text{ О.Д.З. } x > 0; x \neq 1/2.$$

$$1) 2x^2 - 5x + 2 = 0; x_1 = 1/2; x_2 = 2. \text{ Подставляя в О.Д.З имеем: } x = 2.$$

$$2) \log_{2x} 18x + 1 = 0; 18x = \frac{1}{2x}; x^2 = \frac{1}{36}; x = \pm \frac{1}{6}. \text{ Ответ: } 2; \frac{1}{6}.$$

$$6.14. (x^2 - 7x + 10) \left(\log_{\frac{x}{2}} 8x + 1 \right) = 0; (x^2 - 7x + 10) \left(\log_{\frac{x}{2}} 16 + 2 \right) = 0;$$

$$\begin{cases} x^2 - 7x + 10 = 0, \\ x > 0, \\ x \neq 2, \\ \log_{\frac{x}{2}} 16 = -2; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 5, \\ x = 2, \\ x > 0, \\ x \neq 2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x > 0, \\ x \neq 2, \\ \left(\frac{x}{2}\right)^{-2} = 16; \end{cases}$$

$$x = 5 \text{ или } \begin{cases} x > 0, \\ x \neq 2, \\ x^2 = \frac{1}{4}; \end{cases} \quad x = 5 \text{ или } x = \frac{1}{2}. \quad \text{Ответ: } 5; \frac{1}{2}.$$

$$6.15. (2x - 3)\sqrt{3x^2 - 5x - 2} = 0,$$

$$\begin{cases} 2x - 3 = 0, \\ 3x^2 - 5x - 2 \geq 0, \\ 3x^2 - 5x - 2 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{3}{2}, \\ x \geq 2, \\ x \leq -\frac{1}{3}, \end{cases} \quad \text{или } x = 2, \text{ или } x = -\frac{1}{3};$$

$$x = 2 \text{ или } x = -1/3. \quad \text{Ответ: } 2; -1/3.$$

$$6.16. (2x^2 - 3x - 2)\sqrt{3x + 1} = 0.$$

$$1) \begin{cases} 2x^2 - 3x - 2 = 0, \\ 3x + 1 \geq 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad 2) 3x + 1 = 0.$$

$$1) 2x^2 - 3x - 2 = 0; \quad 2) x = -\frac{1}{3}.$$

$$D = 25; \quad x_1 = 2, \quad x_2 = -\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}; \quad \text{Ответ: } 2; -\frac{1}{3}.$$

6.17. $(6x-5)\sqrt{2x^2-5x+2}=0$.

$$1) \begin{cases} 6x-5=0, \\ 2x^2-5x+2 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x=\frac{5}{6}, \\ 2\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-2) \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x=\frac{5}{6}, \\ x \leq \frac{1}{2}, \\ x \geq 2. \end{cases}$$

Система решений не имеет.

2) $2x^2-5x+2=0$; $D=9$; $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=2$. Ответ: 2 ; $\frac{1}{2}$.

6.18. $(3x^2-x-2)\sqrt{2x-1}=0$.

$$\begin{cases} 3x^2-x-2=0, \\ 2x-1 \geq 0; \end{cases} \quad 3x^2-x-2=0; D=25; x_1=1, x_2=-\frac{2}{3}.$$

$$\begin{cases} x=1, \\ x=-\frac{2}{3}, \text{ или } x=\frac{1}{2}; \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \quad x=1 \text{ или } x=\frac{1}{2}; \quad \text{Ответ: } 1; \frac{1}{2}.$$

6.19. $(7x+2)\sqrt{4x-3x^2-1}=0$.

$$\begin{cases} 7x+2=0, \\ 4x-3x^2-1 \geq 0, 4x-3x^2-1=0; 3x^2-4x+1=0; x_1=1, x_2=\frac{1}{3}; \\ 4x-3x^2-1=0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=-\frac{2}{7}, \\ 3(x-1)\left(x-\frac{1}{3}\right) \leq 0, \\ x=1, \\ x=\frac{1}{3} \end{cases} \quad \begin{cases} x=-\frac{2}{7}, \\ x \in \left[\frac{1}{3}; 1\right], \\ x=1, \\ x=\frac{1}{3} \end{cases} \quad \begin{cases} x=1, \\ x=\frac{1}{3} \end{cases}$$

Ответ: 1 ; $\frac{1}{3}$.

6.20. $(3x - x^2 - 2)\sqrt{7x + 4} = 0;$

$$\begin{cases} 3x - x^2 - 2 = 0, \\ 7x + 4 \geq 0, \end{cases} \quad 3x - x^2 - 2 = 0; x^2 - 3x + 2 = 0; x_1 = 1, x_2 = 2;$$

$$\begin{cases} \begin{cases} x = 1, \\ x = 2, \\ x \geq -\frac{4}{7}, \\ x = -\frac{4}{7}; \end{cases} & \begin{cases} x = 1, \\ x = 2, \\ x = -\frac{4}{7}. \end{cases} \end{cases} \quad \text{Ответ: } 1; 2; -\frac{4}{7}.$$

6.21. $(3x + 4)\sqrt{-3x - 2x^2 - 1} = 0;$

$$\begin{cases} 3x + 4 = 0, \\ -3x - 2x^2 - 1 \geq 0 \end{cases} \quad \text{или } -3x - 2x^2 - 1 = 0; \quad -3x - 2x^2 - 1 = 0;$$

$$2x^2 + 3x + 1 = 0; D = 1; x_1 = -1, x_2 = -\frac{1}{2};$$

$$\begin{cases} x = -\frac{4}{3}, \\ 2(x+1)\left(x + \frac{1}{2}\right) \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\frac{4}{3}, \\ x \in \left[-1; -\frac{1}{2}\right], \end{cases} \quad \text{Ответ: } -1; -\frac{1}{2}.$$

6.22. $(4x - x^2 - 3)\sqrt{5x - 8} = 0;$

$$\begin{cases} 4x - x^2 - 3 = 0, \\ 5x - 8 \geq 0 \end{cases} \quad \text{или } 5x - 8 = 0; \quad \begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0, \\ x \geq \frac{8}{5} \end{cases} \quad \text{или } x = \frac{8}{5};$$

$$\begin{cases} x = 3, \\ x = 1, \\ x \geq \frac{8}{5} \end{cases} \quad \text{или } x = \frac{8}{5}; \quad x = 3 \text{ или } x = \frac{8}{5}. \quad \text{Ответ: } 3; 1,6.$$

6.23. $1 + \sin 3x = \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right)^2;$

$$1 + \sin 3x = \cos^2 \frac{x}{2} - 2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2};$$

$$\sin 3x + \sin x = 0; 2\cos x \cdot \sin 2x = 0; \cos x = 0 \text{ или } \sin 2x = 0;$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z; \quad 2x = \pi k; \quad x = \frac{\pi}{2} k, k \in Z.$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{2} m, m \in Z.$

6.24. $2\sin^2 2x = (\cos x + \sin x)^2; \quad 2\sin^2 2x - \sin 2x - 1 = 0;$

$\sin 2x = 1$ или $\sin 2x = -\frac{1}{2}; \quad 2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z;$

$2x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z; \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z; \quad x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} k, k \in Z.$

Ответ: $\frac{\pi}{4}(1+4n); \quad (-1)^{k+1} \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} k, \quad n, k \in Z.$

6.25. $\cos 9x - \cos 7x + \cos 3x - \cos x = 0;$

$(\cos 9x - \cos x) - (\cos 7x - \cos 3x) = 0; \quad -2\sin 5x \cdot \sin 4x + 2\sin 5x \cdot \sin 2x = 0;$

$\sin 5x(\sin 4x - \sin 2x) = 0;$

$\sin 5x = 0$ или $\sin 4x - \sin 2x = 0;$

$5x = \pi n, n \in Z; \quad 2\cos 3x \sin x = 0;$

$x = \frac{\pi}{5} m, m \in Z; \quad \cos 3x = 0, \quad x = \frac{\pi}{6}(1+2n), n \in Z;$

или $\sin x = 0, x = \pi k, k \in Z.$

Ответ: $\frac{\pi}{5} m; \quad \frac{\pi}{6}(1+2n), \quad n, m \in Z.$

6.26. $\cos 7x + \sin 8x = \cos 3x - \sin 2x; \quad (\cos 7x - \cos 3x) + (\sin 8x + \sin 2x) = 0;$

$-2\sin 5x \sin 2x + 2\sin 5x \cos 3x = 0; \quad \sin 5x(\sin 2x - \cos 3x) = 0;$

$\sin 5x = 0$ или $\sin 2x - \cos 3x = 0;$

$5x = \pi n, n \in Z; \quad \sin 2x - \sin\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) = 0;$

$x = \frac{\pi}{5} m, m \in Z; \quad 2\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)\sin\left(\frac{5x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 0;$

1) $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) = 0; \quad x = \frac{3}{2}\pi + 2\pi k, k \in Z;$

2) $\sin\left(\frac{5x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 0; \quad x = \frac{\pi}{10} + \frac{2}{5}\pi n, n \in Z.$

Ответ: $\frac{\pi}{5} m; \quad \frac{\pi}{10} + \frac{2}{5}\pi n; \quad \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \quad m, n, k \in Z.$

6.27. $\sin x - \sin 2x + \sin 5x + \sin 8x = 0$; $(\sin x + \sin 5x) + (\sin 8x - \sin 2x) = 0$;
 $2\sin 3x \cos 2x + 2\sin 3x \cos 5x = 0$; $\sin 3x(\cos 2x + \cos 5x) = 0$;
 $\sin 3x = 0$ или $\cos 2x + \cos 5x = 0$;

$3x = \pi m, m \in Z$; $2\cos \frac{7}{2}x \cos \frac{3}{2}x = 0$; $x = \frac{\pi}{3}m, m \in Z$;

1) $\cos \frac{7}{2}x = 0$; $\frac{7}{2}x = \frac{\pi}{2} + \pi k$; $x = \frac{\pi}{7} + \frac{2}{7}\pi k, k \in Z$;

2) $\cos \frac{3}{2}x = 0$; $\frac{3}{2}x = \frac{\pi}{2} + \pi n$; $x = \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}\pi n, n \in Z$.

Ответ: $\frac{\pi}{3}m$; $\frac{\pi}{7}(1+2k)$, $m, k \in Z$.

6.28. $\sin x + \sin 3x - \sin 5x - \sin 7x = 0$; $\sin x + \sin 3x - (\sin 5x + \sin 7x) = 0$;
 $\cos x(\sin 2x - \sin 6x) = 0$;

$\cos x = 0$ или $\sin 2x - \sin 6x = 0$;

$x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z$; $-2\cos 4x \sin 2x = 0$;

$\cos 4x = 0$; $x = \frac{\pi}{8}(1+2n), n \in Z$;

или $\sin 2x = 0$; $x = \frac{\pi}{2}k, k \in Z$.

Ответ: $\frac{\pi}{8}(1+2n)$; $\frac{\pi}{2}k$, где $k, n \in Z$.

6.29. $\cos 2x + \cos 6x + 2\sin^2 x = 1$; $\cos 2x + \cos 6x = 1 - 2\sin^2 x$;

$\cos 2x + \cos 6x = \cos 2x$; $\cos 6x = 0$; $6x = \frac{\pi}{2} + \pi m$; $x = \frac{\pi}{12}(1+2m)$, $m \in Z$.

Ответ: $\frac{\pi}{12}(1+2m)$, $m \in Z$.

6.30. $4\cos x \cdot \sin x + (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x) = 0$; $2\sin 2x + \frac{1}{\sin x \cos x} = 0$;

$2\sin^2 2x + 2 = 0$; $1 - \cos 4x = -2$; $\cos 4x = 3$ – нет решений,
 т.к. $|\cos \alpha| \leq 1$. Ответ: нет решений.

6.31. $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$; $(\cos x + \cos 3x) + \cos 2x = 0$;

$2\cos 2x \cos x + \cos 2x = 0$; $\cos 2x(2\cos x + 1) = 0$;

$\cos 2x = 0$ или $2\cos x + 1 = 0$;

$2x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z$; $\cos x = -\frac{1}{2}$;

$$x = \frac{\pi}{4}(1 + 2m), m \in Z; \quad x = \pm \frac{2}{3}\pi + 2\pi n, n \in Z.$$

Ответ: $\frac{\pi}{4}(1 + 2m); \pm \frac{2}{3}\pi + 2\pi n, m, n \in Z.$

6.32. $\sin x + \sin 3x = 4\cos^2 x;$
 $2\sin 2x \cos x - 4\cos^2 x = 0; 4\cos^2 x(\sin x - 1) = 0;$

$\cos x = 0; \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z;$

или $\sin x = 1; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in Z.$ Ответ: $\frac{\pi}{2}(1 + 2k), k \in Z.$

6.33. $\cos x = \cos 3x + 2\sin 2x; \quad \cos 3x - \cos x + 2\sin 2x = 0;$
 $-2\sin 2x \sin x + 2\sin 2x = 0; \quad 2\sin 2x(\sin x - 1) = 0;$

$\sin 2x = 0; \quad 2x = \pi m, m \in Z; \quad x = \frac{\pi}{2} m, m \in Z.$

или $\sin x = 1; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z; \quad$ Ответ: $\frac{\pi}{2} l, l \in Z.$

6.34. $8\sin^2 2x + 4\sin^2 4x = 5; \quad 4(1 - \cos 4x) + 4\sin^2 4x = 5;$
 $4\cos^2 4x + 4\cos 4x - 3 = 0.$ Пусть $\cos 4x = y,$ тогда

$4y^2 + 4y - 3 = 0; \quad \frac{D}{4} = 4 + 12 = 4^2; \quad y_1 = \frac{-2 - 4}{4} = -1,5, \quad y_2 = \frac{-2 + 4}{4} = \frac{1}{2};$

1) $\cos 4x = -1,5$ – решений нет, т.к. $|\cos x| \leq 1;$

2) $\cos 4x = \frac{1}{2}; \quad 4x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k; \quad x = \pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} m, \text{ где } m \in Z.$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} m, m \in Z.$

6.35. $\sin^2 3x + \sin^2 4x = \sin^2 5x + \sin^2 6x; \quad 1 - \cos 6x + 1 - \cos 8x =$
 $= 1 - \cos 10x + 1 - \cos 12x; \quad \cos 12x - \cos 6x = \cos 8x - \cos 10x;$
 $-2\sin 9x \sin 3x = 2\sin 9x \sin x; \quad \sin 9x(\sin 3x + \sin x) = 0;$

$\sin 9x = 0; \quad 9x = \pi m, m \in Z; \quad x = \frac{\pi}{9} m, m \in Z;$

или $\sin 3x + \sin x = 0; \quad 2\sin 2x \cos x = 0; \quad \sin 2x = 0; \quad 2x = \pi k; \quad x = \frac{\pi}{2} k, k \in Z;$

$\cos x = 0; \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi n; \quad x = \frac{\pi}{2}(1 + 2n), n \in Z.$

Ответ: $\frac{\pi}{9} m; \frac{\pi}{2} l, m, l \in Z.$

6.36. $\sin^2x + \sin^22x + \sin^23x + \sin^24x = 2$; $1 - \cos2x + 1 - \cos4x + 1 - \cos6x + 1 - \cos8x = 4$; $(\cos2x + \cos8x) + (\cos4x + \cos6x) = 0$;
 $2\cos5x \cos3x + 2\cos5x \cos x = 0$; $\cos5x(\cos3x + \cos x) = 0$;
 $\cos5x = 0$ или $\cos3x + \cos x = 0$;

$$5x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z;$$

$$2\cos2x \cos x = 0;$$

$$x = \frac{\pi}{10}(1 + 2m), m \in Z;$$

$$1) \cos2x = 0; 2x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z;$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k, k \in Z;$$

$$2) \cos x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z.$$

Ответ: $\frac{\pi}{10}(1 + 2m)$; $\frac{\pi}{4}(1 + 2k)$; $\frac{\pi}{2}(1 + 2n)$, $k, m, n \in Z$.

6.37. $\cos^23x + \cos^24x + \cos^25x = 1,5$; $1 + \cos6x + 1 + \cos8x + 1 + \cos10x = 3$;
 $(\cos6x + \cos10x) + \cos8x = 0$; $2\cos8x \cos2x + \cos8x = 0$; $\cos8x(2\cos2x + 1) = 0$;
 $\cos8x = 0$; или $2\cos2x = -1$;

$$8x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z;$$

$$\cos2x = -\frac{1}{2};$$

$$x = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{8}n, n \in Z; 2x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z; x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z.$$

Ответ: $\frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{8}n$; $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k$, $n, k \in Z$.

6.38. $\cos^2x + \cos^22x = \cos^23x + \cos^24x$; $1 + \cos2x + 1 + \cos4x =$
 $= 1 + \cos6x + 1 + \cos8x$; $\cos2x + \cos4x = \cos6x + \cos8x$;
 $2\cos3x \cos x = 2\cos7x \cos x$; $\cos x(\cos3x - \cos7x) = 0$;
 $\cos x = 0$ или $\cos3x - \cos7x = 0$;

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z;$$

$$2\sin5x \sin2x = 0;$$

$$1) \sin5x = 0; 5x = \pi k; x = \frac{\pi}{5}k, k \in Z;$$

$$2) \sin2x = 0; 2x = \pi m; x = \frac{\pi}{2}n, n \in Z.$$

Ответ: $\frac{\pi}{2}l$; $\frac{\pi}{5}m$, где $l, m \in Z$.

6.39. $2\cos^2 4x - 6\cos^2 2x + 1 = 0;$
 $2\cos^2 4x - 3(1 + \cos 4x) + 1 = 0; 2\cos^2 4x - 3\cos 4x - 2 = 0;$
 $\cos 4x = \frac{3-5}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$ или $\cos 4x = \frac{3+5}{2 \cdot 2} = 2$ -
 $4x = \pm \frac{2}{3}\pi + 2\pi n, n \in Z;$ решений нет, т.к. $|\cos \alpha| \leq 1;$

$x = \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}n, n \in Z.$ Ответ: $\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}n, n \in Z.$

6.40. $\sin 2x + \sin 6x = 3\cos 2x;$
 $2\sin 4x \cos 2x - 3\cos 2x = 0; \cos 2x(2\sin 4x - 3) = 0;$
 $\cos 2x = 0$ или $2\sin 4x - 3 = 0;$
 $2x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z;$ $\sin 4x = \frac{3}{2}$ - решений нет

$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}m, m \in Z.$ т.к. $|\sin \alpha| \leq 1;$

Ответ: $\frac{\pi}{4}(1 + 2m)$, где $m \in Z.$

6.41. $144\cos^4 x - 4\sin^4 x = 9\sin^2 2x;$
 $4\sin^4 x + 36\sin^2 x \cdot \cos^2 x + 81\cos^4 x - 225\cos^4 x = 0;$
 $(2\sin^2 x + 9\cos^2 x - 15\cos^2 x)(2\sin^2 x + 9\cos^2 x + 15\cos^2 x) = 0;$
 $\sin^2 x - 3\cos^2 x = 0 \mid : \cos^2 x$ или $11\cos^2 x + 1 = 0$
 $\operatorname{tg} x = 0 \pm \sqrt{3}$ или решений нет;

$x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in Z;$ Ответ: $\pm \frac{\pi}{3}\pi n, n \in Z.$

6.42. $2(\cos 4x - \sin x \cdot \cos 3x) = \sin 4x + \sin 2x;$
 $2(\cos 4x - \sin x \cdot \cos 3x) = 2\sin 3x \cos x;$
 $\cos 4x = \sin 3x \cos x + \sin x \cos 3x; \cos 4x = \sin 4x \mid : \cos 4x \neq 0;$

$\operatorname{tg} 4x = 1, 4x = \frac{\pi}{4} + \pi n; x = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{4}n, n \in Z.$ Ответ: $\frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{4}n, n \in Z.$

6.43. $\cos 7x + \cos x = 2\cos 3x(\sin 2x - 1);$
 $2\cos 4x \cos 3x - 2\cos 3x(\sin 2x - 1) = 0; \cos 3x(\cos 4x + 1 - \sin 2x) = 0;$
 $\cos 3x = 0$ или $2\cos^2 2x - \sin 2x = 0;$

$3x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z;$ $2\sin^2 2x + \sin 2x - 2 = 0;$

$x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\pi m, m \in Z;$

$$\begin{cases} \sin 2x = \frac{-1-\sqrt{17}}{4} < -1 - \text{решений нет, т.к. } |\sin \alpha| \leq 1, \\ \sin 2x = \frac{-1+\sqrt{17}}{4}; x = \frac{1}{2}(-1)^k \arcsin \frac{\sqrt{17}-1}{4} + \frac{\pi}{2}k, k \in Z. \end{cases}$$

Ответ: $\frac{\pi}{6}(1+2m); \frac{1}{2}(-1)^k \arcsin \frac{\sqrt{17}-1}{4} + \frac{\pi}{2}k, m, k \in Z.$

6.44. $\cos 5x - \cos x = \sin 3x(2\cos 4x + 1);$

$$\sin 3x \sin 2x + \sin 3x \left(\cos 4x + \frac{1}{2} \right) = 0;$$

$$\sin 3x \left(\sin 2x + 1 - 2\sin^2 2x + \frac{1}{2} \right) = 0;$$

$$\sin 3x = 0; 3x = \pi m, m \in Z; x = \frac{\pi}{3}m, m \in Z;$$

или $2\sin^2 2x - \sin 2x - 1,5 = 0;$

$$\begin{cases} \sin 2x = \frac{1-\sqrt{13}}{4} < 1; x = \frac{1}{2}(-1)^k \arcsin \frac{1-\sqrt{13}}{4} + \frac{\pi}{2}k, k \in Z, \\ \sin 2x = \frac{1+\sqrt{13}}{4} > 1 - \text{решений нет.} \end{cases}$$

Ответ: $\frac{\pi}{3}m; \frac{1}{2}(-1)^{k+1} \arcsin \frac{\sqrt{13}-1}{4} + \frac{\pi}{2}k, m, k \in Z.$

6.45. $\cos 3x - \sin x = \sqrt{3}(\cos x - \sin 3x);$

$$\cos 3x + \sqrt{3} \sin 3x = \sin x + \sqrt{3} \cos x;$$

$$\sqrt{3+1} \left(\frac{1}{2} \cos 3x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 3x \right) = \sqrt{3+1} \left(\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right);$$

$$\sin \left(\frac{\pi}{6} + 3x \right) = \sin \left(\frac{\pi}{3} + x \right);$$

$$2 \sin \frac{\frac{\pi}{6} + 3x - \frac{\pi}{3} - x}{2} \cdot \cos \frac{\frac{\pi}{6} + 3x + \frac{\pi}{3} + x}{2} = 0 \quad | : 2;$$

$$\sin \left(x - \frac{\pi}{12} \right) \cos \left(\frac{\pi}{4} + 2x \right) = 0;$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} + 2x\right) = 0 \quad \text{или} \quad \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = 0;$$

$$\frac{\pi}{4} + 2x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in \mathbb{Z}; \quad x - \frac{\pi}{12} = \pi k, k \in \mathbb{Z};$$

$$2x = \frac{\pi}{4} + \pi m, m \in \mathbb{Z}; \quad x = \frac{\pi}{12} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2}m, m \in \mathbb{Z}; \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{8}(1 + 4m); \frac{\pi}{12}(1 + 12k), k, m \in \mathbb{Z}.$$

6.46. $\cos 2x = \sqrt{2}(\cos x - \sin x);$
 $(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x - \sqrt{2}) = 0;$
 $\cos x - \sin x = 0 \quad \text{или} \quad \cos x + \sin x - \sqrt{2} = 0;$
 $\operatorname{tg} x = 1; \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\cos x + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin x = 1;$
 $x = \frac{\pi}{4} + \pi m, m \in \mathbb{Z}; \quad \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = 1; \quad \frac{\pi}{4} + x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$
 $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$

Ответ: $\frac{\pi}{4}(1 + 4m), m \in \mathbb{Z}.$

6.47. $\sin x \cdot \cos 3x = \sin 2x;$
 $\sin x \cos 3x = 2\sin x \cos x; \sin x(\cos 3x - 2\cos x) = 0;$
 $\sin x = 0 \quad \text{или} \quad \cos 3x - 2\cos x = 0;$
 $x = \pi m, m \in \mathbb{Z}; \quad \cos x(4\cos^2 x - 5) = 0;$
 $\cos x = 0 \quad \text{или} \quad 4\cos^2 x = 5;$
 $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \quad \cos^2 x = \frac{5}{4} > 1;$
 решений нет.

Ответ: $\pi m; \frac{\pi}{2} + \pi k, m, k \in \mathbb{Z}.$

6.48. $5\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 2x;$
 $5\left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 - \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2 = \sin^2 2x;$
 $5 - 10\cos 2x + 5\cos^2 2x - 1 - 2\cos 2x - \cos^2 2x = 4\sin^2 2x;$

$$4\cos^2 2x - 12\cos 2x + 4 = 4 - 4\cos^2 2x \mid : 4;$$

$$2\cos^2 2x - 3\cos 2x = 0; \cos 2x(2\cos 2x - 3) = 0;$$

$$\cos 2x = 0; 2x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z; x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k, k \in Z;$$

или $2\cos 2x - 3 = 0; \cos 2x = \frac{3}{2} > 1$ - решений нет, т.к. $|\cos \alpha| \leq 1$.

Ответ: $\frac{\pi}{4}(1 + 2k), k \in Z$.

6.49. $\sin^2 6x + \sin^2 4x = 1; 1 - \cos 12x + 1 - \cos 8x = 2; \cos 12x + \cos 8x = 0;$
 $2\cos 10x \cos 2x = 0;$

$$\begin{cases} \cos 10x = 0, \\ \cos 2x = 0; \end{cases} \begin{cases} 10x = \frac{\pi}{2} + \pi m, \\ 2x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{20}(1 + 2m), m \in Z, \\ x = \frac{\pi}{4}(1 + 2k), k \in Z. \end{cases}$$

Ответ: $\frac{\pi}{20}(1 + 2l), l \in Z$.

6.50. $2\sin 2x = \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x; 2\sin 2x = \frac{1}{\sin x \cos x}; \sin^2 2x = 1;$

$$2\sin^2 2x = 2; 1 - \cos 4x = 2; \cos 4x = -1; 4x = \pi + 2\pi m;$$

$$x = \frac{\pi}{4}(1 + 2n), n \in Z. \text{ Ответ: } \frac{\pi}{4}(1 + 2n), n \in Z.$$

6.51. $\sin 5x = \sin x + \sin 2x;$
 $2\cos 3x \sin 2x - \sin 2x = 0; \sin 2x(2\cos 3x - 1) = 0;$

$$\sin 2x = 0; 2x = \pi m, m \in Z; x = \frac{\pi}{2} m, m \in Z;$$

или $2\cos 3x - 1 = 0; \cos 3x = \frac{1}{2}; x = \pm \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}\pi n, n \in Z.$

Ответ: $\frac{\pi}{2} m; \pm \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}\pi n, m, n \in Z.$

6.52. $6\sin^2 x + 2\sin^2 2x = 5; 3(1 - \cos 2x) + 2(1 - \cos^2 2x) = 5;$

$$3 - 3\cos 2x + 2 - 2\cos^2 2x = 5; 2\cos^2 2x + 3\cos 2x = 0;$$

$$\cos 2x = 0 \quad \text{или} \quad 2\cos 2x = -3;$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z; \quad \cos 2x = -\frac{3}{2} < -1 - \text{решений нет};$$

$$x = \frac{\pi}{4}(1 + 2m), m \in Z. \text{ Ответ: } \frac{\pi}{4}(1 + 2m), m \in Z.$$

6.53. $\cos^2 6x - \sin^2 3x - 1 = 0;$

$$\cos^2 6x - \frac{1 - \cos 6x}{2} - 1 = 0; 2\cos^2 6x + \cos 6x - 3 = 0.$$

Пусть $\cos 6x = y$, тогда $2y^2 + y - 3 = 0; y_1 = 1, y_2 = -\frac{3}{2};$

$$\cos 6x = 1; 6x = 2\pi n, n \in Z; x = \frac{\pi}{3}n, n \in Z;$$

или $\cos 6x = -\frac{3}{2} < -1$ - решений нет, т.к. $|\cos \alpha| \leq 1$.

Ответ: $\frac{\pi}{3}n, n \in Z$.

6.54. $\cos x - \cos 3x = 3\sin^2 x;$
 $2\sin 2x \sin x = 3\sin^2 x; 4\sin^2 x \cos x - 3\sin^2 x = 0; \sin^2 x(4\cos x - 3) = 0;$
 $\sin^2 x = 0$ или $4\cos x - 3 = 0;$

$$x = \pi n, n \in Z; \cos x = \frac{3}{4}; x = \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi k, k \in Z.$$

Ответ: $\pi n, \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi k, m, k \in Z$.

6.55. $\cos^4 2x + 6\cos^2 2x = \frac{25}{16};$

$16\cos^4 2x + 96\cos^2 2x - 25 = 0$. Пусть $\cos^2 2x = y$, тогда

$$16y^2 + 96y - 25 = 0; \frac{1}{4}D = 48^2 + 25 \cdot 16 = 2304 + 400 = 2704;$$

$$y_1 = \frac{-48 - 52}{16} = -\frac{25}{4}, y_2 = \frac{-48 + 52}{16} = \frac{1}{4};$$

$$\cos^2 2x = -\frac{25}{4} \quad \text{или} \quad \cos^2 2x = \frac{1}{4}; 2\cos^2 2x = \frac{1}{2};$$

решений нет; $1 + \cos 4x = \frac{1}{2}; \cos 4x = -\frac{1}{2};$

$$4x = \pm \frac{2}{3}\pi + 2\pi k; x = \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}k, k \in Z.$$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}k, k \in Z$.

6.56. $3\operatorname{tg}^2 x - 8\cos^2 x + 1 = 0; 3\frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} - 8\frac{1 + \cos 2x}{2} + 1 = 0;$

$$\cos 2x \neq -1, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z;$$

$$3 - 3\cos 2x - 4 - 8\cos 2x - 4\cos^2 2x + 1 + \cos 2x = 0;$$

$$4\cos^2 2x + 10\cos 2x = 0 \mid : 4; \cos 2x(\cos 2x + 2,5) = 0;$$

$$\cos 2x = 0 \quad \text{или} \quad \cos 2x + 2,5 = 0;$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z; \quad \cos 2x = -2,5 - \text{нет решений.}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} m, m \in Z; \quad |\cos \alpha| \leq 1.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{4}(1 + 2m), m \in Z.$$

$$6.57. 2\operatorname{tg}^2 x + 4\cos^2 x = 7; \quad 2\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 4\cos^2 x = 7; \quad \cos^2 x \neq 0;$$

$$2\sin^2 x + 4\cos^4 x - 7\cos^2 x = 0; \quad 4\cos^4 x - 7\cos^2 x - 2\cos^2 x + 2 = 0;$$

$$4\cos^4 x - 9\cos^2 x + 2 = 0; \quad \cos^2 x = t; \quad 4t^2 - 9t + 2 = 0;$$

$$D = 81 - 32 = 49; \quad t_1 = \frac{9-7}{8} = \frac{1}{4}, \quad t_2 = \frac{9+7}{8} = 2;$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{4} \quad \text{или} \quad \cos 2x = 2 - \text{решений нет,}$$

$$2\cos^2 x = \frac{1}{2}; \quad 1 + \cos 2x = \frac{1}{2}; \quad \text{т.к. } |\cos \alpha| \leq 1;$$

$$\cos 2x = -\frac{1}{2}; \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in Z. \quad \text{Ответ: } \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in Z.$$

$$6.58. \operatorname{ctg}^2 x - 8\sin^2 x = 1; \quad \sin x \neq 0; \quad x \neq \pi, n \in Z;$$

$$\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} - 8\sin^2 x = 1; \quad \cos^2 x - 8\sin^4 x - \sin^2 x = 0;$$

$$8\sin^4 x + \sin^2 x - 1 + \sin^2 x = 0; \quad 8\sin^4 x + 2\sin^2 x - 1 = 0;$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{4} \quad \text{или} \quad \sin^2 x = -\frac{1}{2} - \text{решений нет,}$$

$$1 - \cos 2x = \frac{1}{2}; \quad \cos 2x = \frac{1}{2}; \quad x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z.$$

$$6.59. 9\operatorname{ctg}^2 x + 4\sin^2 x = 6; \quad 9\cos^2 x + 4\sin^4 x - 6\sin^2 x = 0;$$

$$4\sin^4 x + 9 - 9\sin^2 x - 6\sin^2 x = 0; \quad 4\sin^4 x - 15\sin^2 x + 9 = 0;$$

Пусть $\sin^2 x = y$, тогда $4y^2 - 15y + 9 = 0$; $D = 225 - 144 = 81$;

$$y_1 = \frac{15-9}{8} = \frac{3}{4}, \quad y_2 = \frac{15+9}{8} = 3;$$

$$\sin^2 x = \frac{3}{4} \quad \text{или} \quad \sin^2 x = 3 - \text{решений нет, т.к. } |\sin \alpha| \leq 1;$$

$$\sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in Z. \quad \text{Ответ: } x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in Z.$$

6.60. $1 - \cos 6x = \operatorname{tg} 3x$; $2\sin^2 3x = \operatorname{tg} 3x$; $\sin 3x(2\sin 3x \cos 3x - 1) = 0$;
 $\sin 3x(\sin 6x - 1) = 0$;

$$\sin 3x = 0; \quad 3x = \pi m, m \in Z; \quad x = \frac{\pi}{3} m, m \in Z;$$

$$\text{или } \sin 6x - 1 = 0; \quad \sin 6x = 1; \quad 6x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in Z; \quad x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3} n, n \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{3} m, \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3} n, m, n \in Z.$$

6.61. $\cos x - \cos 3x = \sin 2x$;
 $2\sin 2x \cdot \sin x - \sin 2x = 0$; $\sin 2x(2\sin x - 1) = 0$;

$$\sin 2x = 0; \quad 2x = \pi m, m \in Z; \quad x = \frac{\pi}{2} m, m \in Z;$$

$$\text{или } 2\sin x - 1 = 0; \quad \sin x = \frac{1}{2}; \quad x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{2} m; \quad (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, m, k \in Z.$$

6.62. $\cos 2x - \cos 4x = \sin 6x$;
 $2\sin 3x \sin x - 2\sin 3x \cos 3x = 0$; $\sin 3x(\sin x - \cos 3x) = 0$;

$$\sin 3x = 0; \quad 3x = \pi m, m \in Z; \quad x = \frac{\pi}{3} m, m \in Z;$$

$$\text{или } \sin x - \cos 3x = 0; \quad \sin x - \sin\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) = 0; \quad 2\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 0;$$

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 0, & \left[\frac{\pi}{4} - x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z, \right. \\ \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 0; & \left. \left[2x - \frac{\pi}{4} = \pi n; \quad x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2} n, n \in Z. \right. \right. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{3} m; \quad \pi k - \frac{\pi}{4}; \quad \frac{\pi}{8}(1 + 4n), m, k, n \in Z.$$

$$6.63. \sin 2x = \cos^4 \frac{x}{2} - \sin^4 \frac{x}{2};$$

$$\sin 2x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}; \quad \sin 2x = \cos x; \quad \cos x(2\sin x - 1) = 0;$$

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ 2\sin x = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z, \\ x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{2}(1 + 2m); \quad (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad m, k \in Z.$$

$$6.64. \sin^2 x = \cos^4 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}; \quad \sin^2 x = \cos x; \quad 1 - \cos^2 x = \cos x;$$

$$\cos^2 x + \cos x - 1 = 0;$$

$$\cos x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{или} \quad \cos x = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} < -1;$$

$$x = \pm \arccos \frac{\sqrt{5} - 1}{2} + 2\pi k, k \in Z; \quad \text{нет решений, т.к. } |\cos \alpha| \leq 1.$$

$$\text{Ответ: } \pm \arccos \frac{\sqrt{5} - 1}{2} + 2\pi k, k \in Z;$$

$$6.65. \cos 2x = 2(\cos x - \sin x); \quad \cos^2 x - \sin^2 x = 2(\cos x - \sin x);$$

$$(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x - 2) = 0;$$

$$\cos x - \sin x = 0 \quad \text{или} \quad \cos x + \sin x = 2;$$

$$\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 0; \quad \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = 2;$$

$$\frac{\pi}{4} - x = \pi k; \quad \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \sqrt{2} \text{ - решений нет,}$$

$$x = \frac{\pi}{4} - \pi k, k \in Z; \quad \text{т.к. } |\cos \alpha| \leq 1.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{4} - \pi k, k \in Z;$$

$$6.66. (\cos 6x - 1) \operatorname{ctg} 3x = \sin 3x; \quad \sin 3x \neq 0, \quad x \neq \frac{\pi}{3}, k \in Z;$$

$$-2\sin^2 3x \frac{\cos 3x}{\sin 3x} - \sin 3x = 0; \quad |\sin 3x$$

$$2 \cos 3x = -1; 3x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z$$

$$x = \pm \frac{2}{9}\pi + \frac{2}{3}\pi n, n \in Z$$

Ответ: $\pm \frac{2}{9}\pi + \frac{2}{3}\pi n, n \in Z$.

6.67. $\sin x \sin 5x = \cos 4x$; $\cos 4x - \cos 6x = 2 \cos 4x$;
 $\cos 4x + \cos 6x = 0$; $2 \cos 5x \cos x = 0$;

$$\begin{cases} \cos 5x = 0, \\ \cos x = 0; \end{cases} \begin{cases} 5x = \frac{\pi}{2} + \pi m, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi k; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + \frac{\pi}{5}m, m \in Z, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z. \end{cases}$$

Ответ: $\frac{\pi}{10} + \frac{\pi}{5}m$; $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $m, k \in Z$.

6.68. $\cos x \cos 3x = \cos 2x$; $\cos 4x + \cos 2x - 2 \cos 2x = 0$;

$$\cos 4x - \cos 2x = 0; -2 \sin 3x \sin x = 0;$$

$$\sin 3x = 0 \quad \text{или} \quad \sin x = 0;$$

$$3x = \pi m, m \in Z; \quad x = \pi n, n \in Z.$$

$$x = \frac{\pi}{3}m, m \in Z; \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{3}k, k \in Z.$$

6.69. $3 \cos x + 2 \operatorname{tg} x = 0$; $\cos x \neq 0$; $3 \cos^2 x + 2 \sin x = 0$;

$$3 - 3 \sin^2 x + 2 \sin x = 0; 3 \sin^2 x - 2 \sin x - 3 = 0.$$

Пусть $\sin x = y$, тогда имеем: $3y^2 - 2y - 3 = 0$; $\frac{D}{4} = 1 + 9 = 10$;

$$y_1 = \frac{1 - \sqrt{10}}{3}; \quad y_2 = \frac{1 + \sqrt{10}}{3};$$

$$\sin x = \frac{1 - \sqrt{10}}{3} \quad \text{или} \quad \sin x = \frac{1 + \sqrt{10}}{3}, \text{ решений нет,}$$

$$x = (-1)^{k+1} \arcsin \frac{\sqrt{10} - 1}{3} + \pi k, k \in Z; \quad \text{т.к. } |\sin \alpha| \leq 1.$$

Ответ: $(-1)^{k+1} \arcsin \frac{\sqrt{10} - 1}{3} + \pi k, k \in Z$;

6.70. $5 \sin x - 4 \operatorname{ctg} x = 0$; $\sin x \neq 0$;

$$5 - 5 \cos^2 x - 4 \cos x = 0; 5 \cos^2 x + 4 \cos x - 5 = 0;$$

$$\cos x = y;$$

$$5y^2 + 4y - 5 = 0; \quad \frac{D}{4} = 4 + 25 = 29;$$

$$y_1 = \frac{-2 - \sqrt{29}}{5}; \quad y_2 = \frac{-2 + \sqrt{29}}{5};$$

$$\cos x = \frac{\sqrt{29} - 2}{5} \quad \text{или} \quad \cos x = \frac{-2 - \sqrt{29}}{5} < -1, \text{ решений нет,}$$

$$x = \pm \arccos \frac{\sqrt{29} - 2}{5} + 2\pi k, k \in Z; \quad \text{т.к. } |\sin \alpha| \leq 1.$$

$$\text{Ответ: } \pm \arccos \frac{\sqrt{29} - 2}{5} + 2\pi k, k \in Z.$$

$$6.71. 8\sin^2 x + 4\sin^2 2x = 5 - 8\cos 2x; \quad 4(1 - \cos 2x) + 4(1 - \cos^2 2x) + 8\cos 2x - 5 = 0; \quad 4\cos^2 2x - 4\cos 2x - 3 = 0;$$

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \quad \text{или} \quad \cos 2x = \frac{3}{2} > 1 - \text{нет решений,}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi m, m \in Z; \quad \text{т.к. } |\cos \alpha| \leq 1.$$

$$\text{Ответ: } \pm \frac{\pi}{3} + \pi m, m \in Z.$$

$$6.72. 2\sin^2 x = 4\sin^2 2x + 7\cos 2x - 6;$$

$$1 - \cos 2x - 4 + 4\cos^2 2x - 7\cos 2x + 6 = 0;$$

$$4\cos^2 2x - 8\cos 2x + 3 = 0, \text{ пусть } \cos 2x = y, \text{ тогда}$$

$$4y^2 - 8y + 3 = 0; \quad \frac{D}{4} = 16 - 12 = 4; \quad y_1 = \frac{1}{2}, \quad y_2 = \frac{3}{2};$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad \cos 2x = \frac{3}{2} - \text{решений нет,}$$

$$2x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, m \in Z; \quad \text{т.к. } |\cos \alpha| \leq 1;$$

$$x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi m, m \in Z. \quad \text{Ответ: } \pm \frac{\pi}{6} + \pi m, m \in Z.$$

$$6.73. \operatorname{tg} x(1 - 2\sin x) - 2\cos x = \sqrt{3}; \quad \cos x \neq 0;$$

$$\sin x - 2\sin^2 x - 2\cos^2 x - \sqrt{3}\cos x = 0;$$

$$\sin x - \sqrt{3}\cos x - 2 = 0; \quad \sin x - \sqrt{3}\cos x = 2;$$

$$\frac{1}{2}\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x = 1; \quad \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1; \quad x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z;$$

$$x = \frac{5}{6}\pi + 2\pi k, k \in Z. \quad \text{Ответ: } \frac{5}{6}\pi + 2\pi k, k \in Z.$$

$$6.74. \quad \sqrt{3}\sin 2x + 2\sin^2 x - 1 = 2\cos x;$$

$$-\cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) - \cos x = 0; \quad \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) + \cos x = 0;$$

$$2\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{3}{2}x\right)\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{x}{2}\right) = 0;$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{3}{2}x\right) = 0 \quad \text{или} \quad \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{x}{2}\right) = 0;$$

$$\frac{\pi}{6} + \frac{3}{2}x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z; \quad \frac{\pi}{6} + \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z;$$

$$x = \frac{2}{9}\pi - \frac{2}{3}\pi k, k \in Z; \quad x = \frac{2}{3}\pi + 2\pi m, m \in Z.$$

$$\text{Ответ: } \frac{2}{9}\pi(1 + 3k); \frac{2}{3}\pi(1 + 3m), k, m \in Z.$$

$$6.75. \quad \sqrt{3}\sin 2x + 2\cos^2 x - 1 = 2\sin x;$$

$$\sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x = 2\sin x; \quad \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin x;$$

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \sin x = 0; \quad 2\sin\frac{2x + \frac{\pi}{6} - x}{2}\cos\frac{2x + \frac{\pi}{6} + x}{2} = 0;$$

$$\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12}\right) = 0 \quad \text{или} \quad \cos\left(\frac{3}{2}x + \frac{\pi}{12}\right) = 0;$$

$$\frac{x}{2} = -\frac{\pi}{12} + \pi n, n \in Z; \quad \frac{3}{2}x = -\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z;$$

$$\text{Ответ: } -\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5}{18}\pi + \frac{2}{3}\pi m, m \in Z.$$

$$6.76. \quad -\operatorname{ctgx}(2\cos x + \sqrt{3}) = 2\sin x; \quad \sin x \neq 0;$$

$$-2\cos^2 x - \sqrt{3}\cos x - 2\sin^2 x = 0;$$

$$\sqrt{3} \cos x = -2; \quad \cos x = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ - решений нет, т.к. } \frac{2\sqrt{3}}{3} > 1.$$

Ответ: решений нет.

$$6.77. \sqrt{10} \cos x - \sqrt{4 \cos x - \cos 2x} = 0;$$

$$\sqrt{10} \cos x = \sqrt{4 \cos x - \cos 2x}; \quad \begin{cases} 10 \cos^2 x = 4 \cos x - \cos 2x, \\ 0 \leq \cos x \leq 1; \end{cases}$$

$$10 \cos^2 x - 4 \cos x + \cos 2x = 0, \quad 12 \cos^2 x - 4 \cos x - 1 = 0,$$

$$\cos x = t; \quad 12t^2 - 4t - 1 = 0; \quad \frac{D}{4} = 4 + 12 = 16; \quad t_1 = \frac{1}{2}; \quad t_2 = -\frac{1}{6};$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \text{ или } \cos x = -\frac{1}{6}; \quad \cos x = \frac{1}{2}; \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

$$6.78. \sqrt{5} \sin 2x - \sqrt{1 + 8 \sin x \cos x} = 0;$$

$$\sqrt{5} \sin 2x = \sqrt{1 + 8 \sin x \cos x}; \quad \sqrt{5} \sin 2x = \sqrt{1 + 4 \sin 2x};$$

$$\begin{cases} 5 \sin^2 2x - 4 \sin 2x - 1 = 0, \\ 0 \leq \sin 2x \leq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin 2x = 1, \\ \sin 2x = -\frac{1}{5}, \\ 0 \leq \sin 2x \leq 1, \end{cases} \quad \text{значит, } \sin 2x = 1;$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$6.79. 4 \sin 3x \sin x + 2 \cos 2x + 1 = 0; \quad 2 \cos 2x - 2 \cos 4x + 2 \cos 2x + 1 = 0;$$

$$4 \cos 2x - 2(2 \cos^2 2x - 1) + 1 = 0; \quad 4 \cos^2 2x - 4 \cos 2x - 3 = 0; \quad \cos 2x = y;$$

$$4y^2 - 4y - 3 = 0; \quad \frac{D}{4} = 4 + 12 = 16; \quad y_1 = -\frac{1}{2}, \quad y_2 = 1,5;$$

$$1) \cos 2x = 1,5 \text{ - корней нет, т.к. } |\cos y| \leq 1;$$

$$2) \cos 2x = -\frac{1}{2}; \quad 2x = \pm \frac{2}{3} \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{3}.$$

$$6.80. 8 \cos 6x \cos 2x + 2 \sin^2 4x - 3 = 0;$$

$$8 \cdot \frac{1}{2} (\cos 4x + \cos 8x) + 2 \sin^2 4x - 3 = 0; \quad 3 \cos 8x + 4 \cos 4x - 2 = 0;$$

$$3(2 \cos^2 4x - 1) + 4 \cos 4x - 2 = 0; \quad 6 \cos^2 4x + 4 \cos 4x - 5 = 0; \quad \cos 4x = y;$$

$$6y^2 + 4y - 5 = 0; \quad \frac{D}{4} = 4 + 30 = 34; \quad y_1 = \frac{-2 - \sqrt{34}}{6}; \quad y_2 = \frac{-2 + \sqrt{34}}{6};$$

$$1) \cos 4x = \frac{-2 - \sqrt{34}}{6} - \text{нет корней, т.к. } \left| \frac{-2 - \sqrt{34}}{6} \right| > 1;$$

$$2) \cos 4x = \frac{-2 + \sqrt{34}}{6}; \quad x = \pm \frac{1}{4} \arccos \frac{\sqrt{34} - 2}{6} + \frac{\pi}{2} n, n \in \mathbb{Z}.$$

При $n = 0$; $x = \frac{1}{4} \arccos \frac{\sqrt{34} - 2}{6}$ - наименьший положительный корень.

Т.к. $0 < \frac{1}{4} \arccos \frac{\sqrt{34} - 2}{6} < \frac{\pi}{4}$, а если $n = 1$ и

$$x = -\frac{1}{4} \arccos \frac{\sqrt{34} - 2}{6} + \frac{\pi}{2}, \text{ то } \frac{\pi}{4} < -\frac{1}{4} \arccos \frac{\sqrt{34} - 2}{6} + \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2}, \text{ т.е.}$$

$$x = -\frac{1}{4} \arccos \frac{\sqrt{34} - 2}{6} + \frac{\pi}{2} \text{ не является наименьшим положитель-$$

ным корнем. Ответ: $\frac{1}{4} \arccos \frac{\sqrt{34} - 2}{6}$.

$$\mathbf{6.81.} \sin 4x + 2\cos^2 x = 1, |x| < 1; \quad \sin 4x + 2\cos^2 x - 1 = 0;$$

$$\sin 4x + \cos 2x = 0; \quad \cos 2x(2\sin 2x + 1) = 0;$$

$$\cos 2x = 0 \quad \text{или} \quad 2\sin 2x = -1;$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in \mathbb{Z};$$

$$2x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} m, m \in \mathbb{Z};$$

$$x = (-1)^{k+1} \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ при } m = 0; \quad x = -\frac{\pi}{4} \text{ при } m = -1; \quad x = -\frac{\pi}{12} \text{ при } k = 0.$$

$$\text{Ответ: } \pm \frac{\pi}{4}; \quad -\frac{\pi}{12}.$$

$$\mathbf{6.82.} 2\sin^2 x + \cos 4x = 1, |x| < 1; \quad \cos 4x = 1 - 2\sin^2 x; \quad \cos 4x = \cos 2x;$$

$$2\cos^2 2x - 1 = \cos 2x; \quad 2\cos^2 2x - \cos 2x - 1 = 0;$$

$$\begin{cases} \cos 2x = 1, \\ \cos 2x = -\frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x = 2\pi n, \\ 2x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Условию $|x| < 1$ удовлетворяет только число $x = 0$ при $n = 0$.

Ответ: 0.

6.83. $\sin x = x^2 + 2x + 2$. Т.к. $|\sin x| \leq 1$, то $|x^2 + 2x + 2| \leq 1$;

$$\begin{cases} x^2 + 2x + 2 \leq 1, \\ x^2 + 2x + 2 \geq -1; \end{cases} \quad \begin{cases} (x+1)^2 \leq 0, \\ (x+1)^2 + 2 \geq 0; \end{cases} \quad x = -1. \text{ Проверкой убежда-}$$

емся, что число -1 не является корнем уравнения.

Ответ: корней нет.

6.84. $\cos x = x^2 - 2x + 2$;

$$\begin{cases} x^2 - 2x + 2 \geq -1, \\ x^2 - 2x + 2 \leq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - 2x + 3 \geq 0, \\ x^2 - 2x + 1 \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (x-1)^2 + 2 \geq 0, \\ (x-1)^2 \leq 0; \end{cases} \quad x = 1.$$

Проверкой убеждаемся, что 1 не является корнем данного уравнения. Ответ: корней нет.

6.85. $8\sin x = x^2 - 10x + 33$; $|8\sin x| \leq 8$, значит, $-8 \leq x^2 - 10x + 33 \leq 8$;

$$-8 \leq (x-5)^2 + 8 \leq 8; \quad \begin{cases} (x-5)^2 + 8 \geq -8, \\ (x-5)^2 + 8 \leq 8; \end{cases} \quad \begin{cases} (x-5)^2 + 16 \geq 0, \\ (x-5)^2 \leq 0; \end{cases} \quad x = 5.$$

При $x = 5$ имеем $8\sin x < 0$, а $x^2 - 10x + 33 > 0$. Ответ: нет корней.

6.86. $2\cos x = -x^2 + 12x - 37$.



Так как $|\cos x| \leq 1$, то $|2\cos x| \leq 2$;
 $-2 \leq -x^2 + 12x - 37 \leq 2$; $-2 \leq -(x-6)^2 - 1 \leq 2$;
 $-1 \leq -(x-6)^2 \leq 3$; $-3 \leq (x-6)^2 \leq 1$;

$$\begin{cases} (x-6)^2 \geq -3, \\ (x-6)^2 \leq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} (x-6)^2 + 3 \geq 0, \\ x^2 - 12x + 35 \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (x-6)^2 \geq -3, \\ (x-5)(x-7) \leq 0; \end{cases}$$

$5 \leq x \leq 7$. Если $x \in [5; 7]$, $\cos x > 0$, а значит, и $2\cos x > 0$;
 $-x^2 + 12x - 37 < 0$, так как $-x^2 + 12x - 37 = -(x-6)^2 - 1$.

Это означает, что данное уравнение не имеет корней.

Ответ: нет корней.

6.87. $\sin \frac{\pi}{2} x = x^2 - 2x + 2$; $1 \cdot x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1$;

Видно что равенство (1) может иметь место только при $x = 1$.

$\sin \frac{\pi}{2} = 1$; — верно. Ответ: 1.

6.88. $\sin \frac{\pi}{2} x = 12x - 37 - x^2$.

$$12x - 37 - x^2 = -1 - (x^2 - 12x + 36) = -1 - (x-6)^2.$$

Значит, $12x - 37 - x^2 \leq -1$. Так как $\left| \sin \frac{\pi}{2} \right| \leq 1$, то единственным

корнем уравнения может быть $x = 6$. Проверкой убеждаемся, что $x = 6$ не является корнем уравнения. Ответ: нет корней.

6.89. $4^{-\frac{x+1}{2}} - 7 \cdot 2^{-x} = 4$; $2 \cdot 4^{-x} - 7 \cdot 2^{-x} - 4 = 0$. Замена $t = 2^{-x}$, $t > 0$;

$2t^2 - 7t - 4 = 0$; $D = 81$; $t_1 = 4$; $t_2 = -\frac{1}{2}$; $2^{-x} = 4$; $x = -2$. Ответ: -2.

6.90. $3^{6x-3} = 2 \cdot 27^{\frac{x-2}{3}} + 1$; $27^{2x-1} = 2 \cdot 27^{\frac{x-2}{3}} + 1$;

$\frac{1}{27} \cdot 27^{2x} = 2 \cdot \frac{1}{9} \cdot 27^x + 1$; замена $t = 27^x$, $t > 0$; $\frac{t^2}{27} - \frac{2}{9} \cdot t - 1 = 0$;

$t^2 - 6t - 27 = 0$; $t_1 = 9$, $t_2 = -3$; $27^x = 9$; $3^{3x} = 3^2$, $x = \frac{2}{3}$. Ответ: $\frac{2}{3}$.

6.91. $4^{3x^2+x} - 8 = 2 \cdot 8^{\frac{x^2+x}{3}}$; $64^{\frac{x^2+x}{3}} - 8 = 2 \cdot 8^{\frac{x^2+x}{3}} = 0$; $8^{\frac{x^2+x}{3}} = t$, $t > 0$;

$t^2 - 2t - 8 = 0$; $t_1 = 4$, $t_2 = -2$; $8^{\frac{x^2+x}{3}} = 4$; $2^{3x^2+x} = 2^2$;

$3x^2 + x = 2$; $3x^2 + x - 2 = 0$; $x_1 = -1$, $x_2 = \frac{2}{3}$. Ответ: -1; $\frac{2}{3}$.

6.92. $2^{6x} + 8^{\frac{x+2}{3}} = 5$; $2^{6x} + 4 \cdot 2^{3x} - 5 = 0$; $2^{3x} = t$, $t > 0$;

$t^2 + 4t - 5 = 0$; $t_1 = -5$, $t_2 = 1$; $2^{3x} = 1$; $x = 0$. Ответ: 0.

6.93. $64^x + 2^{2+3x} - 12 = 0$; $8^{2x} + 2^2 \cdot (2^3)^x - 12 = 0$; $8^x = t$, $t > 0$;

$t^2 + 4t - 12 = 0$; $t_1 = -6$, $t_2 = 2$; $8^x = 2$; $2^{3x} = 2$; $x = \frac{1}{3}$. Ответ: $\frac{1}{3}$.

6.94. $4^{\sqrt{x-2}} + 16 = 10 \cdot 2^{\sqrt{x-2}}$; замена $t = 2^{\sqrt{x-2}}$, $t > 0$;

$t^2 - 10t + 16 = 0$; $t_1 = 2$, $t_2 = 8$;

1) $2^{\sqrt{x-2}} = 2$; $\sqrt{x-2} = 1$; $x - 2 = 1$; $x_1 = 3$;

2) $2^{\sqrt{x-2}} = 8$; $\sqrt{x-2} = 3$; $x - 2 = 9$; $x_2 = 11$. Ответ: 3; 11.

6.95. $4^{2|x-3} - 3 \cdot 4^{|x-2} - 1 = 0$, замена $t = 4^{|x|}$, $t > 0$;

$\frac{1}{64} \cdot t^2 - \frac{3}{16} t - 1 = 0$; $t^2 - 12t - 64 = 0$; $t_1 = -4$, $t_2 = 16$;

$4^{|x|} = 16$; $|x| = 2$; $x = \pm 2$. Ответ: ± 2 .

6.96. $8^x + 18^x = 2 \cdot 27^x$ ($18^x \neq 0$);

$$\frac{2^{3x}}{2^x \cdot 3^{2x}} + 1 = 2 \cdot \frac{3^{3x}}{2^x \cdot 3^{2x}}; \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} + 1 = 2\left(\frac{3}{2}\right)^x; \text{ замена } t = \left(\frac{2}{3}\right)^x,$$

$t > 0$; $t^2 + 1 = \frac{2}{t}$; $t^3 + 1 - 2 = 0$, $t = 1$ – корень уравнения.

$t^3 - t - 2 = (t-1)(t^2 + t + 2)$; $t^2 + t + 2 = 0$; $D = -7 < 0$ – решений нет;

$t = 1$; $\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1$; $x = 0$. Ответ: 0.

6.97. $2x^3 = -18 - x$; $2x^3 + 18 + x = 0$; $x = -2$;

$2x^3 + 18 + x = (x+2)(2x^2 - 4x + 9)$.

Решим $2x^2 - 4x + 9 = 0$; $\frac{D}{4} = 4 - 18 < 0$ – решений нет.

Ответ: -2.

6.98. $x^3 + 33 = -2x$; $x^3 + 2x + 33 = 0$; $x = -3$ – корень уравнения.

$x^3 + 2x + 33 = (x+3)(x^2 - 3x + 11)$;

$x^2 - 3x + 11 = 0$; $D = 9 - 44 = -35 < 0$. Значит, корней нет.

Ответ: -3.

6.99. $x^5 + 2x^3 = 48$; $x^5 + 2x^3 - 48 = 0$, $x = 2$ – корень уравнения.

$x^5 + 2x^3 - 48 = (x-2)(x^4 + 2x^3 + 6x^2 + 12x + 24)$;

$x^4 + 2x^3 + 6x^2 + 12x + 24 = x^2(x^2 + 2x + 1) + (4x^2 + 12x + 9) +$

$+ 15 + x^2 = x^2 + x^2(x+1)^2 + (2x+3)^2 + 15 > 0$. Следовательно, уравнение

$x^4 + 2x^3 + 6x^2 + 12x + 24 = 0$ корней не имеет.

Ответ: 2.

6.100. $x^5 + 4x = -40$; $x^5 + 4x + 40 = 0$, $x = -2$ – корень уравнения.

$x^5 + 4x + 40 = (x+2)(x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 20)$;

$x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 20 = (x^4 - 2x^3 + x^2) + 2x^2 + x^2 - 8x + 16 + 4 =$

$= x^2(x-1)^2 + 2x^2 + (x-4)^2 + 4 > 0$. Следовательно, уравнение

$x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 20 = 0$ корней не имеет. Ответ: -2.

6.101. $2^x + x = 3$; $y_1 = 2^x$; $y_2 = 3 - x$. Ответ: 1.

6.102. $2^x = 6 - x$. Ответ: 2.

6.103. $2^{x+1} + x = -\frac{3}{2}$; $2^{x+1} = -x - \frac{3}{2}$. Ответ: -2.

6.104. $2^x = -\frac{1}{2} - x$. Ответ: -1.

6.105. $\left(15^{x^2+x-2}\right)^{\sqrt{x-4}} = 1$;

$15^{(x^2+x-2)\sqrt{x-4}} = 1$, откуда $(x^2 + x - 2)\sqrt{x-4} = 0$;

$$\begin{cases} x^2 + x - 2 = 0, \\ x - 4 \geq 0, \\ x = 4; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -2, \\ x = 1, \\ x - 4 \geq 0, \\ x = 4; \end{cases} \quad x = 4.$$

Ответ: 4.

6.106. $(0,7^{x-4})^{\sqrt{x^2-2x-15}} = 1. \quad (x-4)\sqrt{x^2-2x-15} = 0;$

$$\begin{cases} x = 4, \\ x^2 - 2x - 15 \geq 0, \\ x^2 - 2x - 15 = 0; \end{cases} \quad x^2 - 2x - 15 = 0; x_1 = -3, x_2 = 5.$$

Ответ: -3; 5.

6.107. $(17^{\sqrt{x^2+2x-8}})^{x+3} = 0.$ При данном условии решений нет. Воз-

можно, условие должно быть таким: $(17^{\sqrt{x^2+2x-8}})^{x+3} = 1.$

$$\sqrt{x^2 + 2x - 8}(x + 3) = 0;$$

$$\begin{cases} x = -3, \\ x^2 + 2x - 8 \geq 0, \\ x^2 + 2x - 8 = 0; \end{cases} \quad x^2 + 2x - 8 = 0; x_1 = -4, x_2 = 2.$$

Ответ: -4; 2.

6.108. $\begin{cases} \frac{1}{2x-3y} + \frac{2}{3x-2y} = \frac{3}{4}, \\ \frac{3}{2x-3y} + \frac{4}{3x-2y} = 1. \end{cases}$ Заменяем $u = \frac{1}{2x-3y}; v = \frac{1}{3x-2y};$

$$\begin{cases} u + 2v = \frac{3}{4}, \\ 3u + 4v = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} u = \frac{3}{4} - 2v, \\ \frac{9}{4} - 2v = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} u = -\frac{1}{2}, \\ v = \frac{5}{8}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = -2, \\ 3x - 2y = \frac{8}{5}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{3y-2}{2}, \\ \frac{3}{2}(3y-2) - 2y = \frac{8}{5}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{3y-2}{2}, \\ \frac{5}{2}y = \frac{23}{5}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{44}{25}, \\ y = \frac{46}{25}. \end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{44}{25}; \frac{46}{25}\right).$

$$6.109. \begin{cases} \frac{1}{x+y} - \frac{10}{x-y} = 1, \\ \frac{1}{x+y} + \frac{2}{x-y} = -\frac{3}{5}. \end{cases} \text{ Заменяем } u = \frac{1}{x+y}; v = \frac{1}{x-y};$$

$$\begin{cases} u - 10v = 1, \\ u + 2v = -\frac{3}{5}. \end{cases} \begin{cases} u = 1 + 10v, \\ 12v = -\frac{8}{5}; \end{cases} \begin{cases} u = -\frac{1}{3}, \\ v = -\frac{2}{15}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = -3, \\ x - y = -\frac{15}{2}; \end{cases} \begin{cases} y = -3 - x, \\ 2x = -\frac{21}{2}; \end{cases} \begin{cases} y = \frac{9}{4}, \\ x = -\frac{21}{4}. \end{cases} \text{ Ответ: } \left(-\frac{21}{4}; \frac{9}{4} \right).$$

6.110.

$$\begin{cases} 2x - 2y = 3xy, \\ 4x^2 + 4y^2 = 5x^2y^2. \end{cases} \begin{cases} 4x^2 - 8xy + 4y^2 = 9x^2y^2, \\ 4x^2 + 4y^2 = 5x^2y^2; \end{cases} \begin{cases} -8xy = 4x^2y^2, \\ 4x^2 + 4y^2 = 5x^2y^2. \end{cases}$$

$xy = 0$ или $xy = -2$. Если $xy = 0$, то $x = 0$ и $y = 0$;

$$xy = -2, \text{ т.к. } y \neq 0, \text{ то } x = -\frac{2}{y}; \frac{16}{y^2} + 4y^2 = 20; y^4 - 5y^2 + 4 = 0;$$

$y^2 = 4$ или $y^2 = 1$; $y_{1,2} = \pm 2$, $y_{3,4} = \pm 1$, тогда

$$\begin{cases} y = 2, \\ x = -1; \end{cases} \begin{cases} y = -2, \\ x = 1; \end{cases} \begin{cases} y = 1, \\ x = -2; \end{cases} \begin{cases} y = -1, \\ x = 2. \end{cases}$$

Проверкой убеждаемся, что решениями являются $(-1; 2)$ и $(-2; 1)$.
 Ответ: $(0; 0); (-1; 2); (-2; 1)$.

$$6.111. \begin{cases} 2 + xy = 3x, \\ 4x^2y^2 + 4 = 5x^2; \end{cases} \begin{cases} xy = 3x - 2, \\ 4(3x - 2)^2 + 4 = 5x^2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} xy = 3x - 2, \\ 36x^2 - 48x + 16 + 4 = 5x^2; \end{cases} \begin{cases} xy = 3x - 2, \\ 31x^2 - 48x + 20 = 0; \end{cases}$$

$\frac{D}{4} = 576 - 620 = -54 < 0$ - решений нет. Ответ: решений нет.

$$6.112. \begin{cases} 2xy + 1 = 3y, \\ 12x^2y^2 + 8 = 11y^2. \end{cases} xy = \frac{3y-1}{2}; (xy)^2 = \left(\frac{3y-1}{2} \right)^2.$$

$$\text{Тогда: } 12 \left(\frac{3y-1}{2} \right)^2 + 8 = 11y^2; 27y^2 - 18y - 11y^2 + 11 = 0;$$

$$16y^2 - 18y + 11 = 0; \quad \frac{D}{4} = 81 - 11 \cdot 16 < 0 \quad \text{- решений нет.}$$

Ответ: решений нет.

$$6.113. \begin{cases} 2xy + 2 + x = 0, \\ 4x^2y^2 + 4 = 5x^2. \end{cases} \quad 2xy = -x - 2; \quad 4x^2y^2 = (x + 2)^2.$$

Тогда: $(x + 2)^2 + 4 = 5x^2; \quad 4x^2 - 4x - 8 = 0; \quad x^2 - x - 2 = 0;$

$D = 1 + 8 = 9; \quad x_1 = -1, \quad x_2 = 2.$ Тогда $y_1 = \frac{1}{2}; \quad y_2 = -1.$

Ответ: $\left(-1; \frac{1}{2}\right); (2; -1).$

$$6.114. \begin{cases} xy + x + y = 15, \\ x^2y + xy^2 = 54; \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 15 - xy, \\ xy(x + y) = 54, \end{cases} \quad \text{тогда: } xy(15 - xy) = 54;$$

замена $xy = t; \quad t(15 - t) = 54; \quad t^2 - 15t + 54 = 0; \quad t_1 = 6, \quad t_2 = 9;$

1) $xy = 6, \quad x = \frac{6}{y} (y \neq 0); \quad \frac{6}{y} + y + 6 = 15; \quad y^2 - 9y + 6 = 0; \quad D = 57;$

$$y_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{57}}{2}; \quad x_{1,2} = \frac{12}{9 \pm \sqrt{57}} = -\frac{9 \pm \sqrt{57}}{2};$$

2) $xy = 9, \quad x = \frac{9}{y} (y \neq 0); \quad \frac{9}{y} + y + 9 = 15; \quad y^2 - 6y + 9 = 0; \quad y_{3,4} = 3; \quad x_{3,4} = 3.$

Ответ: $(3; 3); \left(\frac{9 + \sqrt{57}}{2}; \frac{9 - \sqrt{57}}{2}\right); \left(\frac{9 - \sqrt{57}}{2}; \frac{9 + \sqrt{57}}{2}\right).$

$$6.115. \begin{cases} xy + x - y = 7, \\ x^2y - y^2x = 12; \end{cases} \quad \begin{cases} x - y = 7 - xy, \\ xy(x - y) = 12; \end{cases}$$

$xy(7 - xy) = 12,$ замена: $xy = t; \quad t^2 - 7t + 12 = 0; \quad t_1 = 3, \quad t_2 = 4;$

1) $xy = 3; \quad x = \frac{3}{y}; \quad \frac{3}{y} - y + 3 = 7; \quad y^2 + 4y - 3 = 0; \quad \frac{D}{4} = 4 + 3 = 7;$

$y_{1,2} = -2 \pm \sqrt{7},$ следовательно, $x_{1,2} = \frac{3}{-2 \pm \sqrt{7}} = 2 \pm \sqrt{7};$

2) $xy = 4; \quad x = \frac{4}{y}; \quad \frac{4}{y} - y = 3; \quad y^2 + 3y - 4 = 0; \quad y_3 = -4, \quad y_4 = 1;$

$x_3 = -1, \quad x_4 = 4.$

Ответ: $(-1; -4); (4; 1); (2 + \sqrt{7}; -2 + \sqrt{7}); (2 - \sqrt{7}; -2 - \sqrt{7}).$

6.117. $\begin{cases} xy^2 + x - y^2 = 21, \\ x^2 y^2 - y^4 x = 20; \end{cases} \begin{cases} xy^2 + x - y^2 = 21, \\ xy^2(x - y^2) = 20; \end{cases} \begin{cases} x - y^2 = 21 - xy^2, \\ xy^2(21 - xy^2) = 20; \end{cases}$
 $xy^2(21 - xy^2) = 20$; замена $xy^2 = t$; $t^2 - 21t + 20 = 0$; $t_1 = 20$, $t_2 = 1$;
 1) $xy^2 = 20$; $y^2 = \frac{20}{x}$; $x - \frac{20}{x} = 1$; $x^2 - x - 20 = 0$; $x_1 = -4$, $y_1^2 = -5$ –
 решений нет; $x_2 = 5$, $y_2^2 = 4$, $y = \pm 2$. Решения: (5; 2), (5; -2).
 2) $xy^2 = 1$ $y^2 = \frac{1}{x}$; $x - \frac{1}{x} = 20$; $x^2 - 20x - 1 = 0$; $\frac{D}{4} = 101$;

$$x_{3,4} = 10 \pm \sqrt{101};$$

при $x = 10 - \sqrt{101}$ y не существует (т.к. $10 - \sqrt{101} < 0$);

при $x = 10 + \sqrt{101}$ $y = \pm \frac{1}{\sqrt{10 + \sqrt{101}}}$.

Ответ: (5; 2); (5; -2); $\left(10 + \sqrt{101}; \frac{1}{\sqrt{10 + \sqrt{101}}}\right)$;
 $\left(10 + \sqrt{101}; -\frac{1}{\sqrt{10 + \sqrt{101}}}\right)$.

6.118. $\begin{cases} x^2 y + y = 9, \\ y + x^2 = 9. \end{cases}$ Значит, $x^2(y - 1) = 0$; $x = 0 \Rightarrow y = 9$;

$y = 1 \Rightarrow x = \pm\sqrt{8}$; Ответ: (0; 9), $(\sqrt{8}; 1)$, $(-\sqrt{8}; 1)$;

6.119. $\begin{cases} x^2 - xy = 3, \\ xy - y^2 = 2. \end{cases}$ $x^2 - 2xy + y^2 = 1$; $(x - y)^2 = 1$, откуда $x - y = \pm 1$;

1) $\begin{cases} x - y = 1, \\ xy - y^2 = 2; \end{cases} \begin{cases} x = 1 + y, \\ y = 2; \end{cases} \begin{cases} x = 3, \\ y = 2; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x - y = -1, \\ xy - y^2 = 2; \end{cases} \begin{cases} x = y - 1, \\ y(x - y) = 2; \end{cases} \begin{cases} x = -3, \\ y = -2. \end{cases}$ Ответ: (3; 2); (-3; -2).

6.120. $\begin{cases} x + y + xy = 7, \\ x^2 + y^2 + xy = 13; \end{cases}$

$\begin{cases} x + y + xy = 7, \\ (x + y)^2 - xy = 13. \end{cases}$ Замена $x + y = u$, $xy = v$, получим:

$$\begin{cases} u+v=7, \\ u^2-v=13; \end{cases} \quad u^2+u-20=0; \quad u_1=-5, \quad u_2=4; \quad v_1=12, \quad v_2=3.$$

$$1) \begin{cases} x+y=-5, \\ xy=12; \end{cases} \quad \begin{cases} x=-y-5, \\ -y^2-5y=12; \end{cases}$$

$$y^2+5y+12=0; \quad D=25-48<0 \text{ — решений нет;}$$

$$2) \begin{cases} x+y=4, \\ xy=3; \end{cases} \quad \begin{cases} x=4-y, \\ -y^2+4y-3=0; \end{cases}$$

$$y^2-4y+3=0; \quad y_1=3, \quad y_2=1; \quad x_1=1, \quad x_2=3. \quad \text{Ответ: (1; 3); (3; 1).}$$

$$6.121. \begin{cases} x^3+y^3=35, \\ x^2y+y^2x=30; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+y)(x^2-xy+y^2)=35, \\ xy(x+y)=30; \end{cases} \quad \begin{cases} (x+y)((x+y)^2-3xy)=35, \\ xy(x+y)=30. \end{cases}$$

Замена: $xy=u$, $x+y=v$, тогда:

$$\begin{cases} v(v^2-3u)=35, \\ uv=30; \end{cases} \quad \begin{cases} v^3-90=35, \\ uv=30; \end{cases} \quad \begin{cases} v^3=125, \\ uv=30; \end{cases} \quad \begin{cases} v=5, \\ u=6. \end{cases}$$

$$\text{Значит: } \begin{cases} xy=6, \\ x+y=5; \end{cases} \quad \begin{cases} x=3, \\ y=2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x=2, \\ y=3. \end{cases} \quad \text{Ответ: (2; 3); (3; 2).}$$

$$6.122. \begin{cases} x^2-xy=20y, (1) \\ 5xy-5y^2=4x; (2) \end{cases}$$

1) $x=0, y=0$ — решение

2) $x \neq y; x=0; y \neq 0$, Разделим (1) на (2) получим:

$$\frac{x}{5y} = \frac{5y}{x} \Rightarrow x = \pm 5y; \quad \text{Ответ: (0; 0); (5; 1); } \left(-\frac{10}{3}; \frac{2}{3}\right).$$

$$6.123. \begin{cases} 4x^2+xy=20y, \\ 4xy+y^2=5x; \end{cases} \quad \begin{cases} x(4x+y)=20y, \\ y(4x+y)=5x; \end{cases} \quad \frac{20y}{x} = \frac{5x}{y} \quad (x \neq 0, y \neq 0).$$

$$x=0, y=0; \quad x^2=4y^2; \quad x = \pm 2y.$$

$$1) x=2y; \quad 16y^2+2y^2=20y; \quad 9y^2=10y; \quad y_1=0, \quad y_2=\frac{10}{9}; \quad x_1=0, \quad x_2=\frac{20}{9};$$

$$2) x=-2y; \quad 16y^2-2y^2=20y; \quad 7y^2=10y; \quad y_3=\frac{10}{7}; \quad x_3=-\frac{20}{7}.$$

$$\text{Ответ: (0; 0); } \left(-\frac{20}{7}; \frac{10}{7}\right); \left(\frac{20}{9}; \frac{10}{9}\right).$$

$$6.124. \begin{cases} \frac{1}{x} + y = \frac{3}{2}, \\ \frac{1}{x^2} + y^2 = \frac{5}{4}. \end{cases} \quad \text{Замена } t = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0;$$

$$\begin{cases} t + y = \frac{3}{2}, \\ t^2 + y^2 = \frac{5}{4}; \end{cases} \quad \begin{cases} t = \frac{3}{2} - y, \\ \frac{9}{4} - 3y + y^2 + y^2 = \frac{5}{4}; \end{cases} \quad \begin{cases} t = \frac{3}{2} - y, \\ 2y^2 - 3y + 1 = 0; \end{cases}$$

$$y_1 = 1, \quad t_1 = \frac{1}{2}; \quad y_2 = \frac{1}{2}, \quad t_2 = 1. \quad \text{Т.к. } t = \frac{1}{x}, \quad \text{то } x_1 = 2, x_2 = 1.$$

$$\text{Ответ: } \left(1; \frac{1}{2}\right); (2; 1).$$

$$6.125. \begin{cases} x + \frac{1}{y} = \frac{3}{2}, \\ x^2 + \frac{1}{y^2} = \frac{5}{4}; \end{cases} \quad \begin{cases} x + \frac{1}{y} = \frac{3}{2}, \\ 2\frac{x}{y} = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x + \frac{1}{y} = \frac{3}{2}, \\ y = 2x; \end{cases} \quad \begin{cases} x + \frac{1}{2x} = \frac{3}{2}, \\ y = 2x; \end{cases}$$

$$2x^2 - 3x + 1 = 0; \quad x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}; \quad y_1 = 2, y_2 = 1.$$

$$\text{Ответ: } (1; 2); \left(\frac{1}{2}; 1\right).$$

$$6.126. \begin{cases} 2x + \frac{1}{y} = 2, \\ 3x^2 + \frac{2}{y^2} = 3. \end{cases} \quad \text{Замена } \frac{1}{y} = u, \quad y \neq 0$$

$$\begin{cases} 2x + u = 2, \\ 3x^2 + 2u^2 = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} u = 2 - 2x, \\ 3x^2 + 2(2 - 2x)^2 = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} u = 2 - 2x, \\ 11x^2 - 16x + 5 = 0; \end{cases}$$

$$11x^2 - 16x + 5 = 0; \quad \frac{D}{4} = 9; \quad x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{5}{11}; \quad u_1 = 0, \quad u_2 = \frac{12}{11}.$$

Найдем y : $\frac{1}{y} = 0$ — решений нет.

$$\frac{1}{y} = \frac{12}{11}; \quad y = \frac{11}{12}. \quad \text{Ответ: } \left(\frac{5}{11}; \frac{11}{12}\right).$$

$$6.127. \begin{cases} \frac{1}{x} + y = -\frac{1}{2}, \\ y^2 - \frac{3}{x^2} = \frac{1}{4}. \end{cases} \quad \text{Замена } \frac{1}{x} = u, \quad x \neq 0;$$

$$\begin{cases} u + y = -\frac{1}{2}, \\ y^2 - 3u^2 = \frac{1}{4}; \end{cases} \quad \begin{cases} y = -\frac{1}{2} - u, \\ \frac{1}{4} + u^2 + u - 3u^2 = \frac{1}{4}; \end{cases} \quad \begin{cases} y = -\frac{1}{2} - u, \\ -2u^2 + u = 0; \end{cases}$$

$u_1 = 0$, но в силу замены $u \neq 0$; $u_2 = \frac{1}{2}$; $y = -1, x = 2$. Ответ: (2; -1).

$$6.128. \begin{cases} x + y = 8, \\ \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{50}{7}. \end{cases} \quad \frac{x}{y} = t; \quad t + \frac{1}{t} = \frac{50}{7}; \quad 7t^2 - 50t + 7 = 0; \quad \frac{D}{4} = 576;$$

$$t_{1,2} = \frac{25 \pm 24}{7}; \quad t_1 = 7; \quad t_2 = \frac{1}{7}. \quad \text{Итак,}$$

$$1) \begin{cases} x + y = 8, \\ \frac{x}{y} = 7; \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 8, \\ x = 7y; \end{cases} \quad y = 1, x = 7;$$

$$2) \begin{cases} x + y = 8, \\ \frac{x}{y} = \frac{1}{7}; \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 8, \\ y = 7x; \end{cases} \quad y = 7, x = 1. \quad \text{Ответ: (1; 7); (7; 1).}$$

$$6.129. \begin{cases} xy = 5, \\ \frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = \frac{13}{6}, \quad x \neq \pm y. \end{cases}$$

$$\frac{x+y}{x-y} = t; \quad t + \frac{1}{t} = \frac{13}{6}; \quad 6t^2 - 13t + 6 = 0; \quad D = 25; \quad t_1 = \frac{2}{3}, \quad t_2 = \frac{3}{2};$$

$$1) \begin{cases} xy = 5, \\ \frac{x+y}{x-y} = \frac{2}{3}; \end{cases} \quad \begin{cases} xy = 5, \\ 3x + 3y = 2x - 2y; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -5y, \\ -5y^2 = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -5y, \\ y^2 = -1 \end{cases} \quad \text{решений нет;}$$

$$2) \begin{cases} xy = 5, \\ \frac{x+y}{x-y} = \frac{3}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} xy = 5, \\ 2x + 2y = 3x - 3y; \end{cases} \quad \begin{cases} 5y^2 = 5, \\ x = 5y; \end{cases} \quad y = \pm 1, x = \pm 5$$

Ответ: (5; 1); (-5; -1).

$$6.130. \begin{cases} x - y = \log_2 \frac{y}{x}, \\ x^2 + y = 12; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y = 12, \\ x - y = \log_2 y - \log_2 x, \text{ или } \begin{cases} x^2 + y = 12, \\ x - y = \log_2(-y) - \log_2(-x), \end{cases} \\ x > 0, y > 0 \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} x^2 + y = 12, \\ x + \log_2 x = y + \log_2 y, \text{ Рассмотрим } f(t) = t + \log_2 t; D(f) = (0; +\infty). \\ x > 0, y > 0. \end{cases}$$

$$f'(t) = 1 + \frac{1}{t \ln 2}; f'(t) > 0, f(x) = f(y); x = y; x^2 + x - 12 = 0;$$

$$x_1 = 3, x_2 = -4. \text{ Условию } x > 0 \text{ удовлетворяет } x = 3, y = 3.$$

$$2) \begin{cases} x^2 + y = 12, \\ x - y = \log_2(-y) - \log_2(-x), \text{ Рассмотрим } f(t) = t + \log_2(-t); \\ x < 0, y < 0. \end{cases}$$

$$D(f) = (-\infty; 0). f'(t) = 1 + \frac{1}{t \ln 2}. \text{ При } t < -\frac{1}{\ln 2} f'(t) < 0; f(x) = f(y);$$

$$x = y; x^2 + x - 12 = 0; x_1 = 3, x_2 = -4. \text{ Условию } x < -\frac{1}{\ln 2} \text{ удовлетворяет } x = -4, y = -4. \text{ Ответ: } (3; 3); (-4; -4).$$

$$6.131. \begin{cases} y - x = \log_{\frac{1}{2}} \frac{x}{y}, \\ x = y^2 - 6; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y^2 - 6, \\ x + \log_{\frac{1}{2}} x = y + \log_{\frac{1}{2}} y, \text{ или } \begin{cases} x = y^2 - 6, \\ x + \log_{\frac{1}{2}}(-x) = y + \log_{\frac{1}{2}}(-y), \end{cases} \\ x > 0, y > 0 \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} x = y^2 - 6, \\ x + \log_{\frac{1}{2}} x = y + \log_{\frac{1}{2}} y, \text{ Рассмотрим } f(t) = t + \log_{\frac{1}{2}} t; D(f) = (0; +\infty). \\ x > 0, y > 0. \end{cases}$$

$$f'(t) = 1 - \frac{1}{t \ln 2}. \text{ При } t > \frac{1}{\ln 2} f'(t) < 0; f(x) = f(y), x = y;$$

$$x = x^2 - 6; x^2 - x - 6 = 0; x_1 = -2, x_2 = 3. \text{ Условию } x > \frac{1}{\ln 2}$$

удовлетворяет $x = 3, y = 3$.

$$2) \begin{cases} x = y^2 - 6, \\ x + \log_{\frac{1}{2}}(-x) = y + \log_{\frac{1}{2}}(-y), \\ x < 0, y < 0 \end{cases}$$

Рассмотрим $f(t) = t + \log_{\frac{1}{2}}(-t); D(f) = (-\infty; 0); f'(t) = 1 - \frac{1}{t \ln 2}$;

$f'(t) > 0; f(x) = f(y), x = y; x^2 + x - 6 = 0;$
 $x_1 = 2, x_2 = -3; x < 0; x = -3, y = -3.$ Ответ: $(-3; -3); (2; 2)$.

$$6.132. \begin{cases} 2^x 3^y = 24, \\ 2^y 3^x = 54; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2^{x-y}}{3^{x-y}} = \frac{4}{9}, \\ 2^x 3^y = 24; \end{cases} \left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^{x-y} = \left(\frac{2}{3} \right)^2, \right. \begin{cases} y = x - 2, \\ 2^x 3^x = 24 \cdot 9; \end{cases} \begin{cases} 6^x = 6^3, \\ y = x - 2; \end{cases} \begin{cases} x = 3, \\ y = 1. \end{cases}$$

Ответ: $(3; 1)$.

$$6.133. \begin{cases} \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{3}{2}, \\ xy + x + y = 9, \end{cases} x, y \neq 0; \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{3}{2}, \text{ замена: } \sqrt{\frac{x}{y}} = t, t > 0;$$

$$t - \frac{1}{t} = \frac{3}{2}; 2t^2 - 3t - 2 = 0; t_1 = 2, t_2 = -\frac{1}{2}. \text{ Т.к. } t > 0, \text{ то}$$

$$t = 2; \sqrt{\frac{x}{y}} = 2; x = 4y; 4y^2 + 5y - 9 = 0; D = 169;$$

$$y = \frac{-5 \pm 13}{8}; y_1 = 1, y_2 = -\frac{9}{4}; x_1 = 4; x_2 = -9. \text{ Ответ: } (4; 1); \left(-9; -\frac{9}{4}\right).$$

$$6.134. \begin{cases} xy = 16, \\ x^{\log_2 y} = 8; \end{cases} x = \frac{16}{y}, \left(\frac{16}{y}\right)^{\log_2 y} = 8; \frac{16}{y} = 2^{\log_2 \frac{16}{y}};$$

$$2^{\log_2 \frac{16}{y} \cdot \log_2 y} = 2^3; \log_2 y (4 - \log_2 y) = 3, \text{ замена } \log_2 y = t;$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0; t_1 = 1; t_2 = 3, \text{ тогда } y_1 = 2, y_2 = 8; x_1 = 8, x_2 = 2.$$

Ответ: $(2; 8); (8; 2)$.

$$6.135. \begin{cases} \log_y x = 2, \\ x^{\lg y} = 100, \end{cases} \quad x > 0, y > 0, y \neq 1; \quad \begin{cases} x = y^2, \\ y^{2 \lg y} = 100; \end{cases}$$

$$y^{2 \lg y} = 100, y = 10^{\lg y}, y > 0; (10^{\lg y})^{2 \lg y} = 10^2; 2(\lg y)^2 = 2; \lg^2 y = 1;$$

$$y_1 = 10; y_2 = \frac{1}{10}; x_1 = 100, x_2 = \frac{1}{100}. \quad \text{Ответ: } (100; 10); (0,01; 0,1).$$

$$6.136. \begin{cases} \log_2 \frac{x^2 \sqrt{y+1}}{2} = 2, \\ \log_2 x \cdot \log_2 (1+y)^2 = 4, \end{cases} \quad y+1 > 0, x > 0.$$

$$\begin{cases} 2 \log_2 x + \frac{1}{2} \log_2 (y+1) = 3, \\ \log_2 x \cdot \log_2 (1+y)^2 = 2; \end{cases} \quad \text{Замена } \log_2 x = u, \log_2 (1+y) = v;$$

$$\begin{cases} 2u + \frac{v}{2} = 3, \\ uv = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} v = 6 - 4u, \\ 6u - 4u^2 = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} v = 6 - 4u, \\ 2u^2 - 3u + 1 = 0; \end{cases}$$

$$2u^2 - 3u + 1 = 0; u_1 = 1, u_2 = \frac{1}{2}, \quad \text{тогда } v_1 = 2, v_2 = 4;$$

$$1) \begin{cases} \log_2 x = 1, \\ \log_2 (1+y) = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2, \\ y = 3; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \log_2 x = \frac{1}{2}, \\ \log_2 (1+y) = 4; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \sqrt{2}, \\ y = 15. \end{cases}$$

Ответ: (2; 3); ($\sqrt{2}$; 15).

$$6.137. \begin{cases} x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = 6, \\ \log_4 x + \log_4 y = -3, \end{cases} \quad x > 0, y > 0;$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = 6, \\ \log_4 xy = -3; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y} - 6\sqrt{xy}}{\sqrt{xy}} = 0, \\ xy = \frac{1}{64}; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{64y}} + \sqrt{y} - \frac{3}{4} = 0, \\ x = \frac{1}{64y}; \end{cases}$$

$$\frac{1}{8\sqrt{y}} + \sqrt{y} - \frac{3}{4} = 0, \quad \sqrt{y} = t, t > 0; t^2 - \frac{3}{4}t + \frac{1}{8} = 0; 8t^2 - 6t + 1 = 0;$$

$$\frac{D}{4} = 1; t_1 = \frac{1}{2}, t_2 = \frac{1}{4}. \quad \text{Тогда } y_1 = \frac{1}{4}, y_2 = \frac{1}{16}, x_1 = \frac{1}{16}, x_2 = \frac{1}{4}.$$

Ответ: $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{16}\right); \left(\frac{1}{16}; \frac{1}{4}\right)$.

$$6.138. \begin{cases} (x+y)3^{y-x} = \frac{5}{27}, & x+y > 0; \\ 3\log_5(x+y) = x-y, \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+y) = \frac{5}{27} \cdot 3^{x-y}, \\ 3\log_5\left(\frac{5}{27} \cdot 3^{x-y}\right) = x-y; \end{cases} \quad \begin{cases} (x+y) = \frac{5}{27} \cdot 3^{x-y}, \\ 3 - 3\log_5 27 + (x-y) \cdot 3\log_5 3 = x-y. \end{cases}$$

$$3(1 - \log_5 27) = (x-y)(1 - \log_5 27); x-y=3, \text{ тогда } \begin{cases} x+y=5, \\ x-y=3, \end{cases}$$

$x=4, y=1$. Ответ: (4; 1).

$$6.139. \begin{cases} 2x - \sin x = 2y - \sin y, \\ x + 2y = 9. \end{cases}$$

Пусть $f(t) = 2t - \sin t$, $D(f) = R$, $f'(t) = 2 - \cos t$, $f'(t) > 0$.
Равенство $f(x) = f(y)$ возможно лишь при $x = y$. $3y = 9$; $y = 3$, $x = 3$.
Ответ: (3; 3).

$$6.140. \begin{cases} 3x + \cos x = 3y + \cos y, \\ 3x - y = 6. \end{cases}$$

Пусть $f(t) = 3t + \cos t$, $D(f) = R$, $f'(t) = 3 - \sin t$, $f'(t) > 0$.
Равенство $f(x) = f(y)$ возможно лишь при $x = y$.
 $3x - x = 6$; $x = 3$, $y = 3$. Ответ: (3; 3).

$$6.141. \begin{cases} \sqrt{x+y-1} = 1, \\ \sqrt{x-y+2} = 2y-2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y-1=1, \\ x-y+2=4y^2-8y+4, \\ 2y-2 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=2, \\ x=4y^2-7y+2, \\ y \geq 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=2-y, \\ 4y^2-6y=0, \\ y \geq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \begin{cases} y=0, \\ x=2; \end{cases} \\ \begin{cases} y=\frac{3}{2}, \\ x=\frac{1}{2}, y=\frac{3}{2}. \end{cases} \\ \begin{cases} x=\frac{1}{2}, \\ y \geq 1; \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

StudyPort.ru

$$6.142. \begin{cases} \sqrt{x-y+5} = 3, \\ \sqrt{x+y-5} = -2x+11; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x-y+5=9, \\ x+y-5=4x^2-44x+121, \\ 11-2x \geq 0; \end{cases} \begin{cases} y=x-4, \\ 4x^2-46x+130=0, \\ x \leq \frac{11}{2}; \end{cases}$$

$$2x^2-23x+65=0; D=9; x_1=5, x_2=\frac{13}{2}, \text{ но } \frac{13}{2} > \frac{11}{2}; x=5, y=1.$$

Ответ: (5; 1).

$$6.143. \begin{cases} \sqrt{x+3y+1}=2, \\ \sqrt{2x-y+2}=7y-6; \end{cases} \begin{cases} x+3y+1=4, \\ 2x-y+2=49y^2-84y+36, \\ 7y-6 \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=3-3y, \\ 6-6y-y+2=49y^2-84y+36, \\ y \geq \frac{6}{7}; \end{cases} \begin{cases} x=3-3y, \\ 49y^2-77y+28=0, \\ y \geq \frac{6}{7}; \end{cases}$$

$$49y^2-77y+28=0; 7y^2-11y+4=0; D=9; y_{1,2}=\frac{11 \pm 3}{14};$$

$$y_1=1; y_2=\frac{4}{7} \text{ - неравенству } y \geq \frac{6}{7} \text{ не удовлетворяет; } y=1, x=0.$$

Ответ: (0; 1).

$$6.144. \begin{cases} \sqrt{y-x-1}=1, \\ \sqrt{x-2y+3}=3y-2x-1. \end{cases}$$

Замена: $3y-2x=u, y-x=v$, тогда $x-2y=v-u$.

$$\begin{cases} \sqrt{y-1}=1, \\ \sqrt{v-u+3}=u-1; \end{cases} \begin{cases} v=2, \\ v-u+3=u^2-2u+1, \\ u-1 \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} v=2, \\ u^2-u-4=0, \quad u^2-u-4=0; D=17; u_{1,2}=\frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}. \\ u \geq 1; \end{cases}$$

Т.к. $u \geq 1$, то $u=\frac{1+\sqrt{17}}{2}$, тогда

240

$$\begin{cases} y-x=2, \\ 3y-2x=\frac{1+\sqrt{17}}{2}; \end{cases} \begin{cases} y=x+2, \\ x=\frac{1+\sqrt{17}}{2}-6; \end{cases} \begin{cases} y=\frac{-7+\sqrt{17}}{2}, \\ x=\frac{-11+\sqrt{17}}{2}. \end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{-11+\sqrt{17}}{2}; \frac{-7+\sqrt{17}}{2}\right)$.

Модули

6.145. $|2x-3|=3-2x$; $2x-3 \leq 0$; $x \leq 1,5$. Ответ: $(-\infty; 1,5]$.

6.146. $|4-5x|=5x-4$; $5x-4 \geq 0$; $x \geq 0,8$. Ответ: $[0,8; \infty)$.

6.147. $|3x-5|=5-3x$; $5-3x \geq 0$, $x \geq 1\frac{2}{3}$. Ответ: $\left(-\infty; 1\frac{2}{3}\right]$.

6.148. $|7-4x|=7-4x$; $7-4x \geq 0$, $x \geq \frac{7}{4}$. Ответ: $\left(-\infty; \frac{7}{4}\right]$.

6.149. $|5x-13|-|6-5x|=7$;

1) $5x < 6$: $-5x+13-6+5x=7$; $7=7$; $x < 1,2$;

2) $6 \leq 5x \leq 13$: $-5x+13+6-5x=7$; $5x=6$; $x=1,2$;

3) $5x > 13$: $5x-13+6-5x=7$; $-7=7$ - неверно, решений нет.

Ответ: $(-\infty; 1,2]$.

6.150. $|3x-8|-|3x-2|=6$;

1) $\begin{cases} 3x-2 < 0, \\ -3x+8+3x-2=6; \end{cases} \begin{cases} 3x < 2, \\ 6=6; \end{cases} x < \frac{2}{3}$;

2) $\begin{cases} 3x-8 \leq 0, \\ 3x-2 \geq 0, \\ -3x+8-3x+2=6; \end{cases} \begin{cases} 2 \leq 3x \leq 8, \\ 3x=2; \end{cases} x = \frac{2}{3}$;

3) $\begin{cases} 3x-2 > 0, \\ 3x-8-3x+2=6; \end{cases} \begin{cases} 3x > 2, \\ -6=6 \end{cases}$ - неверно, решений нет.

Ответ: $\left(-\infty; \frac{2}{3}\right]$.

6.151. $|16-9x|-|9x-5|=11$;

1) $\begin{cases} 9x-5 < 0, \\ 16-9x+9x-5=11, \end{cases} \begin{cases} 9x-5 < 0, \\ 11=11; \end{cases} x < \frac{5}{9}$;

$$2) \begin{cases} 5 \leq 9x \leq 16, \\ 16 - 9x - 9x + 5 = 11; \end{cases} \quad \begin{cases} 5 \leq 9x \leq 16, \\ 9x = 5; \end{cases} \quad x = \frac{5}{9};$$

$$3) \begin{cases} 9x > 16, \\ -16 + 9x - 9x + 5 = 11; \end{cases} \quad \begin{cases} x > \frac{16}{9}, \\ -11 = 11 \end{cases} \text{ - неверно, решений нет.}$$

Ответ: $\left(-\infty; \frac{5}{9}\right]$.

6.152. $|7x - 12| - |7x - 1| = 1;$

$$1) \begin{cases} 7x < 1, \\ -7x + 12 + 7x - 1 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 7x < 1, \\ 11 = 1 \end{cases} \text{ - неверно, решений нет;}$$

$$2) \begin{cases} 1 \leq 7x \leq 12, \\ -7x + 12 - 7x + 1 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 1 \leq 7x \leq 12, \\ 7x = 6; \end{cases} \quad x = \frac{6}{7};$$

$$3) \begin{cases} 7x > 12, \\ 7x - 12 - 7x + 1 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x > \frac{12}{7}, \\ -11 = 1 \end{cases} \text{ - неверно, решений нет.}$$

Ответ: $\frac{6}{7}$.

6.153. $x^2 - 6|x| - 2 = 0$; Пусть $t = |x|$; $t^2 - 6t - 2 = 0$

$$t_1 = \sqrt{11} + 3; t_2 = 3 - \sqrt{11} < 0; |x| = \sqrt{11} + 3 \quad \text{Ответ: } \sqrt{11} + 3; -\sqrt{11} - 3.$$

6.154. $x^2 - 4|x| - 1 = 0$; $t = |x|$; $t^2 - 4t - 1 = 0$; $t = 2 \pm \sqrt{5}$
 $|x| = 2 + \sqrt{5}$

Ответ: $2 + \sqrt{5}; -2 - \sqrt{5}$.

6.155. $\frac{x}{|x|} + x = x^2 + 1$; 1) $\begin{cases} x > 0, \\ x^2 - x = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ x = 0, \quad x = 1; \\ x = 1; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x < 0, \\ -1 + x = x^2 + 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 0, \\ x^2 - x + 2 = 0; \end{cases} \quad D < 0 \text{ - решений нет.}$

Ответ: 1.

6.156. $-2\frac{x}{|x|} - 2x = x^2 + 2$;

$$1) \begin{cases} x > 0, \\ -2 - 2x = x^2 + 2; \end{cases} \begin{cases} x > 0, \\ x^2 + 2x + 4 = 0, D < 0, \end{cases} \text{--- нет решений};$$

$$2) \begin{cases} x < 0, \\ 2 - 2x = x^2 + 2; \end{cases} \begin{cases} x < 0, \\ x^2 + 2x = 0; \end{cases} \begin{cases} x < 0, \\ x = 0, \\ x = -2; \end{cases} x = -2. \text{ Ответ: } -2.$$

$$6.157. 5^{4x-6} = 25^{3x-4}, 5^{4x-6} = 56^{6x-8}, |4x-6| = 6x-8;$$

$$1) \begin{cases} 4x - 6 \geq 0, \\ 4x - 6 = 6x - 8; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1\frac{1}{2}, \\ x = 1; \end{cases} \text{--- решений нет};$$

$$2) \begin{cases} 4x - 6 < 0, \\ -4x + 6 = 6x - 8; \end{cases} \begin{cases} x < 1\frac{1}{2}, \\ x = 1,4; \end{cases} x = 1,4. \text{ Ответ: } 1,4.$$

$$6.158. 3^{3x-4} = 9^{2x-2}, 3^{3x-4} = 3^{4x-4}, |3x-4| = 4x-4;$$

$$1) \begin{cases} 3x - 4 \geq 0, \\ 3x - 4 = 4x - 4; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1\frac{1}{3}, \\ x = 0 \end{cases} \text{--- нет решений};$$

$$2) \begin{cases} 3x - 4 < 0, \\ -3x + 4 = 4x - 4; \end{cases} \begin{cases} x < 1\frac{1}{3}, \\ x = 1\frac{1}{7}; \end{cases} x = 1\frac{1}{7}. \text{ Ответ: } 1\frac{1}{7}.$$

$$6.159. 9^{3x-1} = 3^{8x-2}, 3^{2(3x-1)} = 3^{8x-2}, 2|3x-1| = 8x-2;$$

$$1) \begin{cases} 3x - 1 \geq 0, \\ 2(3x-1) = 8x-2; \end{cases} \begin{cases} x \geq \frac{1}{3}, \\ x = 0 \end{cases} \text{--- решений нет};$$

$$2) \begin{cases} 3x - 1 < 0, \\ -6x + 2 = 8x - 2; \end{cases} \begin{cases} x < \frac{1}{3}, \\ x = \frac{2}{7}; \end{cases} x = \frac{2}{7}. \text{ Ответ: } \frac{2}{7}.$$

$$6.160. 25^{1-2x} = 5^{4-6x}, 5^{2(1-2x)} = 5^{4-6x}, 2|1-2x| = 4-6x;$$

$$1) \begin{cases} 1 - 2x \geq 0, \\ 2 - 4x = 4 - 6x; \end{cases} \begin{cases} x \leq \frac{1}{2}, \\ x = 1 \end{cases} \text{--- решений нет};$$

$$2) \begin{cases} 1 - 2x < 0, \\ 4x - 2 = 4 - 6x; \end{cases} \begin{cases} x > \frac{1}{2}, \\ x = 0,6; \end{cases} x = \frac{3}{5}. \text{ Ответ: } 0,6.$$

6.161. $|\sin x| = \sin x + 2\cos x$;

1) $\begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x = \sin x + 2\cos x; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \cos x = 0; \end{cases} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z;$

2) $\begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ -\sin x = \sin x + 2\cos x; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ -\sin x = \cos x; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \operatorname{tg} x = -1; \end{cases}$

$x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$. Ответ: $-\frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z$.

6.162. $|\operatorname{tg} x| = \operatorname{tg} x - \frac{1}{\cos x}$;

1) $\begin{cases} \operatorname{tg} x \geq 0, \\ \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} x - \frac{1}{\cos x}; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x \geq 0, \\ \frac{1}{\cos x} = 0 \end{cases} \quad \text{- решений нет.}$

2) $\begin{cases} \operatorname{tg} x < 0, \\ -\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} x - \frac{1}{\cos x}; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x < 0, \\ 2\sin x - 1 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x < 0, \\ \sin x = \frac{1}{2}; \end{cases}$

$x = \frac{5}{6}\pi + 2\pi k, k \in Z$. Ответ: $\frac{5}{6}\pi + 2\pi k, k \in Z$.

6.163. $|\cos x| = \cos x - 2\sin x$;

1) $\begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ \cos x = \cos x - 2\sin x; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ \sin x = 0; \end{cases} \quad x = 2\pi n, n \in Z;$

2) $\begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ -\cos x = \cos x - 2\sin x; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ \cos x = \sin x; \end{cases}$

$x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$. Ответ: $2\pi n, -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, n, k \in Z$.

6.164. $|\operatorname{ctg} x| = \operatorname{ctg} x + \frac{1}{\sin x}$;

1) $\begin{cases} \operatorname{ctg} x \geq 0, \\ \operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} x + \frac{1}{\sin x}; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{ctg} x \geq 0, \\ \frac{1}{\sin x} = 0 \end{cases} \quad \text{- нет решений;}$

2) $\begin{cases} \operatorname{ctg} x < 0, \\ -\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} x + \frac{1}{\sin x}; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{ctg} x < 0, \\ 2\cos x + 1 = 0; \end{cases}$

$x = \frac{2}{3}\pi + 2\pi n, n \in Z$. Ответ: $\frac{2}{3}\pi + 2\pi n, n \in Z$.

6.165. $\cos x = |\cos x|(x+1,5)^2$; $\cos x \geq 0$;

1) $\cos x = \cos x(x+1,5)^2$; $\begin{cases} \cos x \geq 0, \\ \cos x = 0, \\ (x+1,5)^2 = 1; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \\ x = -0,5. \end{cases}$

2. $\cos x < 0$; $\cos x = -\cos x(x+1,5)^2$; $\begin{cases} \cos x < 0 \\ (x+1,5)^2 \end{cases}$ — решений нет.

Ответ: $-0,5$; $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$.

6.166. $|\cos x| = \cos x(x-2)^2$; $\cos x \geq 0$; $\cos x = \cos x(x-2)^2$;

$\begin{cases} \cos x \geq 0, \\ \cos x = 0, \\ (x-2)^2 = 1; \end{cases} \begin{cases} \cos x \geq 0, \\ \cos x = 0, \\ x-2 = 1, \\ x-2 = -1; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \\ x = 1. \end{cases}$

$\cos x < 0$; $-\cos x = \cos x(x-2)^2$; $(x-2) = -1$ — решений нет.

Ответ: 1 ; $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$.

6.167. $\cos x = |\sin x|$; 1) $\begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \cos x = \sin x; \end{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$;

2) $\begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \cos x = -\sin x; \end{cases} x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$. Ответ: $\pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z$.

6.168. $\sqrt{3} \sin x = |\cos x|$;

1) $\begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ \sqrt{3} \sin x = \cos x; \end{cases} \begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ \sqrt{3} \sin x = 1; \end{cases} \begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ x = \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in Z; \end{cases}$

$\cos x \neq 0$; $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in Z$;

2) $\begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ \sqrt{3} \sin x = -\cos x; \end{cases} \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ \sqrt{3} \sin x = -1; \end{cases} \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ x = -\frac{\pi}{6} + \pi k; \end{cases}$

$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in Z$. Ответ: $\frac{\pi}{6} + 2\pi n$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, n, k \in Z$.

6.169. $2\sin^2 x = |\sin x|$;

1) $\begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ 2\sin^2 x - \sin x = 0; \end{cases} \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x(2\sin x - 1) = 0; \end{cases}$

$$\sin x = 0 \text{ или } \sin x = \frac{1}{2}; \quad x = \pi n; \quad x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ 2\sin^2 x + \sin x = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin x(2\sin x + 1) = 0; \end{cases}$$

$$\sin x = -\frac{1}{2}; \quad x = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{6} + \pi n; \quad \text{Ответ: } \pi k; \pm \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$$

$$6.170. 2\cos^2 x = |\sin x|;$$

$$1) \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ 2(1 - \sin^2 x) = \sin x; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ 2\sin^2 x + \sin x - 2 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x = \frac{-1 - \sqrt{17}}{4}, \\ \sin x = \frac{-1 + \sqrt{17}}{4}; \end{cases} \quad x = (-1)^n \arcsin \frac{\sqrt{17} - 1}{4} + \pi n;$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ 2(1 - \sin^2 x) = -\sin x; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ 2\sin^2 x - \sin x - 2 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin x = \frac{1 - \sqrt{17}}{4}, \\ \sin x = \frac{1 + \sqrt{17}}{4}; \end{cases} \quad x = (-1)^k \arcsin \frac{1 - \sqrt{17}}{4} + \pi k;$$

$$\text{Ответ: } \pm \arcsin \left(\frac{\sqrt{17} - 1}{4} \right) + \pi n; \quad n \in Z.$$

$$6.171. 2\cos^2 x = |\cos x|;$$

$$1) \begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ 2\cos^2 x = \cos x; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ \cos x = 0, \\ \cos x = \frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z, \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ 2\cos^2 x + \cos x = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ \cos x = 0, \\ \cos x = -\frac{1}{2}; \end{cases} \quad x = \pm \frac{2}{3}\pi + 2\pi l;$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{2} + \pi k; \pm \frac{\pi}{3} + \pi n; \quad n, k \in Z.$$

6.172. $3\operatorname{tg}x = \sqrt{3}|\sin x|$;

$$1) \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ 3\operatorname{tg}x = \sqrt{3}\sin x; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sqrt{3}\sin x(\sqrt{3} - \cos x) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x = 0, \quad x = \pi k; \\ \cos x = \sqrt{3}; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ 3\operatorname{tg}x = -\sqrt{3}\sin x; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sqrt{3}\sin x(\sqrt{3} + \cos x) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin x = 0, \\ \cos x = -\sqrt{3} \end{cases} -$$

нет решений. Ответ: $\pi k, k \in Z$.

6.173. $\sqrt{3}\operatorname{ctg}x = 3|\cos x|$;

$$1) \begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ \sqrt{3}\operatorname{ctg}x = 3\cos x; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ \sqrt{3}\cos x(1 - \sqrt{3}\sin x) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ \cos x = 0, \\ \sin x = \frac{\sqrt{3}}{3}; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \cos x \leq 1, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \\ x = (-1)^k \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} + \pi k, k \in Z; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \\ x = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} + 2\pi k, k \in Z; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ \sqrt{3}\operatorname{ctg}x = -3\cos x; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ \sqrt{3}\cos x(1 + \sqrt{3}\sin x) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ \cos x = 0, \\ \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{3}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pi + \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} + 2\pi m, m \in Z \end{cases}$$

Ответ: $\frac{\pi}{2} + \pi n; \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} + 2\pi k; \pi + \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} + 2\pi m; n, m, k \in Z$.

6.174. $2\sin^2 x = |\sqrt{3}\operatorname{tg}x|$;

$$1) \begin{cases} \operatorname{tg}x \geq 0, \\ 2\sin^2 x = \sqrt{3}\operatorname{tg}x; \end{cases} \quad \begin{cases} \pi n \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ \sin x(\sin 2x - \sqrt{3}) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \pi n \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ \sin x = 0, \\ \sin 2x = \sqrt{3}; \end{cases} \quad \begin{cases} \pi n \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad ; x = \pi n, n \in Z \\ x = \pi m; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \operatorname{tg} x < 0, \\ 2 \sin^2 x = -\sqrt{3} \operatorname{tg} x; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\pi}{2} + \pi k < x < \pi(k+1), \\ \sin x(\sin 2x + \sqrt{3}) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2} + \pi k < x < \pi(k+1), \\ \sin x = 0, \\ \sin 2x = -\sqrt{3} \end{cases} \quad \text{- решений нет.} \quad \text{Ответ: } \pi n, n \in Z.$$

6.175. $2 \cos^2 x = |\operatorname{ctg} x|$;

$$1) \begin{cases} \operatorname{ctg} x \geq 0, \\ 2 \cos^2 x - \operatorname{ctg} x = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \pi n < x \leq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \\ \cos x(\sin 2x - 1) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \pi n < x \leq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \\ \cos x = 0, \\ \sin 2x = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \pi n < x \leq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z, \\ \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{2} + \pi m, m \in Z, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi l, l \in Z; \end{array} \right. \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \operatorname{ctg} x < 0, \\ 2 \cos^2 x + \operatorname{ctg} x = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\pi}{2} + \pi k < x < \pi(k+1), k \in Z, \\ \cos x(\sin 2x + 1) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2} + \pi k < x < \pi(k+1), k \in Z, \\ \cos x = 0, \\ \sin 2x = -1; \end{cases} \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z.$$

Ответ: $\frac{\pi}{2} + \pi m; \pm \frac{\pi}{4} + \pi k; n \in Z.$

6.176. $4^{|x-2|\sin x} = 2^{x|\sin x|}, 2^{2|x-2|\sin x} = 2^{x|\sin x|}, 2|x-2|\sin x = x|\sin x|$;

$$1) \begin{cases} x - 2 > 0, \\ 0 < \sin x \leq 1, \\ (2x - 4)\sin x = x \sin x; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2, \\ 0 < \sin x \leq 1, \\ \sin x(2x - 4 - x) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 2, \\ 0 < \sin x \leq 1, \text{ - нет решений;} \\ x = 4 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ -1 \leq \sin x \leq 0, \\ (2x - 4)\sin x = -x \sin x; \end{cases} \begin{cases} x \geq 2, \\ -1 \leq \sin x \leq 0, \\ \sin x(2x - 4 + x) = 0; \end{cases} \begin{cases} x \geq 2, \\ -1 \leq \sin x \leq 0, x = \pi n; \\ \sin x = 0, \\ x = 1\frac{1}{3}; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x - 2 < 0, \\ -1 < \sin x \leq 1, \\ (4 - 2x)\sin x = x \sin x; \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ 0 < \sin x \leq 1, \\ \sin x(4 - 2x - x) = 0; \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ x = 1\frac{1}{3}; \\ x = 1\frac{1}{3}; \end{cases} \quad x = 1\frac{1}{3};$$

$$4) \begin{cases} x - 2 < 0, \\ -1 \leq \sin x < 0, \\ (4 - 2x)\sin x + x \sin x = 0; \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ \sin x < 0, \\ \sin x(4 - x) = 0 \end{cases} \text{ - решений нет;}$$

Ответ: $\pi n, n \in \mathbb{Z}; 1\frac{1}{3}$.

6.177. $\sin x = \operatorname{tg} x \cdot |\sin x|$;

$$1) \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x = \operatorname{tg} x \sin x; \end{cases} \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x(1 - \operatorname{tg} x) = 0; \end{cases} \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x = 0, \\ \operatorname{tg} x = 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin x = -\operatorname{tg} x \sin x; \end{cases} \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin x = 0, \\ \operatorname{tg} x = -1; \end{cases} \quad \operatorname{tg} x = -1; x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k.$$

Ответ: $\pi n; \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, n, k \in \mathbb{Z}$.

6.178. $\cos x = \operatorname{tg} x \cdot |\cos x|; \cos x \neq 0$

$$1) \begin{cases} 0 < \cos x \leq 1, \\ \operatorname{tg} x = 1; \end{cases} \begin{cases} 0 < \cos x \leq 1, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \end{cases} \quad x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ \operatorname{tg} x = -1; \end{cases} \begin{cases} -1 \leq \cos x < 0, \\ x = -\frac{\pi}{4} = \pi n, n \in Z \end{cases} \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in Z.$$

Ответ: $\frac{\pi}{4} + 2\pi n; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k; \quad n \in Z.$

6.179. $|\cos x|(2x-4) = |x-2|; 2|\cos x|(x-2) = |x-2|;$
 $x > 2, 2|\cos x| = -1$ решений нет.

$$\begin{cases} x-2=0, \\ \begin{cases} x-2 > 0, \\ 2|\cos x|=1; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} x=2, \\ \begin{cases} x > 2, \\ |\cos x| = \frac{1}{2}; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} x=2, \\ \begin{cases} x > 2, \\ \cos x = \pm \frac{1}{2}; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=2, \\ \begin{cases} x > 2, \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in Z; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} x=2, \\ \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in N, \\ x = -\frac{\pi}{3} + \pi k, k \in N. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $2; \pm \frac{\pi}{3} + \pi k; \quad \pi \in Z.$

6.180. $|\sin x|(4x+2) = |2x+1|;$

$2|\sin x|(2x+1) = |2x+1|;$

$2x+1 < 0; |\sin x| = -1/2$ решений нет.

$$\begin{cases} x = -0,5 \\ \begin{cases} x > -0,5 \\ \sin x = \pm 0,5 \end{cases} \end{cases} ; \begin{cases} x = -0,5 \\ x = \pi n \pm \frac{\pi}{6}, n \in N \end{cases} \quad \text{Ответ: } -0,5; \frac{\pi}{6}; \pi n \pm \frac{\pi}{6}, n \in N.$$

6.181. $|\operatorname{tg} x|(x+3) = |x+3|;$

$x+3 < 0; |\operatorname{tg} x| = -1,$ решений нет

$$\begin{cases} x+3=0, \\ \begin{cases} x+3 > 0, \\ |\operatorname{tg} x|=1; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} x=-3, \\ \begin{cases} x > -3, \\ \operatorname{tg} x=1, \\ \operatorname{tg} x=-1; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} x=-3, \\ \begin{cases} x > -3, \\ \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z, \\ x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z; \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -3, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n = -1, 0, 1, \dots \\ x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k = 0, 1, \dots \end{cases}$$

Ответ: $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n = -1, 0, 1, \dots; -\frac{\pi}{4} + \pi k, k = 0, 1, \dots$

6.182. $|\operatorname{ctg} x(2x-3)| = |2x-3|; 2x-3 > 0; |\operatorname{ctg} x| = -1$ решений нет.

$$\begin{cases} 2x-3=0, \\ \begin{cases} 2x-3 > 0, \\ |\operatorname{ctg} x| = 1; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} x = \frac{3}{2}, \\ x > \frac{3}{2}, \\ \begin{cases} \operatorname{ctg} x = 1, \\ \operatorname{ctg} x = -1; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} x = \frac{3}{2}, \\ x > \frac{3}{2}, \\ \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{N}, \\ x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \pm \frac{\pi}{4} + \pi n; \pi \in \mathbb{N},$$

6.183. $8^x \geq 6 \cdot 9^{x-1}$;

$$1) \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 8^x \geq 6 \cdot 9^{x-1}; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ 8^x \geq \frac{2}{3} \cdot 9^x; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ \left(\frac{8}{9}\right)^x \geq \frac{2}{3}; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ x \leq \log_{\frac{8}{9}} \frac{2}{3}; \end{cases}$$

$$1 \leq x \leq \log_{\frac{8}{9}} \frac{2}{3};$$

$$2) \begin{cases} x-1 < 0, \\ 8^x \geq 6 \cdot 9^{1-x}; \end{cases} \begin{cases} x < 1, \\ 8^x \geq 9 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^x \cdot 6; \end{cases} \begin{cases} x < 1, \\ (8 \cdot 9)^x = 54; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 1, \\ x \geq \log_{72} 54; \end{cases} \log_{72} 54 \leq x < 1. \quad \text{Ответ: } \left[\log_{72} 54; \log_{\frac{8}{9}} \frac{2}{3} \right).$$

6.184. $25^{x+1} \geq 10 \cdot 32^{|x-1|+1}$,

$$1) \begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 25^{x+1} \geq 10 \cdot 32^x; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ \frac{5^{2x+2}}{5} \geq 2 \cdot 32^x; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ 5^{2x+1} \geq 2^{5x+1}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ 2x+1 \geq (5x+1)\log_5 2; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ x(2 - \log_5 32) \geq \log_5 2 - 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ x \leq \frac{\log_5 2 - 1}{2 - 5\log_5 2}; \end{cases} \quad x \in \left[1; \frac{\log_5 2 - 1}{2 - 5\log_5 2} \right];$$

$$\frac{\log_5 2 - 1}{2 - 5\log_5 2} = \log_{\frac{25}{32}} \frac{2}{3} > 1, m.k. \frac{2}{5} < \frac{25}{32}$$

$$2) \begin{cases} x-1 < 0, \\ 25^{x+1} \geq 10 \cdot 32^{1-x+1}; \end{cases} \begin{cases} x < 1, \\ \frac{5^{2x+2}}{5} \geq 2 \cdot 32^{2-x}; \end{cases} \begin{cases} x < 1, \\ 5^{2x+1} \geq 2^{11-5x}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 1, \\ 2x+1 \geq (11-5x)\log_5 2; \end{cases} \begin{cases} x < 1, \\ x \geq \frac{11\log_5 2 - 1}{2 + 5\log_5 2}; \end{cases}$$

$$\frac{11\log_5 2 - 1}{2 + 5\log_5 2} = \frac{\log_5 509,6}{\log_5 800}; \quad x \in \left[\frac{11\log_5 2 - 1}{2 + 5\log_5 2}; 1 \right).$$

Ответ: $\left[\frac{11\log_5 2 - 1}{2 + 5\log_5 2}; \frac{\log_5 2 - 1}{2 - 5\log_5 2} \right]$.

6.185. $|e^x - 1| = (2x + 3)(e^x - 1)$;

$$1) \begin{cases} e^x - 1 \geq 0, \\ (e^x - 1)(1 - 2x - 3) = 0; \end{cases} \begin{cases} e^x \geq 1, \\ \begin{cases} e^x = 1, & x = 0; \\ x = -1; \end{cases} \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} e^x - 1 < 0, \\ (e^x - 1)(2x + 3 + 1) = 0; \end{cases} \begin{cases} e^x < 1, \\ x = -2; \end{cases} \quad \text{Ответ: } -2; 0.$$

6.186. $\sin^2 x = \cos x \cdot |\sin x|$;

$$1) \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin^2 x - \cos x \sin x = 0; \end{cases} \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \begin{cases} \sin x = 0, \\ \sin x = \cos x; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} x = \pi n, n \in Z, \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in Z; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin^2 x + \cos x \sin x = 0; \end{cases} \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin x = 0, \\ \sin x = -\cos x; \end{cases}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in Z. \text{ Ответ: } \pi n; x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, n, k \in Z.$$

$$6.187. \cos^2 x = \sin x \cdot |\cos x|;$$

$$1) \begin{cases} \cos x \geq 0, \\ \cos^2 x = \sin x \cdot \cos x; \end{cases} \begin{cases} \cos x \geq 0, \\ \cos x = 0, \\ \cos x = \sin x; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x \geq 0, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in Z; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z, \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in Z; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \cos x < 0, \\ \cos^2 x = -\sin x \cdot \cos x; \end{cases} \begin{cases} \cos x < 0, \\ \cos x = 0, \\ \cos x = -\sin x; \end{cases} \begin{cases} \cos x < 0, \\ x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z; \end{cases}$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi l, l \in Z. \text{ Ответ: } \frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi m; \frac{3\pi}{4} + 2\pi l, k, m, l \in Z.$$

$$6.188. |e^x - 1| = (3x + 2)(e^x - 1);$$

$$1) \begin{cases} e^x - 1 \geq 0, \\ (e^x - 1)(3x + 2 - 1) = 0; \end{cases} \begin{cases} e^x \geq 1, \\ e^x = 1, \\ x = -\frac{1}{3}; \end{cases} x = 0;$$

$$2) \begin{cases} e^x - 1 < 0, \\ (e^x - 1)(3x + 2 + 1) = 0; \end{cases} \begin{cases} e^x < 1, \\ x = -1; \end{cases} x = -1. \text{ Ответ: } -1; 0.$$

$$6.189. |\sin x| + \sin x(x - 4)^2 = 0;$$

$$1) \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x(1 + (x - 4)^2) = 0; \end{cases} \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x = 0; \end{cases} x = \pi n, n \in Z;$$

$$2) \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin x((x - 4)^2 - 1) = 0; \end{cases} \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ (x - 3)(x - 5) = 0; \end{cases} x = 5.$$

$$\text{Ответ: } 5; \pi n, n \in Z.$$

6.190. $\sin x + |\sin x|(x + 1,5)^2 = 0;$

1) $\begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x(1 + (x + 1,5)^2) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq \sin x \leq 1, \\ \sin x = 0; \end{cases} \quad x = \pi k, k \in Z;$

2) $\begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ \sin x(1 - (x + 1,5)^2) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} -1 \leq \sin x < 0, \\ (x + 2,5)(-x - 0,5) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -0,5, \\ x = -2,5. \end{cases}$

Ответ: $-0,5; -2,5; \pi k, k \in Z.$

6.191. $|\log_2 x - 1| = (4 - 8x)(\log_2 x - 1);$

1) $\begin{cases} \log_2 x - 1 \geq 0, \\ (\log_2 x - 1)(1 - 4 + 8x) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \log_2 x \geq 1, \\ x > 0, \\ \begin{cases} x = 2, \\ x = \frac{3}{8}; \end{cases} \end{cases} \quad x = 2;$

2) $\begin{cases} \log_2 x - 1 < 0, \\ (\log_2 x - 1)(4 - 8x + 1) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \log_2 x < 1, \\ x > 0, \\ \begin{cases} x = 2, \\ x = \frac{5}{8}; \end{cases} \end{cases} \quad x = \frac{5}{8}.$

Ответ: $2; \frac{5}{8}.$

6.192. $|\log_2 x - 1| = (2x + 5)(\log_2 x - 1);$

1) $\begin{cases} \log_2 x - 1 \geq 0, \\ (\log_2 x - 1)(1 - 2x - 5) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \log_2 x \geq 1, \\ x > 0, \\ \begin{cases} \log_2 x = 1, \\ x = -2; \end{cases} \end{cases} \quad x = 2;$

2) $\begin{cases} \log_2 x - 1 < 0, \\ (\log_2 x - 1)(2x + 5 + 1) = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \log_2 x < 1, \\ x > 0, \\ \begin{cases} \log_2 x = 1, \\ x = -3; \end{cases} \end{cases} \quad \text{решений нет.}$

Ответ: 2.

$$6.193. \begin{cases} 2|x-2|+3|y+1|=20, \\ 2x-y=3; \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} x \geq 2, \\ y \geq -1, \\ 2x-4+3y+3=20, \\ y=2x-3; \end{cases} \begin{cases} x \geq 2, \\ y \geq -1, \\ 2x+6x-9-1=20, \\ y=2x-3; \end{cases} \begin{cases} x \geq 2, \\ y \geq -1, \\ x=3,75, \\ y=4,5; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x \geq 2, \\ y < -1, \\ 2x-4-3y-3=20, \\ y=2x-3; \end{cases} \begin{cases} x \geq 2, \\ y < -1, \\ 2x-7-6x+9=20, \\ y=2x-3; \end{cases} \begin{cases} x \geq 2, \\ y < -1, \\ x=-4,5, \\ y=-12; \end{cases}$$

решений нет.

$$3) \begin{cases} x < 2, \\ y \geq -1, \\ -2x+4+3y+3=20, \\ y=2x-3; \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ y \geq -1, \\ x=5,5, \\ y=2x-3; \end{cases} \text{решений нет.}$$

$$4) \begin{cases} x < 2, \\ y < -1, \\ -2x+4-3y-3=20, \\ y=2x-3; \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ y < -1, \\ -2x-6x=10, \\ y=2x-3; \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ y < -1, \\ x=-1,25, \\ y=-5,5; \end{cases}$$

Ответ: (3,75; 4,5); (-1,25; -5,5).

$$6.194. \begin{cases} 3|x+1|+2|y-2|=20, \\ x+2y=4; \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} x+1 \geq 0, \\ y-2 \geq 0, \\ 3x+3+2y-4=20, \\ x=4-2y; \end{cases} \begin{cases} x \geq -1, \\ y \geq 2, \\ 12-6y+2y-1=20, \\ x=4-2y; \end{cases} \begin{cases} x \geq -1, \\ y \geq 2, \\ y=-2\frac{1}{4}, \\ x=4-2y; \end{cases}$$

решений нет;

$$2) \begin{cases} x+1 \geq 0, \\ y-2 < 0, \\ 3x+3-2y+4=20, \\ x=4-2y; \end{cases} \begin{cases} x \geq -1, \\ y < 2, \\ 12-6y+7-2y=20, \\ x=4-2y; \end{cases} \begin{cases} x \geq -1, \\ y < 2, \\ y=-\frac{1}{8}, \\ x=4\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\left(4\frac{1}{4}; -\frac{1}{8}\right);$$

$$3) \begin{cases} x+1 < 0, \\ y-2 \geq 0, \\ -3x-3+2y-4=20, \\ x=4-2y; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -1, \\ y \geq 2, \\ -12+6y+2y-7=20, \\ x=4-2y; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -1, \\ y \geq 2, \\ y=4\frac{7}{8}, \\ x=-5\frac{3}{4}; \end{cases};$$

$$\left(-5\frac{3}{4}; 4\frac{7}{8}\right).$$

$$4) \begin{cases} x+1 < 0, \\ y-2 < 0, \\ -3x-3-2y+4=20, \\ x=4-2y; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -1, \\ y < 2, \\ -12+6y-2y+1=20, \\ x=4-2y; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -1, \\ y < 2, \\ y=7\frac{3}{4}, \\ x=4-2y; \end{cases};$$

решений нет.

$$\text{Ответ: } \left(4\frac{1}{4}; -\frac{1}{8}\right); \left(-5\frac{3}{4}; 4\frac{7}{8}\right).$$

$$6.195. \begin{cases} 4|x-3|+|y+2|=7, \\ x+2y=4; \end{cases} \quad \begin{cases} 4|4-2y-3|+|y+2|=7, \\ x=4-2y; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4|1-2y|+|y+2|=7, \\ x=4-2y; \end{cases} \quad 4|1-2y|+|y+2|=7;$$

$$1) \begin{cases} y \geq \frac{1}{2}, \\ -4+8y+y+2=7; \end{cases} \quad \begin{cases} y \geq \frac{1}{2}, \\ 9y=9; \end{cases} \quad \begin{cases} y \geq \frac{1}{2}, \\ y=1; \end{cases} \quad y=1, x=2;$$

$$2) \begin{cases} -2 \leq y < \frac{1}{2}, \\ 4(1-2y)+y+2=7; \end{cases} \quad \begin{cases} -2 \leq y < \frac{1}{2}, \\ -7y=1; \end{cases} \quad \begin{cases} -2 \leq y < \frac{1}{2}, \\ y=-\frac{1}{7}; \end{cases}$$

$$y=-\frac{1}{7}, x=4\frac{2}{7};$$

$$3) \begin{cases} y < -2, \\ 4-8y-y-2=7; \end{cases} \quad \begin{cases} y < -2, \\ -9y=5; \end{cases} \quad \begin{cases} y < -2, \\ y=-\frac{5}{9}; \end{cases} \quad \text{решений нет.}$$

$$\text{Ответ: } (2; 1); \left(4\frac{2}{7}; -\frac{1}{7}\right).$$

$$6.196. \begin{cases} 2|x-1|-3|y+2|=1, \\ 2x+y=3; \end{cases} \quad \begin{cases} 2|x-1|-3|5-2x|=1, \\ y=3-2x; \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} x \geq \frac{5}{2}, \\ 2(x-1)-3(2x-5)=1; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq \frac{5}{2}, \\ -4x=-12; \end{cases} \quad x=3, y=-3;$$

$$2) \begin{cases} 1 \leq x < \frac{5}{2}, \\ 2x-2-15+6x=1; \end{cases} \quad \begin{cases} 1 \leq x < \frac{5}{2}, \\ 8x=18; \end{cases} \quad \begin{cases} 1 \leq x < \frac{5}{2}, \\ x=2\frac{1}{4}; \end{cases} \quad x=2,25, y=-1,5;$$

$$3) \begin{cases} x < 1, \\ 2-2x-15+6x=1; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 1, \\ 4x=14; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 1, \\ x=\frac{7}{2}; \end{cases} \quad \text{решений нет.}$$

Ответ: (3; -3); (2,25; -1,5).

$$6.197. \begin{cases} \sqrt{x^2-2x}=y-1, \\ y+2|x|=1; \end{cases}$$

$$1) x \geq 0: \begin{cases} x^2-2x=(y-1)^2, \\ y \geq 1, \\ y+2x=1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2-2x=4x^2, \\ y \geq 1, \\ y=1-2x; \end{cases} \quad \begin{cases} 3x^2+2x=0, \\ y \geq 1, \\ y=1-2x; \end{cases} \quad \begin{cases} x=0, \\ x=-\frac{2}{3}, \\ y \geq 1, \\ y=1-2x; \end{cases}$$

$x_1=0, y_1=1;$

$$2) x < 0: \begin{cases} x^2-2x=(y-1)^2, \\ y \geq 1, \\ y-2x=1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2-2x=4x^2, \\ y \geq 1, \\ y=1+2x; \end{cases} \quad \begin{cases} 3x^2+2x=0, \\ y \geq 1, \\ y=1+2x; \end{cases} \quad \begin{cases} x=0, \\ x=-\frac{2}{3}, \\ y \geq 1, \\ y=1+2x; \end{cases}$$

решений нет. Ответ: (0; 1);

$$6.198. \begin{cases} x-\sqrt{x^2-2y+1}=1, \\ x+|y|=2; \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} \sqrt{x^2 - 2y + 1} = x - 1, \\ x + y = 2, \\ y \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x^2 - 2y + 1 = x^2 - 2x + 1, \\ y = 2 - x, \\ y \geq 0, \\ x \geq 1; \end{cases} \begin{cases} x = y, \\ y = 2 - x, \\ y \geq 0, \\ x \geq 1; \end{cases} \begin{cases} x = 1, \\ y = 1; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x^2 - 2y + 1 = x^2 - 2x + 1, \\ x - y = 2, \\ y < 0, \\ x \geq 1; \end{cases} \begin{cases} y < 0, \\ x = y, \\ x - y = 2, \\ x \geq 1; \end{cases} \text{решений нет.}$$

Ответ: (1; 1).

6.199. $2|x + 1| > x + 4$;

$$1) \begin{cases} x \geq -1, \\ 2x + 2 > x + 4; \end{cases} \begin{cases} x \geq -1, \\ x > 2; \end{cases} \quad x > 2;$$

$$2) \begin{cases} x + 1 < 0, \\ -2x - 2 > x + 4; \end{cases} \begin{cases} x < -1, \\ x < -2; \end{cases} \quad x < -2; \quad \text{Ответ: } (-\infty; -2) \cup (2; \infty).$$

6.200. $3|x - 1| \leq x + 3$;

$$1) \begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ 3x - 3 \leq x + 3; \end{cases} \begin{cases} x \geq 1, \\ x \leq 3; \end{cases} \quad x \in [1; 3];$$

$$2) \begin{cases} x - 1 < 0, \\ 3 - 3x \leq x + 3; \end{cases} \begin{cases} x < 1, \\ x \geq 0; \end{cases} \quad [0; 1). \quad \text{Ответ: } [0; 3].$$

6.201. $4|x + 2| < 2x + 10$;

$$1) \begin{cases} x + 2 \geq 0, \\ 4x + 8 < 2x + 10; \end{cases} \begin{cases} x \geq -2, \\ x < 1; \end{cases} \quad x \in [-2; 1);$$

$$2) \begin{cases} x + 2 < 0, \\ -4x - 8 < 2x + 10; \end{cases} \begin{cases} x < -2, \\ x > -3; \end{cases} \quad x \in (-3; -2). \quad \text{Ответ: } (-3; -1).$$

6.202. $3|x + 1| \geq x + 5$;

$$1) \begin{cases} x + 1 \geq 0, \\ 3x + 3 \geq x + 5; \end{cases} \begin{cases} x \geq -1, \\ x \geq 1; \end{cases} \quad x \geq 1;$$

$$2) \begin{cases} x + 1 < 0, \\ -3x - 3 \geq x + 5; \end{cases} \begin{cases} x < -1, \\ x \leq -2; \end{cases} \quad x \leq -2. \quad \text{Ответ: } (-\infty; -2] \cup [1; \infty).$$

6.203. $3x^2 - |x - 3| > 9x - 2$;

$$1) \begin{cases} x - 3 \geq 0, \\ 3x^2 - x + 3 > 9x - 2; \end{cases} \begin{cases} x \geq 3, \\ 3x^2 - 10x + 5 > 0; \end{cases} \quad \frac{D}{4} = 25 - 15 = 10;$$

$$\begin{cases} x \geq 3, \\ 3\left(x - \frac{5 + \sqrt{10}}{3}\right)\left(x - \frac{5 - \sqrt{10}}{3}\right) > 0; \end{cases}$$

$$x \geq 3;$$

$$2) \begin{cases} x - 3 < 0, \\ 3x^2 + x - 3 > 9x - 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 3, \\ 3x^2 - 8x - 1 > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 3, \\ 3\left(x - \frac{4 - \sqrt{19}}{3}\right)\left(x - \frac{4 + \sqrt{19}}{3}\right) > 0; \end{cases} \quad x \in \left(-\infty; \frac{4 - \sqrt{19}}{3}\right) \cup \left(\frac{4 + \sqrt{19}}{3}; 3\right).$$

$$\text{Ответ: } \left(-\infty; \frac{4 - \sqrt{19}}{3}\right) \cup \left(\frac{4 + \sqrt{19}}{3}; \infty\right).$$

$$6.204. x^2 + 4 \geq |3x + 2| - 7x;$$

$$1) \begin{cases} 3x + 2 \geq 0, \\ x^2 + 4 - 3x - 2 + 7x \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq -\frac{2}{3}, \\ x^2 + 4x + 2 \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -\frac{2}{3}, \\ 3(x + 2 - \sqrt{2})(x + 2 + \sqrt{2}) \geq 0; \end{cases}$$

$$x \in [-2 + \sqrt{2}; \infty);$$

$$2) \begin{cases} 3x + 2 < 0, \\ x^2 + 4 + 3x + 2 + 7x \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -\frac{2}{3}, \\ x^2 + 10x + 6 \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -\frac{2}{3}, \\ 3(x + 5 - \sqrt{19})(x + 5 + \sqrt{19}) \geq 0; \end{cases}$$

$$x \in (-\infty; -5 - \sqrt{19}].$$

$$\text{Ответ: } (-\infty; -5 - \sqrt{19}] \cup [-2 + \sqrt{2}; \infty).$$

$$6.205. |x - 2| - x < 2x^2 - 9x + 9;$$


$$1) \begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ x - 2 - x - 2x^2 + 9x - 9 < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 2, \\ 2x^2 - 9x + 11 > 0; \end{cases} \quad D < 0; x \geq 2;$$

$$2) \begin{cases} x-2 < 0, \\ 2-x-x-2x^2+9x-9 < 0; \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ 2x^2-7x+7 > 0; \end{cases} D < 0; x < 2.$$


Ответ: $(-\infty; \infty)$.

6.206. $x^2 - |5x-3| - x < 2;$

$$1) \begin{cases} 5x-3 \geq 0, \\ x^2-5x+3-x-2 < 0; \end{cases} \begin{cases} x \geq 0,6, \\ x^2-6x+1 < 0; \end{cases}$$



$$2) \begin{cases} 5x-3 < 0, \\ x^2+5x-3-x-2 < 0; \end{cases} \begin{cases} x < 0,6, \\ x^2+4x-5 < 0; \end{cases}$$



Параметры

$$6.207. \frac{a}{2a-x} = 3; \begin{cases} x \neq 2a, \\ a = 6a - 3x; \end{cases} \begin{cases} x \neq 2a, \\ 3x = 5a; \end{cases} \begin{cases} x \neq 2a, \\ x = \frac{5}{3}a. \end{cases}$$

Т.к. $2a = \frac{5}{3}a$ только при $a = 0$, то решение уравнения - $x = \frac{5}{3}a$

($a \neq 0$). Ответ: при $a = 0$ нет решения; при $a \neq 0$: $x = \frac{5}{3}a$.

$$6.208. \frac{a}{a-2x} = 3; \text{ О.Д.З. } a-2x \neq 0; x \neq \frac{a}{2}. \text{ Тогда:}$$

$a = 3a - 6x; 6x = 2a; x = \frac{a}{3}$. Т.к. $\frac{a}{3} = \frac{a}{2}$ только при $a = 0$, то $x = \frac{a}{3}$ - решение уравнения при $a \neq 0$; при $a = 0$ нет решений.

Ответ: при $a = 0$ нет решений; при $a \neq 0$: $x = \frac{a}{3}$.

$$6.209. \frac{a}{2a-x} = 2; \begin{cases} x \neq 2a; \\ a = 4a - 2x; \end{cases} \begin{cases} 2x = 3a; \\ x = \frac{3}{2}a; \end{cases}$$

$2a = \frac{3}{2}a$ при $a = 0$. При $a = 0$ нет решений.

Ответ: при $a = 0$ нет решений; при $a \neq 0$: $x = \frac{3}{2}a$.

6.210. $\frac{a}{a-2x} = 2$. Уравнение имеет смысл при $x \neq \frac{a}{2}$.

При этом $a = 2a - 4x$; $x = \frac{a}{4}$. Т.к. $\frac{a}{4} = \frac{a}{2}$ при $a = 0$, то при $a = 0$ реше-

ний нет. Ответ: если $a = 0$, то решений нет, если $a \neq 0$, то $x = \frac{a}{4}$.

6.211. $|x + 2a| \cdot x + 1 - a = 0$.

Так как $x = 2$ – корень уравнения, то $|2 + 2a| \cdot 2 + 1 - a = 0$;

$$\begin{cases} a \geq -1, \\ 4 + 4a + 1 - a = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a < -1, \\ -4 - 4a + 1 - a = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \geq -1, \\ a = -\frac{5}{3}; \end{cases} \quad \begin{cases} a < -1, \\ a = -\frac{3}{5}; \end{cases} \quad \text{решений нет.}$$

Ответ: таких значений a нет.

6.212. $2 \geq |x + 3a| + x^2$, $x = 3$ не является решением.

Найдем те значения a , при которых 3 – решение неравенства, т.е.

$2 \geq |3 + 3a| + 9$; $|3 + 3a| \leq -7$, т.к. $|3 + 3a| \geq 0$; $-7 < 0$, то решений нет;

$x = 3$ не является решением при любых значениях a . Ответ: $(-\infty; \infty)$.

6.213. $4 - |x - 2a| < x^2$, $x = -3$.

Так как -3 – решение неравенства, то $4 - |-3 - 2a| < 9$; $|-3 - 2a| > -5$, неравенство верно при любых значениях a . Ответ: $(-\infty; \infty)$.

6.214. $3 - |x - 2a| > x^2$, $x = -2$. Так как $x = -2$ – решение, то a удовлетворяет неравенству: $3 - |-2 - 2a| > 4$; $|-2 - 2a| < -1$. Так как $|-2 - 2a| \geq 0$, то неравенство не имеет решений. Ответ: решений нет.

6.215. $-2 \leq |x + 3a| - x^2$, $x = 2$. Найдем значения a , при которых $x = 2$ – решение неравенства, т.е. $-2 \leq |2 + 3a| - 4$; $|2 + 3a| \geq 2$;

$$\begin{cases} 2 + 3a \geq 0, \\ 2 + 3a \geq 2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 2 + 3a < 0, \\ 2 + 3a \leq -2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \geq -\frac{2}{3}, \\ a \geq 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a < -\frac{2}{3}, \\ a \leq -\frac{4}{3}; \end{cases}$$

$$a \geq 0 \quad \text{или} \quad a \leq -\frac{4}{3};$$

$x = 2$ решение неравенства при $a \in \left(-\infty; -\frac{4}{3}\right] \cup [0; \infty)$. Значит,

$x = 2$ не является решением неравенства при $a \in \left(-\frac{4}{3}; 0\right)$.

Ответ: $\left(-\frac{4}{3}; 0\right)$.

6.216. $x^2 + 4x - 2|x - a| + 2 - a = 0$, $x = -1$. Найдем, при каких значениях a $x = -1$ – корень уравнения: $1 - 4 - 2| -1 - a| + 2 - a = 0$; $2| -1 - a| + 1 + a = 0$;

$$\begin{cases} -1 - a \geq 0, \\ -2 - 2a + 1 + a = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -1 - a < 0, \\ 2 + 2a + 1 + a = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \leq -1, \\ a = -1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a > -1, \\ a = -1 \end{cases} \quad \text{– решений нет;}$$

откуда $a = -1$; $x = -1$ не является корнем при $a \neq -1$.

Ответ: $(-\infty; -1) \cup (-1; \infty)$.

6.217. $|x - a| x + 1 - 2a = 0$, $x = -2$. Так как $x = -2$ – корень, то a удовлетворяет уравнению: $-2| -2 - a| + 1 - 2a = 0$;

$$\begin{cases} -2 - a \geq 0, \\ 4 + 2a + 1 - 2a = 0; \end{cases} \quad \text{решений нет;}$$

$$\begin{cases} -2 - a < 0, \\ -4 - 2a + 1 - 2a = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a > -2, \\ a = -\frac{3}{4}; \end{cases} \quad a = -\frac{3}{4}.$$

Ответ: при $a = -\frac{3}{4}$.

6.218. $|2x + a| \cdot (x^2 + 1) + 3 - 2a = 0$, $x = 1$. Найдем значения a , при которых $x = 1$ является корнем. $|2 + a| \cdot 2 + 3 - 2a = 0$;

$$1) \begin{cases} 2 + a \geq 0, \\ 4 + 2a + 3 - 2a = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a \geq -2, \\ 7 = 0; \end{cases} \quad \text{решений нет;}$$

$$2) \begin{cases} 2 + a < 0, \\ -4 - 2a + 3 - 2a = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a < -2, \\ a = -\frac{1}{4}; \end{cases} \quad \text{решений нет.}$$

Значит, $x = 1$ не является решением уравнения при всех $a \in R$.

Ответ: $(-\infty; \infty)$.

$$6.219. \left(a - 3x^2 - \cos \frac{11\pi}{4} x \right) \sqrt{8 - ax} = 0, \quad x = 2.$$

По условию $x = 2$ – корень, тогда a удовлетворяет уравнению:

$$(a - 12)\sqrt{8 - 2a} = 0, \quad \text{которое равносильно совокупности:}$$

$$\begin{cases} a - 12 = 0, \\ 8 - 2a \geq 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 8 - 2a = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 12, \\ a \leq 4; \end{cases} \quad \text{решений нет;} \quad a = 4. \quad \text{Ответ: 4.}$$

$$6.220. \left(a - 3x^2 - \sin \frac{11\pi}{4} x \right) \sqrt{11 - 3ax} = 0, \quad x = 2.$$

Так как $x = 2$ – корень уравнения, то a удовлетворяет уравнению:

$$(a - 12 + 1)\sqrt{11 - 6a} = 0; \quad (a - 11)\sqrt{11 - 6a} = 0;$$

$$\begin{cases} a = 11, \\ 11 - 6a = 0, \\ 11 - 6a \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a = 11, \\ a = \frac{11}{6}, \\ a \leq \frac{11}{6}; \end{cases} \quad a = \frac{11}{6}.$$

$$6.221. 2x^6 - x^4 - ax^2 = 1. \quad f(x) = 2x^6 - x^4 - ax^2 - 1, \quad D(f) = R.$$

Функция четная, поэтому, чтобы данное уравнение имело три корня, один из корней должен быть равен 0 ($f(x)$, значит если $x \neq 0$, то число корней четно). Проверка показывает, что $x = 0$ не является решением уравнения, значит, уравнение не может иметь три корня. Ответ: нет.

$$6.222. 2x^8 - 3ax^6 + 4x^4 - ax^2 = 5. \quad \text{Пусть } f(x) = 2x^8 - 3ax^6 + 4x^4 - ax^2 - 5, \quad D(f) = R. \text{ Так как функция } f(x) \text{ четная, то если } x_0 \text{ – корень уравнения } f(x) = 0, \text{ то } -x_0 \text{ также является корнем этого уравнения.}$$

Заметим, что $x=0$ не является корнем уравнения, значит, корней четное число. Таким образом, 5 корней уравнение иметь не может.

Ответ: не может.

$$6.223. 3^x + 3^{-x} = ax^4 + 2x^2 + 2. \quad \text{Пусть } f(x) = 3^x + 3^{-x} - (ax^4 + 2x^2 + 2), \quad D(f) = R. \quad f(x) \text{ – четная функция. } f(0) = 0, \text{ значит, } x = 0 \text{ – корень уравнения.}$$

Аналогично задаче 6.222 получим, что число корней нечетное.

Ответ: данное уравнение имеем нечетное число корней.

$$6.224. 4^x - 4^{-x} = x^3 + 2ax^2. \quad \text{Пусть } f(x) = 4^x - 4^{-x} - x^3 - 2ax. \text{ Заметим, что } f(x) = -f(-x) \text{ и } x=0 \text{ – является нулем функции } f(x), \text{ значит } f(x) \text{ – имеем нечетное число нулей.} \quad \text{Доказано.}$$

6.225. $\log_3(9^x + 9a^3) = x$. Уравнение равносильно системе:

$$\begin{cases} 9^x + 9a^3 > 0, \\ 9^x + 9a^3 - 3^x = 0, \text{ замена } t = 3^x, t > 0; t^2 - t + 9a^3 = 0. \\ 9^x + 9a^3 = 3^x; \end{cases}$$


Чтобы исходное уравнение имело ровно два корня, полученное уравнения должно иметь два положительных корня. Это возможно, когда $D > 0$ и $t_1 \cdot t_2 > 0$, $t_1 + t_2 < 0$ (теорема Виета).

$$\begin{cases} t_1 \cdot t_2 = 9a^3 > 0, \\ t_1 + t_2 = -1 < 0, \\ D = 1 - 36a^3 > 0, \end{cases} \text{ то } \begin{cases} a > 0, \\ a < \sqrt[3]{\frac{1}{36}}. \end{cases} \text{ Ответ: } \left(0; \sqrt[3]{\frac{1}{36}}\right).$$

6.226. $\log_2(4^x - a) = x$; $4^x - a = 2^x$, $2^x = t$, $t > 0$; $t^2 - t - a = 0$.
 Исходное уравнение будет иметь единственный корень, если уравнение $t^2 - t - a = 0$ имеет единственный положительный. Уравнение имеет единственный корень при $D = 0$;

$1 + 4a = 0$; $a = -1/4$; $t = 1/2 > 0$ – верно. Ответ: $-\frac{1}{4}$.

6.227. $\log_2(4^x + a^3) + x = 0$; $4^x + a^3 = 2^{-x}$, замена $2^x = t$, $t > 0$;



$$t^2 + a^3 = \frac{1}{t}; \quad 1 - t^3 = a^3 t.$$

Решим графически
 Из графика видно, что ни при каком значении a уравнение не может иметь двух положительных корней.
 Ответ: решений нет.

6.228. $x - \log_3(2a - 9^x) = 0$; $x = \log_3(2a - 9^x)$; $3^x = 2a - 9^x$.
 Замена: $3^x = t$, $t > 0$; $t^2 + t - 2a = 0$. Исходное уравнение не имеет корней, если:

- 1) уравнение $t^2 + t - 2a = 0$ не имеет корней, т.е. $D < 0$;
- 2) оба корня уравнения $t^2 + t - 2a = 0$ – неположительны.

1) $D = 1 + 8a$; $D < 0$; $1 + 8a < 0$; $a < -\frac{1}{8}$;

2) Используя теорему Виета:
$$\begin{cases} 1 + 8a \geq 0, \\ -1 \leq 0, \\ -2a \geq 0; \end{cases} \begin{cases} a \geq -\frac{1}{8}, \\ a \leq 0. \end{cases}$$

Таким образом, при $a \leq 0$ уравнение не имеет решений.
 Ответ: $(-\infty; 0]$.

6.229. $|x - 1| = ax + 2$;

1) $\begin{cases} x \geq 1, \\ x - 1 = ax + 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 1, \\ x(1 - a) = 3; \end{cases}$

2) $\begin{cases} x < 1, \\ 1 - x = ax + 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 1, \\ x(1 + a) = -1. \end{cases}$ Рассмотрим первую систему:

$\begin{cases} x \geq 1, \\ x(1 - a) = 3. \end{cases}$ При $a = 1$ решений нет; $a \neq 1$, то $x = \frac{3}{1 - a}$.

Проверим $x \geq 1$: $\frac{3}{1 - a} \geq 1$; $\begin{cases} 1 - a > 0, & \{a < 1, \\ 3 \geq 1 - a & \{a \geq -2 \end{cases}$.

При $a \in [-2; 1)$ $x = \frac{3}{1 - a}$. Для второй системы:

$\begin{cases} x < 1, \\ x(1 + a) = -1. \end{cases}$ При $a = -1$ решений нет; $a \neq -1$, то $x = -\frac{1}{a + 1}$;

$-\frac{1}{a + 1} < 1$; $\begin{cases} a + 1 > 0, & \{a > -1, \\ -1 < a + 1 & \{a < -2 \end{cases}$ или $\begin{cases} a + 1 < 0, & \{a < -1, \\ -1 > a + 1; & \{a > -2 \end{cases}$ или $\begin{cases} a < -1, \\ a < -2; \end{cases}$

$a \in (-\infty; -2) \cup (-1; \infty)$, $x = -\frac{1}{a + 1}$.

Ответ: $a \in (-\infty; -2) \cup [1; \infty)$, $x = -\frac{1}{a + 1}$; $a \in [-2; -1]$, $x = \frac{3}{1 - a}$;

$a \in (-1; 1)$, $x = -\frac{1}{a + 1}$, $x = \frac{3}{1 - a}$.

6.230. $|x + 1| = 3 - ax$. Решим графически:

Из графика видно, что при $a \in (-1; 1)$ решения два;

$a \in (-\infty; -1] \cup [1; \infty)$ – решений одно.

Ответ: $a \in (-1; 1)$ – корни два,


$a \in (-\infty; -1] \cup [1; \infty)$ – один корень.

6.231.

$|x + 2| + 1 = a - 2x$;

Из графика видно, что при любом a , уравнение имеет один корень.

Ответ: $(-\infty; \infty)$.



6.232. $|x-2|-1 = a-3x$; $|x-2| = a+1-3x$;

1) $\begin{cases} x \geq 2, \\ x-2 = a+1-3x; \end{cases} \begin{cases} x \geq 2, \\ x = \frac{a+3}{4}; \end{cases} x = \frac{a+3}{4} \geq 2, \text{ значит, } a+3 \geq 8; a \geq 5;$


2) $\begin{cases} x < 2, \\ -x+2 = a+1-3x; \end{cases} \begin{cases} x < 2, \\ x = \frac{a-1}{2}; \end{cases} x = \frac{a-1}{2} < 2, \text{ значит, } a-1 < 4; a < 5.$

Следовательно, при всех значения a решение единственное.

Ответ: $(-\infty; \infty)$.

Неравенства


6.233. $(2x-3)\sqrt{3x^2-5x-2} > 0$.



$$\begin{cases} 2x-3 > 0, \\ 3x^2-5x-2 > 0; \end{cases} \begin{cases} x > \frac{3}{2}, \\ 3(x-2)\left(x+\frac{1}{3}\right) > 0. \end{cases}$$

Ответ: $(2; \infty)$.


6.234. $(4x-x^2-3)\sqrt{5x-8} \leq 0$;



$$\begin{cases} 4x-x^2-3 \leq 0, \\ 5x-8 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} -(x-3)(x-1) \leq 0, \\ x \geq \frac{8}{5}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x-3)(x-1) \geq 0, \\ x \geq \frac{8}{5}. \end{cases} \text{ Ответ: } [3; \infty) \cup \left\{\frac{8}{5}\right\}.$$


6.235. $(6x-5)\sqrt{2x^2-5x+2} \geq 0$;



$$\begin{cases} 6x-5 \geq 0, \\ 2x^2-5x+2 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x \geq \frac{5}{6}, \\ 2(x-2)\left(x-\frac{1}{2}\right) \geq 0. \end{cases}$$


Ответ: $[2; \infty) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

6.236. $(3x - x^2 - 2)\sqrt{7x + 4} < 0;$


$$\begin{cases} 3x - x^2 - 2 < 0, \\ 7x + 4 > 0; \end{cases} \begin{cases} (x-2)(x-1) > 0, \\ x > -\frac{4}{7}. \end{cases}$$


Ответ: $\left(-\frac{4}{7}; 1\right) \cup (2; \infty)$.


6.237. $(3x + 4)\sqrt{-3x - 2x^2 - 1} < 0;$

$$\begin{cases} 3x + 4 < 0, \\ -3x - 2x^2 - 1 > 0; \end{cases} \begin{cases} x < -\frac{4}{3}, \\ 2x^2 + 3x + 1 < 0; \end{cases}$$


$$\begin{cases} x < -\frac{4}{3}, \\ 2(x+1)\left(x + \frac{1}{2}\right) < 0. \end{cases}$$
 Ответ: решений нет.

6.238. $(3x^2 - x - 2)\sqrt{2x - 1} \geq 0.$
 $f(x) = (3x^2 - x - 2)\sqrt{2x - 1}.$

 $D(f) = \left[\frac{1}{2}; \infty\right); f(x) = 0$ при $x = \frac{1}{2}; x = 1; \left(x = -\frac{2}{3} \notin D(f)\right).$


Ответ: $\{1/2\} \cup [1; \infty)$.

6.239. $(7x + 2)\sqrt{4x - 3x^2 - 1} \leq 0;$
 $f(x) = (7x + 2)\sqrt{4x - 3x^2 - 1}; D(f) = \left[\frac{1}{3}; 1\right];$


$f(x)$ — непрерывна при $x \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$. Нули функции: $x = \frac{1}{3}; x = 1; x = -2/7$.

Ответ: $x = 1/3; x = 1$.

6.240. $(2x^2 - 3x - 2)\sqrt{3x + 1} > 0;$

$$\begin{cases} 3x + 1 > 0, \\ 2x^2 - 3x - 2 > 0; \end{cases} \begin{cases} x > -\frac{1}{3}, \\ 2(x-2)\left(x + \frac{1}{2}\right) > 0. \end{cases}$$


Ответ: $(2; \infty)$.

6.241. $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} > \sqrt{x^2 - 3x + 2}$;

$$\begin{cases} 2x^2 - 3x + 1 > x^2 - 3x + 2, \\ 2x^2 - 3x + 1 \geq 0, \\ x^2 - 3x + 2 \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x-1)(x+1) > 0, \\ 2(x-1)\left(x - \frac{1}{2}\right) \geq 0, \\ (x-2)(x-1) \geq 0. \end{cases}$$

Объединяя, получим $\begin{cases} x < -1, \\ x \geq 2. \end{cases}$ Ответ: $(-\infty; -1) \cup [2; \infty)$.

6.242. $2^{\sqrt{x^2-3x+3}} > 2^{\sqrt{x^2-2x+5}}$; $\sqrt{x^2-3x+3} > \sqrt{x^2-2x+5}$;

$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 3} - \sqrt{x^2 - 2x + 5}$;

$\begin{cases} x^2 - 3x + 3 \geq 0, \\ x^2 - 2x + 5 \geq 0. \end{cases} D(f) = R. \quad x^2 - 3x + 3 = x^2 - 2x + 5; \quad x = -2.$

Т.к. $f(0) < 0$; $f(-3) = \sqrt{21} - \sqrt{20} > 0$, то $x < -2$

Ответ: $(-\infty; -2)$.

6.243. $3^{-\sqrt{x^2+2x+2}} \leq 3^{-\sqrt{x^2-x+5}}$; $-\sqrt{x^2+2x+2} \leq -\sqrt{x^2-x+5}$;

$\begin{cases} x^2 + 2x + 2 \geq x^2 - x + 5, \\ x^2 + 2x + 2 \geq 0, \\ x^2 - x + 5 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 3x \geq 3, \\ x \in R, \quad x \geq 1. \end{cases}$ Ответ: $[1; \infty)$.

6.244. $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x-2}} > \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2+3x-10}}$; $(a > 1) \sqrt{x-2} < \sqrt{x^2+3x-10}$;

$$\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ x^2 + 3x - 10 \geq 0, \\ x - 2 < x^2 + 3x - 10; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 2, \\ (x-2)(x+5) \geq 0, \\ (x-2)(x+4) > 0. \end{cases}$$

значит, $x > 2$.

Ответ: $(2; \infty)$.

$$6.245. \left(\frac{1}{4}\right)^{\sqrt{x+4}} > \left(\frac{1}{4}\right)^{\sqrt{x^2+3x+4}};$$



$$\sqrt{x+4} < \sqrt{x^2+3x+4};$$

$$\begin{cases} x+4 < x^2+3x+4, & \begin{cases} x(x+2) > 0 \\ x \geq -4 \end{cases} \\ x+4 \geq 0 & \begin{cases} x \geq -4 \\ x \in R \end{cases} \\ x^2+3x+4 \geq 0 & \end{cases}$$


Ответ: $[-4; -2) \cup (0; \infty)$.

$$6.246. 2^{1+2x} - 21 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+3} + 2 \geq 0;$$

$$2^{1+2x} - 21 \cdot (2^{2x+3})^{-1} + 2 \geq 0; \quad 2^{1+2x} - 21 \cdot (2^{2x+1})^{-1} \cdot \frac{1}{4} + 2 \geq 0.$$

Замена $2^{1+2x} = t, t > 0$ по свойству степеней:

$$t - \frac{21}{4}t^{-1} + 2 \geq 0, \text{ откуда}$$



$$\begin{cases} 4t^2 + 8t - 21 \geq 0, \\ t > 0; \end{cases} \begin{cases} 4\left(t + \frac{7}{2}\right)\left(t - \frac{3}{2}\right) \geq 0, \\ t > 0. \end{cases} \quad t \geq \frac{3}{2}.$$

$2^{1+2x} \geq \frac{3}{2}$. Логарифмируя по основанию 2, получим:

$$1 + 2x \geq \log_2 \frac{3}{2}; \quad 2x \geq \log_2 \frac{3}{2} - 1; \quad x \geq \frac{1}{2} \left(\log_2 \frac{3}{2} - 1 \right); \quad x \geq \frac{1}{2} \log_2 3 - 1.$$

Ответ: $\left[\frac{1}{2} \log_2 3 - 1; \infty \right)$.

$$6.247. 3^{4-3x} - 35 \left(\frac{1}{3}\right)^{2-3x} + 6 \geq 0; \quad 3^{2-3x} > 0; \quad 3^{6-6x} - 35 + 2 \cdot 3^{3-3x} \geq 0;$$

$$t = 3^{3-3x}, t > 0; \quad t^2 + 2t - 35 \geq 0; \quad (t+7)(t-5) \geq 0; \quad t \in (-\infty; -7] \cup [5; \infty).$$

Так как $t > 0$, то $t \in [5; \infty)$, т.е. $3^{3-3x} \geq 5; \quad 3 - 3x \geq \log_3 5;$

$$x \leq 1 - \frac{1}{3} \log_3 5. \quad \text{Ответ: } \left(-\infty; 1 - \frac{1}{3} \log_3 5 \right].$$

$$6.248. 4^{5+4x} - 15 \left(\frac{1}{4}\right)^{3+4x} + 8 \geq 0; \quad t = 4^{4+4x}, t > 0;$$

$$t^2 + 2t - 15 \geq 0; \quad (t-3)(t+5) \geq 0; \quad t \in (-\infty; -5] \cup [3; \infty).$$

Т.к. $t > 0$, то $t \in [3; \infty)$. Т.к. $4^{4+4x} \geq 3; 4 + 4x \geq \log_4 3; x \geq \frac{1}{4} \log_4 3 - 1$

Ответ: $\left[\frac{1}{4} \log_4 3 - 1; \infty \right)$.

6.249. $5^{5-4x} - 2 \left(\frac{1}{5} \right)^{3-4x} - 5 \geq 0; (5^{3-4x} > 0); 5^{8-8x} - 2 - 5 \cdot 5^{3-4x} \geq 0;$

$5^{8-8x} - 5^{4-4x} - 2 \geq 0; (5^{4-4x})^2 - 5^{4-4x} - 2 \geq 0;$
 Замена $t = 5^{4-4x}, t > 0.$
 $t^2 - t - 2 \geq 0; (t-2)(t+1) \geq 0; t \in (-\infty; -1] \cup [2; \infty).$

Так как $t > 0$, то $t \in [2; \infty)$;

$5^{4-4x} \geq 2; 4 - 4x \geq \log_5 2; x \leq 1 - \frac{1}{4} \log_5 2.$ Ответ: $\left(-\infty; 1 - \frac{1}{4} \log_5 2 \right]$.

6.250. $\log_{\frac{1}{\sqrt{5}}} (6^{x+1} - 36^x) \geq -2; \begin{cases} 6^{x+1} - 36^x > 0, \\ 6^{x+1} - 36^x - 5 \leq 0. \end{cases}$ Замена $t=6^x, t > 0;$

$\begin{cases} 6t - t^2 > 0, \\ -t^2 + 6t - 5 \leq 0; \end{cases} \begin{cases} t(t-6) < 0, \\ (t-5)(t-1) \geq 0. \end{cases}$

Откуда $t \in (0; 1] \cup [5; 6)$, значит,
 $0 < 6^x \leq 1,$ и $5 \leq 6^x < 6,$
 $x \leq 0$ $\log_6 5 \leq x < 1.$ Ответ: $(-\infty; 0] \cup [\log_6 5; 1).$

6.251. $\log_{\frac{1}{\sqrt{6}}} (5^{x+1} - 25^x) \leq -2. 5^{x+1} - 25^x \geq 6.$ Замена $5^x = t (t > 0);$

$t^2 - 5t + 6 \leq 0; (t-3)(t-2) \leq 0; t \in [2; 3],$ т.е. $\begin{cases} 5^x \geq 2, \\ 5^x \leq 3; \end{cases} \begin{cases} x \geq \log_5 2, \\ x \leq \log_5 3. \end{cases}$

Ответ: $[\log_5 2; \log_5 3].$

6.252. $\log_{\frac{1}{\sqrt{2}}} (3^{x+2} - 9^x) \geq -6; \begin{cases} 3^{x+2} - 9^x > 0, \\ 3^{x+2} - 9^x \leq \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{-6}; \end{cases} \begin{cases} 9^x - 9 \cdot 3^x < 0, \\ 9^x - 9 \cdot 3^x + 8 \geq 0. \end{cases}$

Замена $t = 3^x, t > 0.$
 $\begin{cases} t^2 - 9t < 0, \\ t^2 - 9t + 8 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} t(t-9) < 0, \\ (t-1)(t-8) \geq 0. \end{cases}$

Откуда $t \in (0; 1] \cup [8; 9)$, т.е. $\begin{cases} 3^x \leq 1, \\ 3^x \geq 8, \\ 3^x < 9; \end{cases} \begin{cases} x \leq 0, \\ x \geq \log_3 8, \\ x < 2. \end{cases}$

Ответ: $(-\infty; 0] \cup [\log_3 8; 2).$

6.253. $\log_2(2-3x) > 4x+1$; $y_1 = 4x+1$; $y_2 = \log_2(2-3x)$.

$D(y_2) = \left(-\infty; \frac{2}{3}\right)$; y_1 возрастает, y_2 убывает.

Точка пересечения этих графиков (0; 1). Ответ: $(-\infty; 0)$.

6.254. $\log_2(2+x) > 1-x$; $y_1 = \log_2(x+2)$; $y_2 = 1-x$;

$D(y_1) = (-2; \infty)$, $D(y_2) = \mathbb{R}$. $y_1(x)$ возрастает.

| | | | |
|-------|----|---|---|
| x | -1 | 0 | 2 |
| y_1 | 0 | 1 | 2 |

$y_2(x)$ убывает, $y_2(0) = 1$, $y_2(1) = 0$; Ответ: $(0; \infty)$.

6.255. $9^x - 2 \cdot 3^x < 3$. Замена $t = 3^x$, ($t > 0$). $t^2 - 2t - 3 < 0$;

$(t-3)(t+1) < 0$. $t \in (-1; 3)$. Учитывая, что

$t > 0$, получим $t \in (0; 3)$, т.е. $0 < 3^x < 3$; $x < 1$.

Ответ: $(-\infty; 1)$.

6.256. $4^x - 3 \cdot 2^x < 4$; Замена $t = 2^x$, ($t > 0$); $t^2 - 3t - 4 < 0$; $t \in (-1; 4)$.


Учитывая, что $t > 0$ получим $t \in (0; 4)$ т.е. $0 < 2^x < 4$; $x < 2$.

Ответ: $(-\infty; 2)$.


6.257. $\log_x \frac{2x + \frac{2}{5}}{5(1-x)} > 0$;

$$\begin{cases} \begin{cases} x > 1, \\ 2x + \frac{2}{5} > 1, \\ 5(1-x) > 0; \end{cases} \\ \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 0 < \frac{2x + \frac{2}{5}}{5(1-x)} < 1; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} \begin{cases} x > 1, \\ 2x + \frac{2}{5} - 5 + 5x \\ \frac{2x + \frac{2}{5}}{5(1-x)} > 0; \end{cases} \\ \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 2x + \frac{2}{5} \\ \frac{2x + \frac{2}{5}}{5(1-x)} > 0, \\ \frac{2x + \frac{2}{5} - 5 + 5x}{5(1-x)} < 0; \end{cases} \end{cases} \begin{cases} \begin{cases} x > 1, \\ 7\left(x - \frac{23}{35}\right) \\ \frac{7\left(x - \frac{23}{35}\right)}{5(1-x)} > 0; \end{cases} \\ \begin{cases} 0 < x < 1, \\ 2x + \frac{2}{5} \\ \frac{2x + \frac{2}{5}}{5(1-x)} > 0, \\ 7\left(x - \frac{23}{35}\right) \\ \frac{7\left(x - \frac{23}{35}\right)}{5(1-x)} < 0. \end{cases} \end{cases}$$

1-я система:  - нет решений



6.258. $\log_x \frac{4x+1}{6(x-1)} < 0$.



Найдем $D(f)$:
$$\begin{cases} x > 0, \\ x \neq 1, \\ \frac{4x+1}{6(x-1)} > 0. \end{cases} \quad D(f) = (1; \infty). \quad \log_x \frac{4x+1}{6(x-1)} = 0;$$

$\frac{4x+1}{6(x-1)} = 1; 2x = 7; x = \frac{7}{2}; f\left(\frac{7}{2}\right) = 0.$
 $f(2) = \log_2 \frac{3}{2} > 0; f(4) = \log_2 \frac{17}{18} < 0.$

Ответ: $(3; 5; \infty)$.

6.259. $\log_x \frac{3x+2}{4(1-x)} \geq 0$; $f(x) = \log_x \frac{3x+2}{4(1-x)}$.

Найдем $D(f)$:
$$\begin{cases} x > 0, \\ x \neq 1, \\ \frac{3x+2}{4(1-x)} > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ x \neq 1, \\ \frac{3(x+\frac{2}{3})}{4(1-x)} > 0. \end{cases}$$

$D(f) = (0; 1). \quad \log_x \frac{3x+2}{4(1-x)} = 0; \frac{3x+2}{4(1-x)} = 1; x = \frac{2}{7};$


$f\left(\frac{1}{7}\right) = \log_{\frac{1}{7}} \frac{17}{24} < 0; f\left(\frac{3}{7}\right) = \log_{\frac{3}{7}} \frac{23}{16} < 0$, т.е.
 $x \in (0; 2/7]$. Ответ: $(0; 2/7]$.

6.260. $\log_x \frac{2x+5}{4(x-1)} \leq 0$;

$$\begin{cases} x > 1, \\ \frac{2x+5}{4(x-1)} \leq 1, \\ \frac{2x+5}{4(x-1)} > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1, \\ \frac{-2x+9}{4(x-1)} \leq 0, \\ \frac{2x+5}{4(x-1)} > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1, \\ \frac{2(x-4,5)}{4(x-1)} \geq 0, \\ \frac{2(x+2,5)}{4(x-1)} > 0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} 0 < x < 1, \\ \frac{2x+5}{4(x-1)} \geq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < x < 1, \\ \frac{-2x+9}{4(x-1)} \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < x < 1, \\ \frac{2(x-4,5)}{4(x-1)} \leq 0; \end{cases}$$

для первой системы:



Ответ: $[4,5; \infty)$.

для второй системы:



6.261. $\log_{5x-4x^2} 4^{-x} > 0$; $-x \cdot \log_{5x-4x^2} 4 > 0$; $x \log_{5x-4x^2} 4 < 0$.

$f(x) = x \log_{4x-4x^2} 4$.

Область определения: $\begin{cases} 5x-4x^2 > 0, \\ 5x-4x^2 \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 4x \left(x - \frac{5}{4} \right) < 0, \\ 4x^2 - 5x + 1 \neq 0. \end{cases}$


$4x^2 - 5x + 1 = 0$; $x_1 = \frac{1}{4}$, $x_2 = 1$. Решая неравенство, найдем

$x \in \left(0; \frac{5}{4} \right)$. $D(f) = \left(0; \frac{1}{4} \right) \cup \left(\frac{1}{4}; 1 \right) \cup \left(1; \frac{5}{4} \right)$. $x = 0$;

$x \log_{5x-4x^2} 4 = 0$ - нет решений. $f(x)$ не обращается в 0 на $D(f)$.

$f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$; $f\left(\frac{1}{8}\right) < 0$; $f\left(\frac{9}{8}\right) < 0$;


Ответ: $\left(0; \frac{1}{4} \right) \cup \left(1; \frac{5}{4} \right)$.




6.262. $\log_{-6x-5x^2} 6^x > 0$;

$$\begin{cases} -6x - 5x^2 > 1; \\ 6^x > 1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 0 < -6x - 5x^2 < 1, \\ 6^x < 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5\left(x + \frac{1}{5}\right)(x+1) < 0, \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{решений нет.}$$



$$\begin{cases} 5x\left(x + \frac{6}{5}\right) < 0, \\ 5\left(x + \frac{1}{5}\right)(x+1) > 0, \\ x < 0. \end{cases}$$



Итак, $x \in (-6/5; -1) \cup (-1/5; 0)$.

Ответ: $(-6/5; -1) \cup (-1/5; 0)$.

6.263. $\log_{4+x^2} 8 < 1$. Т.к. $4 + x^2 \geq 4$; $8 < 4 + x^2$; $x^2 > 4$;

$x \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$. Ответ: $(-\infty; -2) \cup (2; \infty)$.

6.264. $\log_{x^2+2} 3 \geq 1$. Т.к. $x^2 + 2 \geq 2$; $x^2 + 2 \leq 3$; $x^2 \leq 1$; $x \in [-1; 1]$.

Ответ: $[-1; 1]$.

6.265. $\log_7 x - \log_x \frac{1}{7} \geq 2$; $\log_7 x + \log_x 7 \geq 2$; перейдем в \log_7 к

основанию 7. $\log_7 x + \frac{1}{\log_7 x} \geq 2$, $x \neq 1$, $x > 0$. Замена: $\log_7 x = t$.

$$t + \frac{1}{t} \geq 2; \frac{(t-1)^2}{t} \geq 0; t > 0, \text{ т.е. } \log_7 x > 0; x > 1. \quad \text{Ответ: } (1; \infty).$$

6.266. $2\log_2 \sqrt{x} - 2 > \log_x \frac{1}{2}$; $\log_2 x + \log_2 2 \geq 2$, $x > 0$, $x \neq 1$.

Замена: $\log_2 x = u$. $u + \frac{1}{u} - 2 \geq 0$; $\frac{u^2 - 2u + 1}{u} \geq 0$; $\frac{(u-1)^2}{u} \geq 0$; $u > 0$.

Т.е. $\log_2 x > 0$; $x > 1$. Ответ: $(1; \infty)$.

6.267. $\log_x \frac{1}{4} + \log_4 x^{-1} \leq -2$; $-\log_4 4 - \log_4 x \geq -2$; $x > 0$, $x \neq 1$;

$\log_4 4 + \log_4 x \geq 2$. Замена $\log_4 x = t$.

$$\frac{t^2 + 1 - 2t}{t} \geq 0; \frac{(t-1)^2}{t} \geq 0. \text{ Откуда } t > 0. \log_3 x > 0; x > 1.$$

Ответ: $(1; \infty)$.

6.268. $\log_3 3 - 4 \geq -4 \log_3 x; \log_3 3 + 4 \log_3 x - 4 \geq 0; x > 0, x \neq 1.$

Замена $\log_3 x = t. \frac{1}{t} + 4t - 4 \geq 0; \frac{4t^2 - 4t + 1}{t} \geq 0; \frac{(2t-1)^2}{t} \geq 0; t > 0.$

$\log_3 x > 0$, т.е. $x > 1$. Ответ: $(1; \infty)$.

6.269. $\log_{\frac{8}{3}} \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - x - 6) \geq 0$. Т.к. $\frac{8}{3} > 1$,

$$\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - x - 6) \geq 1; \begin{cases} x^2 - x - 6 \leq \frac{1}{2}, \\ x^2 - x - 6 > 0; \end{cases} \begin{cases} 2x^2 - 2x - 12 \leq 1, \\ (x-3)(x+2) > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2\left(x - \frac{1+3\sqrt{3}}{2}\right)\left(x - \frac{1-3\sqrt{3}}{2}\right) \leq 0, \\ (x-3)(x+2) > 0. \end{cases}$$

Ответ: $\left[\frac{1-3\sqrt{3}}{2}; -2\right) \cup \left(3; \frac{1+3\sqrt{3}}{2}\right]$.

6.270. $\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}}(2^{x+2} - 4^x) \leq -2. 2^{x+2} - 4^x \geq \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-2}; 4^x - 2^{x+2} + 3 \leq 0.$

Замена $2^x = t, t > 0. t^2 - 4t + 3 \leq 0; (t-3)(t-1) \leq 0; t \in [1; 3].$

Т.е. $1 \leq 2^x \leq 3; 0 \leq x \leq \log_2 3$. Ответ: $[0; \log_2 3]$.

6.271. $\log_{\frac{27}{41}} \log_5(x^2 - 2x - 3) \leq 0.$

Равносильно $\log_5(x^2 - 2x - 3) \geq 1; x^2 - 2x - 3 \geq 5;$
 $x^2 - 2x - 8 \geq 0; (x+2)(x-4) \geq 0. x \in (-\infty; -2] \cup [4; \infty).$

Ответ: $(-\infty; -2] \cup [4; \infty)$.

6.272. $\log_{\frac{12}{11}} \log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 3x - 4) \leq 0;$

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 3x - 4) \leq 1, \\ \log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 3x - 4) > 0; \end{cases} \begin{cases} x^2 + 3x - 4 \geq \frac{1}{2}, \\ x^2 + 3x - 4 < 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2\left(x + \frac{-3+3\sqrt{3}}{2}\right)\left(x + \frac{-3-3\sqrt{3}}{2}\right) \geq 0, \\ \left(x - \frac{-3+\sqrt{29}}{2}\right)\left(x - \frac{-3-\sqrt{29}}{2}\right) < 0; \end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{-3-\sqrt{29}}{2}; \frac{-3-3\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{-3+3\sqrt{3}}{2}; \frac{-3+\sqrt{29}}{2}\right)$.

6.273. $\log_5 \log_{\frac{9}{16}}(x^2 - 4x + 3) \leq 0;$

$$\begin{cases} \log_{\frac{9}{16}}(x^2 - 4x + 3) \leq 1, \\ \log_{\frac{9}{16}}(x^2 - 4x + 3) > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 3 \geq \frac{9}{16}, & \begin{cases} 16x^2 - 64x + 39 \geq 0, \\ x^2 - 4x + 2 < 0; \end{cases} \\ x^2 - 4x + 3 < 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 16\left(x - \frac{3}{4}\right)\left(x - \frac{13}{4}\right) \geq 0, \\ (x - (2 - \sqrt{2}))(x - (2 + \sqrt{2})) < 0. \end{cases} \quad \text{Ответ: } \left(2 - \sqrt{2}; \frac{3}{4}\right] \cup \left[\frac{13}{4}; 2 + \sqrt{2}\right).$$

6.274. $\min(1 + 2x, 2 + x) > -1.$

$$\begin{cases} 1 + 2x > -1, & \begin{cases} 2x > -2, & \begin{cases} x > -1, \\ x > -3; \end{cases} \\ 2 + x > -1; & \begin{cases} x > -3; \\ x > -3; \end{cases} \end{cases} \end{cases} \quad \text{т.е. } x > -1. \quad \text{Ответ: } (-1; \infty).$$

6.275. $\min(3 - 2x, 1 - x) < 1.$

$$\begin{cases} \begin{cases} 3 - 2x \leq 1 - x, \\ 3 - 2x < 1; \end{cases} & \begin{cases} x \geq 2, \\ x > 1; \end{cases} \\ \begin{cases} 3 - 2x > 1 - x, \\ 1 - x < 1; \end{cases} & \begin{cases} x < 2, \\ x > 0; \end{cases} \end{cases} \quad \text{таким образом, } x \in (0; \infty). \quad \text{Ответ: } (0; \infty).$$

6.276. $\max(3 - 2x, 1 - x) < 1.$ $\begin{cases} 3 - 2x < 1, \\ 1 - x < 1; \end{cases} \begin{cases} x > 1, \\ x > 0. \end{cases} \quad \text{Ответ: } (1; \infty).$

6.277. $\max(3 - 2x, 1 - x) > 1.$ $\begin{cases} 3 - 2x \geq 1 - x, \\ 3 - 2x > 1; \\ 3 - 2x < 1 - x, \\ 1 - x > 1; \end{cases} \begin{cases} x \leq 2, \\ x < 1; \\ x > 2, \\ x < 0; \end{cases} \quad x < 1.$

Ответ: $(-\infty; 1).$

**Возрастание, убывание, экстремумы,
наибольшие и наименьшие значения**

6.278. $y = \sqrt{2x^2 + 5x - 7}$; $[3; 4]$.

$2x^2 + 5x - 7 \geq 0$; $2(x + (7/2))(x - 1) \geq 0$;

$D(f)$: $x \in (-\infty; -7/2] \cup [1; \infty)$.



$y' = \frac{4x + 5}{2\sqrt{2x^2 + 5x - 7}}$; $y' = 0$ при $x = -\frac{5}{4}$ —

не входит в $D(f)$.

на $[3; 4]$ y монотонно возрастает, следова-

тельно, $\max_{[3;4]} y(x) = y(4) = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$; $\min_{[3;4]} y(x) = y(3) = \sqrt{26}$.

Ответ: $\max_{[3;4]} y(x) = 3\sqrt{5}$; $\min_{[3;4]} y(x) = \sqrt{26}$.



6.279. $y = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 3x + 5}$, $[2; 5]$.

$D(y) = R$, т.к. $\frac{1}{2}x^2 + 3x + 5 > 0$ при всех x .

$y' = \frac{x + 3}{2\sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 3x + 5}}$; $y' = 0$ при $x = -3$. Т.о., на $[2; 5]$ y возрастает,

следовательно, $y_{\text{наиб.}} = y(5) = \sqrt{65/2}$; $y_{\text{наим.}} = y(2) = \sqrt{13}$.

Ответ: $y_{\text{наиб.}} = \sqrt{65/2}$; $y_{\text{наим.}} = \sqrt{13}$.


6.280. $y = \frac{3}{\sqrt{3 + x - \frac{1}{4}x^2}}$, $[-1; 3]$. $D(y)$: $-\frac{1}{4}x^2 + x + 3 > 0$;

$x^2 - 4x - 12 < 0$; $(x + 2)(x - 6) < 0$; $D(y) = (-2; 6)$.

$y' = -\frac{1}{2} \frac{3(1 - \frac{x}{2})}{\left(\sqrt{3 + x - \frac{1}{4}x^2}\right)^3}$; $y' = 0$ при $x = 2$.

$y(2) = \frac{3}{2}$; $y(-1) = \frac{6}{\sqrt{7}}$; $y(3) = \frac{6}{\sqrt{15}}$; $y_{\text{наиб.}} = \frac{6}{\sqrt{7}}$; $y_{\text{наим.}} = \frac{3}{2}$.


6.281. $y = -\frac{3}{\sqrt{2x^2 - x - 1}}$, $[2; 3]$.

$y'(x) = \frac{-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}}{2(2x^2 - x - 1)^{3/2}}$; $D(y): 2x^2 - x - 1 > 0; 2(x-1)\left(x + \frac{1}{2}\right) > 0;$
 $y(x)$  $D(y) = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (1; \infty)$.

$y'(x) = \frac{3(4x-1)}{2(\sqrt{2x^2 - x - 1})^3}$; $y' = 0$ при $x = \frac{1}{4}$. на $[2; 3]$ $y(x)$ возрастает.

$y_{\max} = y(3) = -\frac{3}{\sqrt{14}}$; $y_{\min} = y(2) = -\frac{3}{\sqrt{5}}$.

6.282. $y = \sqrt{4x^2 - x - 3}$.

$\frac{-3}{4}$ Область определения: $4x^2 - x - 3 \geq 0;$
 $\frac{-3}{4}$ $4(x-1)\left(x + \frac{3}{4}\right) \geq 0; D(y) = \left(-\infty; -\frac{3}{4}\right] \cup [1; \infty)$.
 $y(x)$ 


$y' = \frac{8x-1}{2\sqrt{4x^2 - x - 3}}$;
 $y'(x) = 0$ при $x = \frac{1}{8}$ ($\frac{1}{8} \notin D(y)$).

Ответ: возрастает при $x \in [1; \infty)$; убывает при $x \in \left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$.

6.283. $y = \log_2(2x^2 - 3x - 2)$; $D(y): 2x^2 - 3x - 2 > 0; (x-2)(x+1/2) > 0;$

$D(y) = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (2; \infty)$.

$y' = \frac{4x-3}{(2x^2 - 3x - 2) \ln 2}$; $y' = \frac{4\left(x - \frac{3}{4}\right)}{2(x-2)\left(x + \frac{1}{2}\right) \ln 2}$;

$\frac{-1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{-2}{2}$ $y(x)$ возрастает на $(2; \infty)$;
 $y(x)$ убывает на $(-\infty; -(1/2))$.
 $y(x)$  Ответ: возрастает на $(2; \infty)$; убывает на $(-\infty; -(1/2))$.

6.284. $y = -\frac{3}{\sqrt{2x^2 - x - 1}}$; $D(y): 2x^2 - x - 1 > 0$; $2(x-1)\left(x + \frac{1}{2}\right) > 0$;

$D(y) = (-\infty; -1/2) \cup (1; \infty)$.

$y' = \frac{3(4x-1)}{2(\sqrt{2x^2 - x - 1})^3}$; $y'=0$ при $x = \frac{1}{4}$.


Ответ: возрастает на $(1; \infty)$; убывает на $(-\infty; -1/2)$.

6.285. $y = \frac{5}{\sqrt{x^2 - 3x - 10}}$;

$D(y): x^2 - 3x - 10 > 0$; $(x-5)(x+2) > 0$;

$D(y) = (-\infty; -2) \cup (5; \infty)$.

$y' = \frac{-5(2x-3)}{2(\sqrt{x^2 - 3x - 10})^3}$; $y' = 0$ при $x = \frac{3}{2} \notin D(y)$.




6.286. $y = \log_{0.5}(2x^2 - 3x - 2)$; $D(y): 2x^2 - 3x - 2 > 0$;

$2(x-2)(x+1/2) > 0$;

$D(y) = \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (2; \infty)$.

$y' = \frac{4x-3}{(2x^2 - 3x - 2)\ln 0.5}$; $y' = \frac{4(x-3/4)}{2(x-2)(x+1/2)\ln 0.5}$;



Ответ: возрастает на $(-\infty; -1/2)$; убывает на $(2; \infty)$.

6.287. Пусть x см – длина стороны основания, тогда $(3-x)$ см – длина бокового ребра.

$V(x) = x^2(3-x) = 3x^2 - x^3$, $x \in [0; 3]$; $V'(x) = 6x - 3x^2 = 3x(2-x)$;

$V(x) = 0$ при $x = 2$, $x = 0$; $V(0) = 0$; $V(3) = 0$; $V(2) = 4$.

Ответ: ребра 2 см; 2 см и 1 см, $V = 4$ см³.

6.288. Пусть x см – сторона основания ($x > 0$). Т.к. $V = 4$ см³, то

боковое ребро равно $\frac{4}{x^2}$ см.

$P(x) = \left(\frac{4}{x^2} + x\right) \cdot 2$; $D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; \infty)$.



$P'(x) = 2\left(1 - \frac{8}{x^3}\right)$; $P'(x) = 0$ при $x = 2$; $x = 2$ – точка минимума.

$P(2) = 6$. Ответ: ребра: 2 см; 2 см; 1 см; $P = 6$ см.


6.289. Пусть x см – сторона боковой грани, $x > 0$. Тогда стороны основания x см и $(6-x)$ см.

$$V(x) = x^2(6-x), x \in [0; 6]; \quad V'(x) = 12x - 3x^2 = 3x(4-x);$$

$$V'(x) = 0 \text{ при } x = 4, x = 0; \quad V(0) = 0; \quad V(6) = 0; \quad V(4) = 32.$$

Ответ: ребра: 4 см; 4 см; 9 см; $V = 32$ см³.

6.290. Пусть x см – длина ребра боковой грани, $x > 0$.



Стороны основания: x см и $\frac{0,5}{x^2}$ см.

$$P(x) = \left(x + \frac{0,5}{x^2}\right) \cdot 2 = 2x + \frac{1}{x^2};$$

$$P'(x) = 2 - \frac{2}{x^3} = \frac{2(x-1)(x^2+x+1)}{x^3}; \quad P'(x) = 0 \text{ при } x = 1;$$

$x = 1$ – точка минимума. $P_{\min} = 3$ см.

Ответ: ребра: 1 см; 1 см; 0,5 см; $P = 3$ см.

6.291. $y = x \ln x - x \ln 5$, $[1; 5]$. Найдем $y' = \ln x + 1 - \ln 5$;

$y' = 0: \ln x = \ln 5 - 1; x = 5/e$. Так как $\ln 5 > 1$, то решений нет; $y'(x) < 0$,

$y_{\text{наим}} = y(5/e) = (5/e)((\ln 5 - 1) - \ln 5) = -5/e$. Ответ: $y_{\text{наим}} = -5/e$.

6.292. $y = (1/2)x \ln x - x \ln 2$; $[1; 4]$;

$$D(y) = (0; \infty). \quad y'(x) = (1/2) \ln x + (1/2) - \ln 2;$$

$$y'(x) = 0: (1/2) \ln x + (1/2) - \ln 2 = 0; \quad \ln x = \ln(4/e); \quad x = (4/e).$$

$y'(x) > 0: x > 4/e; y'(x) < 0: x < 4/e$. Значит, $4/e$ — точка минимума. $y_{\text{наим}} = y(4/e) = -(2/e)$. Ответ: $-(2/e)$.

6.293. $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{6}x \ln 9$, $[1; 3]$; $y'(x) = \frac{1}{3} \ln x + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \ln 9$;

$$y'(x) = 0: \frac{1}{3} \ln x + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \ln 9 = 0; \quad \ln x = \ln \frac{3}{e}; \quad x = \frac{3}{e};$$

$y'(x) > 0$ при $x > \frac{3}{e}$; $y'(x) < 0$ при $x < \frac{3}{e}$. Значит, $\frac{3}{e}$ — точка минимума.

$$y_{\text{наим}} = y\left(\frac{3}{e}\right) = \frac{2}{3e} \ln \frac{3}{e} - \frac{1}{2e} \ln 9 = \frac{\ln 3}{e} - \frac{1}{e} - \frac{\ln 3}{e} = -\frac{1}{e}. \quad \text{Ответ: } -\frac{1}{e}.$$

6.294. $y = 2x \ln x - x \ln 49$, $[1; 7]$; $y'(x) = 2 + 2 \ln x - \ln 49$;

$$y'(x) = 0 \text{ при } 2 + 2 \ln x - \ln 49 = 0; \quad \ln x + 1 - \ln 7 = 0; \quad x = 7/e;$$

$y'(x) > 0$ при $x > 7/e$; $y'(x) < 0$ при $x < 7/e$.


Значит, $7/e$ точка минимума.

$$y_{\text{наим}} = y\left(\frac{7}{e}\right) = \frac{14}{e}(\ln 7 - \ln e) - \frac{7}{e} \ln 49 = -\frac{14}{e}. \quad \text{Ответ: } -\frac{14}{e}.$$

$$6.295. \quad y = 2\sqrt{3} \cos x + 2 \sin x - 2x + 1; \quad y' = -2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x - 2;$$

$$y'(x)=0: -2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x - 2 = 0;$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \frac{1}{2};$$



$$\cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = \frac{1}{2}; \quad x + \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad \begin{cases} x = 2\pi k, \\ x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Точки минимума: } x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad \text{Ответ: } -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$6.296. \quad y = \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x + 10 - 2x;$$

$$\text{Преобразуем } y(x): \quad y(x) = 2\sin(2x + \pi/6) + 10 - 2x;$$

$$D(y) = \mathbb{R}. \quad y'(x) = 4\cos(2x + \pi/6) - 2;$$


$$y'(x) = 0: \quad \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}; \quad 2x + \frac{\pi}{6} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$x = \frac{\pi}{12} + \pi k \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Точки максимума: } x = \frac{\pi}{12} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad \text{Ответ: } \frac{\pi}{12} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$6.297. \quad y = 2\sqrt{3} \sin x - 2 \cos x - 2\sqrt{3}x + 11;$$

$$y(x) = 4\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\sqrt{3}x + 11;$$



$$y'(x) = 4\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\sqrt{3}; \quad y'(x) = 0: \quad \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2};$$


$$x - \frac{\pi}{6} = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad \text{или} \quad x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Точки максимума: } x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \quad \text{Ответ: } 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$6.298. \quad y = \sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x + 2\sqrt{3}x - 3;$$

$$y(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + 2\sqrt{3}x - 3; \quad y'(x) = -4\cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + 2\sqrt{3};$$

$$y'(x) = 0: \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad 2x - \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$



Ответ: $\pi/4 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

6.299. $y = 1 + 4\sin x - 2x, [0; \pi]. \quad y'(x) = 4\cos x - 2;$

$y'(x) = 0: \cos x = 1/2; \quad x = \pm\pi/3 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$

Промежутку $[0; \pi]$ принадлежит точка $\pi/3$;

$y(0) = 1; y(\pi) = 1 - 2\pi; \quad y(\pi/3) = 1 + 2\sqrt{3} - (2\pi/3); \quad y_{\text{мин.}} = 1 - 2\pi.$

6.300. $y = -3 + 4\sin x + 2x, [\pi; 2\pi]. \quad y'(x) = 4\cos x + 2;$

$y'(x) = 0: \cos x = -(1/2); \quad x = \pm(2\pi/3) + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$


Данному отрезку $[\pi; 2\pi]$ принадлежит точка $x = 4\pi/3$.

$y(\pi) = -3 + 2\pi; y(2\pi) = -3 + 4\pi; \quad y(4\pi/3) = -3 + (8\pi/3) - 2\sqrt{3};$

$\max_{[\pi; 2\pi]} y(x) = 4\pi - 3. \quad \text{Ответ: } \max_{[\pi; 2\pi]} y(x) = 4\pi - 3.$

Примерное оформление варианта по курсу «В»

1. $\frac{8x^2 - 2x - 1}{x} < 0; \quad 8x^2 - 2x - 1 = 8\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{4}\right);$



Ответ: $(-\infty; -1/4) \cup (0; 1/2)$.

2. $\log_2 3 - \log_2(2 - 3x) = 2 - \log_2(4 - 3x);$

$\log_2 \frac{3}{2 - 3x} = \log_2 \frac{4}{4 - 3x}$ - уравнение равносильно системе:


$$\begin{cases} \frac{3}{2 - 3x} = \frac{4}{4 - 3x}, & \begin{cases} 12 - 9x = 8 - 12x, \\ 3x < 2, \\ 3x < 4; \end{cases} & \begin{cases} 3x = -4, \\ x < \frac{2}{3}; \end{cases} \end{cases}$$

$x = -4/3. \quad \text{Ответ: } -4/3.$

3. $3\operatorname{tg}2x - \sqrt{3} = 0$; $\operatorname{tg}2x = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $2x = \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;

$x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$. Ответ: $\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.

4. По заданным условиям задача неоднозначна, выполним один из возможных вариантов.



5. $f(x) = 3x^4 - 1$. $F(x) = \frac{3}{5}x^5 - x + C$.

Ответ: $F(x) = \frac{3}{5}x^5 - x + C$.

6. $y = \sin x, y = \sin 2x$; $\sin x = \sin 2x$; $\sin x - 2\sin x \cos x = 0$;
 $\sin x(1 - 2\cos x) = 0$;

$\sin x = 0$; $\cos x = \frac{1}{2}$; $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Абсциссы общих точек: $\pi k, \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, k, n \in \mathbb{Z}$.

7. $y = x + 1, y = e^x$. Пусть x_0 – абсцисса точки касания;

$y_{\text{кас}} = e^{x_0} + e^{x_0}(x - x_0)$. $e^{x_0} = 1$; $e^{x_0} - e^{x_0} \cdot x_0 = 1$ (1);

$x_0 = 0$; при $x_0 = 0$ равенство (1) верно, значит, прямая $y = x + 1$ является касательной к графику функции $y = e^x$ в точке с абсциссой $x_0 = 0$. Ответ: является.

8. $\cos x \geq 1 + 2^x$; $\left. \begin{matrix} |\cos x| \leq 1 \\ 1 + 2^x > 1 \end{matrix} \right\}$ для любых действительных x , значит, неравенство решений не имеет. Ответ: решений нет.

9. $\begin{cases} \frac{1}{x} + y = -\frac{1}{2}, \\ y^2 - \frac{3}{x^2} = \frac{1}{4}. \end{cases}$ Пусть $1/x = a$, где $x \neq 0, a \neq 0$ (*).

$$\begin{cases} a + y = -\frac{1}{2}, \\ y^2 - 3a^2 = \frac{1}{4}; \end{cases} \quad \begin{cases} y = -\frac{1}{2} - a, \\ -3a^2 + \frac{1}{4} + a + a^2 = \frac{1}{4}; \end{cases} \quad \begin{cases} y = -\frac{1}{2} - a, \\ a = 0, \\ a = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

учитывая (*), получим $x = 2$; $y = -1$. Ответ: (2; -1).

10. $y = \log_{0,5}(2x^2 - 3x - 2)$, $D(y) = (-\infty; -1/2) \cup (2; \infty)$.

$y' = \frac{4x-3}{(2x^2-3x-2)\ln 1/2}$;
 $y' = 0$: $x = 3/4$ - не принадлежит $D(y)$.

Ответ: убывает на $(-\infty; -1/2)$, возрастает на $(2; \infty)$.

**Вариант экзаменационного задания
по курсу «Математика»**

1. $\frac{(x+1)(2x-5)}{3x} \leq 0$. Ответ: $(-\infty; -1] \cup (0; 5/2]$

2. $10 \cdot 5^{x-1} + 5^{x+1} = 7$; $2 \cdot 5^x + 5 \cdot 5^x = 7$; $5^x = 1$; $x = 0$. Ответ: $x = 0$

3. $2\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sqrt{2}$; $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\frac{\pi}{2} - x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in Z$

Ответ: $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n$ и $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$; $n \in Z$

4. а) $D(y) = [-3,5; 5]$; б) $[-3; -0,4] \cup [2,5; 5]$; в) $x = -1,5$; $y = -1,5$; $x = 1$; $y = 4,5$; г) возрастает $[-1,5; 1]$; убывает $[-3,5; -1,5] \cup [1; 5]$


д) $y_{\max} = 4,5$; $y_{\min} = -3$.

5. $f(x) = \operatorname{tg}x - 2\sin x$; $x = -(\pi/4)$

$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 2\cos x$; $f'(-\pi/4) = \frac{1}{(\sqrt{2}/2)^2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 - \sqrt{2}$.

6.

7.




Получится конус. $R = 3$; $H = 4$.

$l = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; $S_{\text{бок}} = \pi Rl = 15\pi$; $S_{\text{осн}} = \pi R^2 = 9\pi$

$S = S_{\text{бок}} + S_{\text{осн}} = 24\pi$; Ответ: 24π .

8.



$$S_{\text{бок}} = 6S\Delta; \quad S\Delta = \frac{OK \cdot EF}{2}; \quad OK = \sqrt{OF^2 - FK^2}$$

$$OF = \sqrt{OF^2 - OO'^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5; \quad FK = \frac{5}{2};$$

$$OK = \sqrt{13^2 - \frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{651}}{2}; \quad \Delta S = \frac{5\sqrt{651}}{4}; \quad S_{\text{бок}} = \frac{15\sqrt{651}}{2}.$$

Ответ: $\frac{15\sqrt{651}}{2}$.

9. $y = \sin x$ и $y = \sin 2x$; $\sin x = \sin 2x$; $\sin x - 2\sin x \cos x = 0$;

$$\sin x(1 - 2\cos x) = 0; \quad \sin x = 0; \quad \cos x = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

10. $y = x + 1, y = e^x$. Пусть x_0 – абсцисса точки касания

$$y_{\text{кас}} = e^{x_0} + e^{x_0}(x - x_0); \quad e^{x_0} = 1; \quad e^{x_0} - e^{x_0} \cdot x_0 = 1 \quad (1);$$

$x_0 = 0$ при $x_0 = 0$ равенство (1) верно значит, прямая $y = x + 1$ является касательной к графику функции $y = e^x$.

Ответ: является.

StudyPort.ru

**Вариант экзаменационного задания
по курсу «Математика»**

1. $\frac{(x+11)(2x-5)}{3x} \leq 0$

Ответ: $(-\infty; -11] \cup (0; 5/2]$

2. $10 \cdot 5^{x-1} + 5^{x+1} = 7$; $2 \cdot 5^x + 5 \cdot 5^x = 7$; $5^x = 1$; $x = 0$
 Ответ: $x = 0$

3. $2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sqrt{2}$; $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\frac{\pi}{2} - x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n$; $n \in Z$

Ответ: $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n$ и $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$; $n \in Z$


4. а) $D(y) = [-3,5; 5]$; б) $[-3; -4,0] \cup [2,5; 5]$; в) $x = -1,5$; $y = -1,5$.
 г) возрастает $[-1,5; 1]$; убывает $[-3,5; -1,5] \cup [1; 5]$
 д) $y_{\max} = 4,5$; $y_{\min} = -3$.

5. $f(x) = \operatorname{tg}x - 2 \sin x$; $x = -\frac{\pi}{4}$


$$f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 2 \cos x; f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 - \sqrt{2}$$

Ответ: $2 - \sqrt{2}$

6.



7.




Получится конус. $R = 3$; $H = 4$

$$l = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5; S_{\text{бок}} = \pi R l = 15\pi; S_{\text{осн}} = \pi R^2 = 9\pi$$

$$S = S_{\text{бок}} + S_{\text{осн}} = 24\pi; \text{ Ответ: } 24\pi.$$

8.



$$S_{бок} = 6S\Delta; S\Delta = \frac{OK \cdot EF}{2}; OK = \sqrt{OF^2 - FK^2}$$

$$OF = \sqrt{OF^2 - OO'^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5; FK = \frac{5}{2}$$

$$OK = \sqrt{13^2 - \frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{651}}{2}$$

$$\Delta S = \frac{5\sqrt{651}}{4}; S_{бок} = \frac{15\sqrt{651}}{2}$$

Ответ: $\frac{15\sqrt{651}}{2}$

9. $y = \sin x$ и $y = \sin 2x$

$$\sin x = \sin 2x$$

$$\sin x - 2\sin x \cos x = 0$$

$$\sin x(1 - 2\cos x) = 0$$

$$\sin x = 0; \cos x = \frac{1}{2}$$

Ответ: $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

10. $y = x + 1, y = e^x$

Пусть x_0 – абсцисса точки касания

$$y_{кас} = e^{x_0} + e^{x_0}(x - x_0)$$

$$e^{x_0} = 1; e^{x_0} - e^{x_0} \cdot x_0 = 1 \quad (1);$$

$x_0 = 0$ при $x_0 = 0$ равенство (1) верно значит, прямая $y = x + 1$ является касательной к графику функции $y = e^x$.

Ответ: является.